





1. 76
EN
SIEBENBÜRGENS KÄFERFAUNA

AUF GRUND IHRER ERFORSCHUNG BIS ZUM
JAHRE 1911

ZUSAMMENGESETZT VON

Dr. KARL PETRI
BURGERSCHULDIREKTOR IN SCHASSBURG

HERAUSGEgeben

VOM

SIEBENBÜRGISCHEN VEREIN FÜR NATURWISSENSCHAFTEN
ZU HERMANNSTADT

286121

KOMMISSIONSVERLAG VON
R. FRIEDLÄNDER & SOHN, BERLIN



SIEBENBÜRGENS KÄFERFAUNA

AUF GRUND IHRER ERFORSCHUNG BIS ZUM JAHRE 1911

ZUSAMMENGESTELLT VON

Dr. KARL PETRI
BÜRGERSCHULDIREKTOR IN SCHÄSSBURG

HERAUSGEGEREN

VOM

SIEBENBÜRGISCHEN VEREIN FÜR NATURWISSENSCHAFTEN
ZU HERMANNSTADT

KOMMISSIONSVERLAG VON
R. FRIEGLÄNDER & SOHN, BERLIN

UL
573
049
912
ENT

Siebenbürgens Käferfauna

auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre 1911

zusammengestellt von

Dr. Karl Petri
Bürgerschuldirektor in Schässburg



Hermannstadt
Buchdruckerei Jos. Drotleff
1912

Vorwort.

Seit dem Erscheinen der letzten entomologischen Arbeit des um die Landeskunde Siebenbürgens so verdienten Dr. phil. h. c. E. A. Bielz im Jahre 1887, welche übersichtlich das Ergebnis der Forschung auf dem Spezialgebiete der Coleopteren-Kenntnis bis zum Schlusse des Jahres 1886 darstellt, sind abermals 24 Jahre vergangen. Dieser lange Zeitraum ist auch an dieser Wissenschaft nicht spurlos vorübergegangen. Es haben sich die Methoden des Sammelns vervollkommenet, es hat sich die Literatur ausserordentlich vermehrt, indem zahlreiche Familien und Gattungen monographisch bearbeitet wurden, wobei das ganze palaearktische Faunengebiet Berücksichtigung fand, es sind die Instrumente der Untersuchung unter dem Einfluss der hohen Entwicklung der Technik leistungsfähiger und vollkommener geworden, der hochentwickelte Austausch von wissenschaftlichem Material hat das vergleichende Verfahren der Untersuchung gefördert, wodurch erst der Charakter der Fauna eines Gebietes ins rechte Licht gerückt und in ein bestimmtes Verhältnis zur Fauna der umgebenden Gebiete gebracht wird, die systematische Wissenschaft hat aber auch unter dem Einfluss der modernen naturwissenschaftlichen Theorien Elemente in sich aufgenommen, die ihr ursprünglich fremd sind, vor allen Dingen Entwicklungsgeschichte und vergleichende Anatomie, auch die Paläontologie wird mehr und mehr herangezogen, um die verwandtschaftlichen Beziehungen der Arten, Gattungen und Familien sicherer festzustellen; die Entomologie ist aus einer rein systematischen zu einer biologischen Wissenschaft geworden, welche nicht nur gewisse äussere, morphologische Verhältnisse von systematischer Wichtigkeit, sondern das ganze Werden und Sein, das Leben der Tiere nach allen Richtungen berücksichtigt. Diese Einflüsse finden ihren Gesamtausdruck auch in der Zusammenstellung und Anordnung der Käferfauna ganzer faunistischer Gebiete, am vollkommensten in denen der ganzen Erde, im sogenannten natürlichen Systeme. Die Kataloge wollen also nicht mehr nur in Linnéischem Sinne als ein mächtiges Fachwerk angesehen werden, dessen Endzweck im wesentlichen ein nomenclatorischer ist, sondern sie geben ein Bild der verwandtschaftlichen Verhältnisse in der Ordnung der Käfer, soweit dieselben gegenwärtig wissenschaftlich festgestellt werden konnten. Es ist natürlich, dass dieses Bild um so lückenhafter ist, je kleiner ein

Faunengebiet abgegrenzt wird, weil darin alle jene Glieder ausfallen, welche nur eine beschränkte Verbreitung besitzen.*

Die Bestrebungen auf dem Gebiete der modernen Entomologie liefern auch das kritische Material, mit Hilfe dessen das bisher in Geltung gestandene System zahlreiche, wesentliche Veränderungen erfahren hat, die sich zu erkennen geben nicht nur in einer vielfach gegen früher abweichenden Gruppierung der Familien, Gattungen und Arten, sondern auch darin, dass die Charaktere der Abteilungen höheren und niederen Grades wesentlich schärfer gefasst wurden, wobei manche Familien (wie die *Platypidae*, *Metaulacnemita*e) ihre Selbständigkeit verloren durch Verschmelzung mit verwandten Familien, während anderseits manche Gattungen, wie z. B. die Gattung *Phrydiuchus* für *Marmoropus topiarius* Germ. und *Speiseri* Schultze, die Gattung *Brachyodontus* für *Rhytidosomus Reitteri* Weise, drei neue Arten und für *Amatus alpinus* Hampe etc. neu aufgestellt, und frühere Untergattungen zum Range von Gattungen erhoben werden mussten, so z. B. die frühere Untergattung *Phytonomus* Schönh., in der alten Gattung *Plinthus* die frühere Untergattung *Neoplinthus* Bedel; die alte Gattung *Cleonus* wurde sogar in 23 neue Gattungen zerteilt.

Von grosser Wichtigkeit gerade in entwickelungsgeschichtlichem Sinne ist die Variabilität der Arten. Die Vertreter einer Gattung zeigen alle untereinander eine gewisse Verwandtschaft. Ist die Stammform ausgestorben, welche gleichsam den Typus der Gattung darstellt, so führt die Entwicklung in verschiedenen Verbreitungsgebieten in divergierender Richtung zur Entstehung neuer Arten, die ganz bestimmt von einander unterschieden werden können. Doch kommt es wohl nicht selten vor, dass die Stammform, oder was man als solche nach dem gegenwärtigen Stande der Erkenntnis anzunehmen geneigt ist, in manchen Gebieten noch anzutreffen ist, in andern aber bereits zu divergieren beginnt: es entstehen die Varietäten oder Lokalrassen. Den Beginn dieser

* Ich habe mich auf die obigen Ausführungen auch aus dem Grunde hier näher eingelassen, um der Behauptung entgegenzutreten, dass einseitige Katalogisierung die wichtigste und einzige Aufgabe der modernen Systematik sei (vergleiche L. Ganglbauer: Die Käfer Mitteleuropas), obgleich auch der vielseitige Wert dieser wissenschaftlichen Beschäftigung nicht zu unterschätzen sein wird. Dieselbe schliesst ja vielmehr die Biologie als eine ihrer wesentlichen Aufgaben ein, und wenn gefordert wird, dass letztere intensiver zu betreiben sei, so geschieht dies aus dem Grunde, weil wir von verhältnismässig nur sehr wenigen Käfern ihr Leben in allen seinen Beziehungen kennen. Die Forderung ist also wohl berechtigt, und ich schliesse mich derselben aus vollem Herzen an, nur muss betont werden, dass zweckmässig zu betreibende Biologie, ich möchte sagen „experimentale Systematik“, nur im Zusammenhang mit Systematik denkbar ist, und dass die Pflege dieses Teiles der Wissenschaft viel frei verfügbare Zeit, Geduld, Ausdauer und Scharfsinn erfordert, was denn wohl auch mit die Ursache ist, dass so Wenige sich mit ihr beschäftigen können, obgleich das zu erstrebende Ziel, den Schleier von so manchem tiefen Geheimnis im Leben der Käferwelt mehr und mehr zu lüften, ein so lockendes ist, und wohl auch von vielfachem praktischem Nutzen sein würde.

Divergenz deuten bereits die individuellen Abweichungen an, wofür ein prächtiges Beispiel die Coccinelliden abgeben. Daher hat die moderne Entomologie die schwierige Aufgabe, auch diesen zahlreichen Variationen ihre eingehende Beachtung zu schenken, weil sie in ihnen das Mittel erkannt hat, die Verwandtschaft der Arten festzustellen und dadurch auch für die Entwicklungslehre ein reiches, nicht zu unterschätzendes Beweismaterial zu liefern.

Aber nicht nur in Beziehung auf den gegenwärtigen Stand der Systematik entspricht die Bielz'sche Käferfauna Siebenbürgens nicht mehr den gegenwärtigen Anforderungen, sondern es hat sich auch die Zahl der in Siebenbürgen seit ihrem Erscheinen aufgefundenen Arten bedeutend vermehrt. Das älteste systematische Verzeichnis der Käfer Siebenbürgens, welches von E. A. Bielz im I. Jahrgang der „Verhandlungen und Mitteilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften“ 1850 und im II. Jahrgang derselben Zeitschrift 1852 veröffentlicht wurde, enthielt 2220 Arten und 16 Varietäten und wurde durch spätere Nachträge bis Ende des Jahres 1853 um 257 Arten und 3 Varietäten, also auf 2477 Arten und 19 Varietäten vermehrt. Das von Karl Fuss im „Archiv für siebenbürgische Landeskunde“ unter dem 15. Juni 1869, also 16 Jahre später, veröffentlichte Verzeichnis wies zusammen mit den in den „Verhandlungen und Mitteilungen des siebenb. Vereins für Naturwissenschaften“ XXI. Jahrgang 1871, XXIII. Jahrgang 1873 und XXIV. Jahrgang 1874 einen Stand von 2983 Arten, also innerhalb 20 Jahren einen Zuwachs von 506 Arten aus. Die bis zum Schlusse des Jahres 1886 reichende, im XXXVII. Jahrgang der „Verhandlungen und Mitteilungen des siebenb. Vereins für Naturwissenschaften“ im Jahre 1887 wieder von E. A. Bielz veröffentlichte Käferfauna Siebenbürgens ergab einen Stand von 75 Familien, 936 Gattungen, 3705 Arten und 320 Varietäten, demnach den ansehnlichen Zuwachs von 722 Arten innerhalb 12 Jahren.

Dank der unermüdlichen Sammeltätigkeit unserer siebenbürgischen Entomologen Friedrich Birthler in Sächsisch-Regen, Friedrich Deubel in Kronstadt, M. v. Kimakowicz in Hermannstadt, Alexander Ormay, einstigen Gymnasialprofessors in Hermannstadt, Ludwig Méhely, einstigen Realschulprofessors in Kronstadt, A. Müller in Hermannstadt, Eduard Scheeser in Kronstadt, Rudolf Albrecht in Hermannstadt, Karl Höchsmann, Bürgerschulprofessors in Schäßburg, und des Verfassers, dann mehrerer ungarischer und zahlreicher deutscher, namentlich Wiener Entomologen, welche gelegentliche Sammeltouren in Siebenbürgen unternahmen, hat die Zahl der in Siebenbürgen nachgewiesenen Käfer innerhalb der letzten 24 Jahre abermals um 1 Familie, 181 Gattungen, 1058 Arten und 82 Varietäten zugenommen, wozu noch 324 Aberrationen hinzukommen, so dass sich ein gegenwärtiger Stand von 76 Familien, 1117 Gattungen, 4763 Arten, 402 Varietäten und 324 Abänderungen ergibt. Die auffallend starke Vermehrung der Gattungen ist zum Teil auf Rechnung des oben erwähnten Umstandes zurückzuführen.

Ich halte es für angezeigt, das immerhin schöne Ergebnis der Durchforschung der siebenbürgischen Landesteile Ungarns im wesentlichen durch die deutsche Arbeit von 9 Dezennien bekannt zu geben, namentlich auch um der Gefahr vorzubeugen, dass dasselbe spurlos verschlungen werde in einem Käferkatalog, der das gesamte Königreich Ungarn umfassen wird, in dem die siebenbürgischen Landesteile als Hungaria orientalis figurieren werden und dem auch die magyarisierende Tendenz unserer gegenwärtig noch üblichen Orts-, Fluss- und Gebirgsnamen nicht abzusprechen ist. Mit aus diesem Grunde habe ich und zwar nicht in Abkürzung, wie dies im Bielz'schen Verzeichnis der Fall ist, die ausgeschriebene, gegenwärtig noch in Geltung befindliche und allgemein bekannte Lokal-Nomenklatur verwendet.

Die Veröffentlichung des neuen Käferkataloges ist notwendig auch darum, weil sich in das Bielz'sche Verzeichnis zahlreiche Irrtümer eingeschlichen haben, wie sie sich bei der Schwierigkeit der Determination mancher Spezies auch in andern Verzeichnissen einstellen. Die Richtigstellung konnte an vielen Orten erfolgen und ist durch entsprechende Fussnoten angezeigt. In solchen Fussnoten ist auch auf solche Arten aufmerksam gemacht, deren Vorkommen bei uns zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, aber aus verschiedenen Gründen wenig wahrscheinlich ist. Hierher gehören auch solche Spezies, deren Vorkommen in den benachbarten Faunengebieten verbürgt ist, von denen jedoch eine nahe verwandte Art in neuerer Zeit beschrieben wurde, die wahrscheinlich die Stelle jener Form bei uns vertritt. So führt z. B. Bielz die in Oesterreich und in der Schweiz vorkommende *Laena viennensis* Sturm für Siebenbürgen an, da die vicarirende *Laena Ormay* Reitter erst 1887, also ein Jahr nach dem Erscheinen seiner »Fauna transylvanica«, beschrieben wurde; ferner soll sich nach Bielz der *Liparus dirus* Herbst bei uns finden, weil ihm der viel später beschriebene *Liparuz transylvanicus* m. unbekannt war; auch der den Ländern des Mittelmeergebietes eigentümliche *Larinus tongirostris* Gyll. wird für den dem südöstlichen und östlichen Europa eigenen *Larinus Beckeri* m. angeführt usw. Es wird die Aufgabe unserer Entomologen sein, die endgültige Berichtigung dieser zweifelhaften Fälle vorzunehmen.

Für die relative Richtigkeit der Angaben im neuen Verzeichnis bürgt auch mit der Umstand, dass das reiche und schöne Sammelergebnis unseres erfahrenen und erfolgreichsten Sammlers, Friedrich Deubel in Kronstadt, fast vollständig und auf das sorgfältigste von Autoritäten auf dem Gebiete der Entomologie determiniert wurde, wie Regierungsrat L. Ganglbauer, Direktor der zoologischen Abteilung des kaiserlichen Museums in Wien, kaiserlicher Rat Edmund Reitter in Paskau, Dr. Karl Daniel in München und Dr. Josef Daniel in Ingolstadt, Oberst Schultze in Detmold (†), Dr. Eppelsheim in Germersheim (†), Stierlin in Schaffhausen (†), Dr. Krauss in Marburg (Steiermark), Dr. Holdhaus in Wien, Dr. Bernhauer in Grünberg (Oberösterreich), Dr. Flach in Aschaffenburg,

Schilsky in Berlin, J. Weise in Niederschönhausen-Berlin, Oberpostrat Formanek in Brünn u. a. Ebenso haben es die Professoren Ormay und Méhely gehalten und in zweifelhaften Fällen, namentlich wenn die nötige Literatur mangelte, hat auch der Verfasser die Unterstützung eines Teiles der angeführten Herren nie vergebens in Anspruch genommen, wofür denselben auch hier der verbindlichste Dank ausgesprochen wird.

Besonders wertvoll und auch reich an Erfolgen sind die Sammeltouren gewesen, welche L. Ganglhuber in Siebenbürgen unternommen hat, namentlich ist es die Sammelreise in das Rodnaer Gebirge, deren Ergebnis er in den Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Band XI, Heft 2, 1896 veröffentlicht hat.

Die Resultate einer vierjährigen Sammelperiode im südlichen und westlichen Siebenbürgen publizierte Professor Alexander Ormay in der Beilage zum Schulprogramm des Hermannstädter Staatsgymnasiums 1888 unter dem Titel »Adatok Erdély bogáfaunájához«. Er beschrieb in demselben an neuen Arten: *Pherosilchus Elelkae*, *Sphaerosoma Reilleri*, *Meleus Elekeschii*.

Das Ergebnis einer ebenfalls vierjährigen Sammelarbeit im Kronstädter, Fogarascher, Háromszéker, Udvarhelyer, Csiker, Maros-Tordaer, Koloser und Szolnok-Dobokaer Komitat veröffentlichte der Oberrealschulprofessor Ludwig Méhely in »Az értesítő tudományos közlemények, termész. tudom. szak.«, XX. Jahrgang, 2. Heft 1895.

Eine lobenswerte, mit analytischen Tabellen versehene Arbeit, bestimmt für die Hand der Schüler, schrieb im Programm des Klausenburger röm.-kath. Obergymnasiums vom Jahre 1890/1 unter dem Titel »A kolozsvári bogárgyujtő« Dr. Aloysius Pachinger. Abgesehen von dem pädagogischen Werte dieser Arbeit kann dieselbe mit Rücksicht auf die Bereicherung unserer Landeskunde nur mit Vorsicht benutzt werden, da das von Schülern viele Jahre hindurch zusammengetragene Material mit Rücksicht auf seine Herkunft sehr unsicher ist und kaum aus der Umgegend von Klausenburg allein abstammen dürfte.

Ernst Csiki, Kustos an der zoologischen Abteilung des ungarischen National-Museums, schrieb in „A pótfüzetek (LV.) állattani közleményei“, 1900: „Magyarország cieindela-féléi“ (*Cicindelidae*), in den Annales musei nationalis hungarici IV. Jahrgang 1906) „Beiträge zur Kenntnis der ungarischen *Morphocaraben*.“ Beschreibungen mehrerer Blindkäfer Siebenbürgens lieferte derselbe in Annales musei nationalis hungarici II, 1904 von *Pholeuon hungaricum*; in derselben Zeitschrift I, 1903 unter dem Titel „Magyarországi új bogarak“ von *Anophthalmus Deubelianus*; in derselben Zeitschrift III, 1905 von *Anophthalmus pseudoparoecus*; in „Rovartani lapok“ XI, 1904 von *Anophthalmus Sziladyi*; in „Természeti füzetek“ 24, 1901 von *Anophthalmus Mallászi*; in „Állattani közlemények“ I, 1902 von *Anophthalmus Bielzi* var. *transsylvaniaicus*, welchen Ganglbauer in den Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft, Wien, 1899 als *Anophthalmus pilosellus* Mill. gedeutet hatte.

Meine eigenen, auf Siebenbürgen bezüglichen Arbeiten, welche, so weit sie umfassenderer Art sind, immer auch die siebenbürgische Fauna berücksichtigen, sind folgende: Verhandlungen und Mitteilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften, Hermannstadt 1891: Ueber den Stand der Coleopterenfauna Schässburgs; in derselben Zeitschrift 1901: Monographie des *Cotcopterentribus Hiperini*; in derselben Zeitschrift XLIV, 1894: Monographie des *Coleopterengenus Liparus Oti*; Wiener entomologische Zeitung XXV, 1906: *Malthodes serbotae*; ebenda XXVI, II, 1907: Vier neue Rüssler aus Turkestan und eine neue *Crepidodera* aus Siebenbürgen; ebenda XXII, 1903: *Agabus regalis* vom Buleasee; ebenda 1904 und 1905: Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren, LV. *Genus Lixus*: Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, Jahrgang 1902: *Otiorrhynchus amplus* und *Quedius decoratus*; Annales musei nationalis hungarici VI, 1908: I. Eine neue blinde Scydmaeniden-Gattung aus Ungarn (soll heissen Siebenbürgen); II. Beitrag zur näheren Kenntnis der *Sautcyella Schmidtii Maerket*; III. Eine neue Cleonide aus Turkestan; Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Brünn: Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren, LX.: *Genus Larinus* und Verwandte; Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegowina, IV. Band 1896: Revision der Gattung *Plinthus*.

Ich halte es für überflüssig, die zahlreichen übrigen kleinern Arbeiten nicht siebenbürgischer Autoren hier besonders anzuführen, da sie für jede Species in dem Catalogus coleopterorum Europae etc. von Heyden etc. 1906 zu finden sind. Doch halte ich es für eine Ehrenpflicht, bei dieser Gelegenheit auch jenes Mannes zu gedenken, der uns am Beginne der letzten Periode (1887—1910) im Jahre 1891 die „Fauna transsylvania“ geschenkt. Es ist der frühere Dozent an der kaiserlichen Universität Dorpat, jetzt Privatgelehrter in Ebenhausen (Bayern), Dr. Georg von Seiditz. Dieses Werk ist der Anstoss geworden zu vertiefter, mit neuem Eifer und einem gewissen Sicherheitsgefühl begonnenen und fortgesührten Arbeit auf dem Gebiete unserer heimischen Entomologie. Das Werk, wenn es auch wie jede andere so umfassende Arbeit gewisse Mängel besitzt, ist bis jetzt einzig in seiner Art und vollständig noch durch kein anderes gleichwertiges ersetzt (Ganglbauer, Käfer von Mitteleuropa, ist noch nur Torso), auch hat es eine Bedeutung gewonnen, die es zu einem unentbehrlichen Handbuch nicht nur für die baltischen Provinzen und Siebenbürgen, sondern für ganz Europa macht. Wenn neben demselben in zweifelhaften Fällen auf die Originalbeschreibungen zurückgegangen werden muss, so glaube ich, dass das auch bei allen andern kompendiösen Zusammenfassungen (Bestimmungstabellen Reitter's) der Fall sein wird; aber gerade diese Kürze hat auch den Vorzug, die sichere Determination wenigstens von Familie und Gattung, oft auch der Art ausserordentlich zu erleichtern und zu beschleunigen, indem sie vieles Nachschlagen in zerstreuten Werken erspart. Es ist seiner Anlage

und Durchführung nach auf streng wissenschaftlichen Grundsätzen ausgearbeitet, und wenn die strenge Kritik, die der Verfasser gelegentlich übt an Autoren, ihren Beschreibungen und an ihrer zuweilen jeder Wissenschaftlichkeit entbehrenden Willkürlichkeit, so erscheint mir das als ein Verdienst, das wohl dem Verfasser manchen offenen und heimlichen Gegner geschaffen hat; jeder wahre Freund der Wissenschaft aber freut sich dieses grossen „Reinmachens“ mit dem scharfen Besen der Kritik. Mir selbst ist das Werk eben wegen seiner kompendiösen Kürze unentbehrlich geworden, namentlich bei Bestimmung der Familie und Gattung, wenn es auch ernster Arbeit bedarf, um sich in demselben mit Leichtigkeit zurechtzulinden. Und so sei dem Verfasser, der uns auch mit einer ganzen Reihe neuer Arten beschenkte, wie *Carabus decorus*, *Dyschirius latipennis*, *Anophthalmus Biecki*, *Gyrinus hungaricus*, *Cyrtus Fussi*, *Oliorrhynchus edentatus*, *Pauophilus Hampei*, *Brachysomus transsylvaniaeus*, *Barypythes globus*, und der mit unsren siebenbürgischen Entomologen, besonders früher, stets in freundschafflicher Fühlung gestanden ist, der herzliche Dank für seine schöne Gabe auch an dieser Stelle, wenn auch spät, so doch nicht zuspät, dargebracht.

Und somit übergebe ich die jüngste „Fauna transsylvaniaica“ voll Vertrauen der Oeffentlichkeit. Möge auch an ihr die echte Kritik ihre Aufgabe erfüllen, damit, was unbeabsichtigt an Fehlern und Irrtümern enthalten ist, nach wissenschaftlichem Rechte falle, das Neue, das noch aufzufinden sein wird — denn mancher Teil Siebenbürgens ist noch gründlicher zu durchforschen —, hinzugefügt werde, möge sie, kurz gesagt, ein neuer Anstoss werden für unsren jüngeren Nachwuchs, seine Arbeit auf dieses schöne und interessante Gebiet zu verlegen, damit in absehbarer Zeit unser wahrer Besitz, auch was diese Kleinwelt anbetrifft, immer zuverlässiger und genauer festgestellt und verbucht werde. Ich hoffe, es werden sich immer noch neue Arbeiter finden, welche auch auf diesem Gebiete die Fahne sächsisch-deutscher Forschung hochhalten werden.

Schässburg, den 15. August 1910.

Dr. Karl Petri.

Berichtigungen und Ergänzungen.

- Pag. 6 Z. 30 v. o. ist vor a. Bielzi zu setzen: a. Deubelianus Fleischer (C. Pareysi v. Deubelianus Fleischer, W. e. Z., August 1911, Heft VI/VII). Nach Csiki eine aberrante Form des C. v. euchromus.
- Pag. 32 Z. 1 v. o. lies „ovipennis“ statt ovipunnis.
- Pag. 42 Z. 4 v. o. ist nach crepitans einzuschalten: **Ganglbaueri** Apfb. Karlsburg, Schässburg (c. a.).
- Pag. 42 Z. 6 u. 7 v. o. ist bei psophia Karlsburg, Schässburg (c. a.) zu streichen. Br. psophia wird bei uns wahrscheinlich durch Ganglbaueri ersetzt. Nach Fleischers Bestimmung kommen bei uns auch vor folgende zwei Arten: —
- Pag. 65 Z. 9 v. u. hinter gracilis: Sc. debilis Hochh. Alsó-Rákos, Rotenturm (Deubel).
- Pag. 71 Z. 25 v. o. vor punctus einzuschalten: Ph. puella Nordm. Alsó-Rákos (Deubel).
- Pag. 86 Z. 7 v. u. ist als Aberration zu Br. exigna zu setzen: a. **colorata**. Ausser den Beinen und Fühlern sind auch die Flügeldecken und die beiden ersten Abdominalsegmente gelb. Schässburg (c. a.).
- Pag. 97 Z. 13 v. u. ist bei rigidicornis hinter (Glashütte) einzuschalten „Vajda-Hunyad“.
- Pak. 136 Z. 1 v. u. ist hinter (Müller) einzuschalten „Vajda-Hunyad (c. a.)“
- Pag. 146 Z. 5 v. o. vor morosa ist einzuschalten: **marginata** Küst. Vajda-Hunyad (c. a.).
- Pag. 148 Z. 13 v. u. lies „Calytis“ statt Calytis.
- Pag. 149 Z. 8 v. o. lies „Thymalus“ statt Tymalus.
- Pag. 160 Z. 23 v. o. lies „Cathartus“ statt Chatartus.
- Pag. 161 Z. 8 v. u. ist vor Passandrinae einzuschalten: **Lathropus Erichs.**
sepicola Müll. Karlsburg unter den Weingärten vom Zaune geklopft (c. a.).
- Pag. 170 Z. 33 v. o. ist Baassen (c. a.) zu streichen.
- Pag. 183 Z. 23 v. u. lies „Mysia“ statt Misia
- Pag. 185 Z. 30 v. o. ist hinter (Bielz) einzuschalten „Vajda-Hunyad (a. c.)“
- Pag. 187 ist vor Helodidae als Familienname XXXIX zu setzen, entfällt also vor Dascillidea
- Pag. 215 Z. 17 v. o. lies „Hedobia“ statt Hodobia.
- Pag. 217 Z. 17 v. u. lies „Caenocara“ statt Coenocara.
- Pag. 281 Z. 25 v. o. ist hinter pallida einzuschalten: **mariceps** Redt. Schässburg (c. a.).
- Pag. 289 Z. 16 v. o. ist hinter der Gattung Charagus einzuschalten:

Pseudochoragus n. g.

Antennae breviusculae, marginem posteriorem thoracis haud attingentes, 9-articulatae, juxta marginem inferiorem oculorum insertae, articulis duobus basaliibus crassioribus, quattuor sequentibus tenuioribus, clava triarticulata, subdepressa, articulis subremotis. Rostrum breve, subplanum, apice subdulatum. Oculi laterales, subovati, convexi, haud protumuli. Thorax convexus, subcylindricus, antice rotundatus angustatus, lateribus haud ante basin elevato-marginatus, basi subbisinuato. Scutellum minutissimum. Elytra oblongo-ovata, basi latitudine thoracis, margini posteriori thoracis applicata, convexa, pygidium haud tegentia, striatopunctata, Pedes breviusculi, posteriores vix crassiores, tibiae rectis, tarsis brevioribus, 4-articulatis, articulis basaliibus angustis, art. 3^o bilobato, subdilatato, art. ultimo vix elongato. Coxae anteriores globosae, paucis prominulæ, haud separatae, coxae posteriores aquilatæ distantes.

Die Gattung gehört in die Subfamilie der Choragini und steht in nächster Verwandtschaft mit der Gattung Choragus, von welcher sie sich wesentlich nur durch die 9-gliedrigen Fühler unterscheidet. Mir ist nur folgende Art bekannt geworden:

brachycerus n. sp. Long. 14-15 mm

Dem Choragus Sheppardi sehr ähnlich, aber schmäler und etwas kleiner, pechschwarz, Basis der Fühler, Schienen und Tarsen rotlichgelb, Kopf und

Halschild matt, sehr dicht und fein maschig punktiert, Flügeldecken glänzend, äusserst zart und zerstreut anliegend behaart. Die beiden ersten Fühlerglieder länger als breit, das erste cylindrisch, etwas gehoben, das zweite nach aussen gerundet erweitert, etwas breiter als das erste, die folgenden vier Glieder länger als breit, dünn, von abnehmender Länge, die zwei ersten Glieder der scharf abgesetzten Keule kaum so lang als breit, das letzte eiförmig. Rüssel kurzer als breit, Stirne flach gewölbt, kaum schmäler als der Küssel. Halschild cylindrisch, gewölbt, vor der Mitte nach vorne stark gerundet verengt, die schwach erhabene Leiste vom schwach zweibuchtigen Hinterrande schmal, aber deutlich und überall gleichweit entfernt, in der Mitte der Scheibe häufig eine leichte Längsvertiefung. Die langlich eiförmigen Flügeldecken sind an der Basis genau von der Breite des Halschildes und dem Hinterrande desselben eng angeschlossen, an den Seiten etwas gerundet erweitert, grösste Breite etwas hinter der Mitte, an der Spitze gemeinsam abgerundet, das Pygidium nicht bedeckend, punktiert-gestreift, die Streifen schwach vertieft, an der Spitze etwas verworren, die Zwischenräume wenig gewölbt, fast glatt.

Ich sammelte diese Art in einem Exemplar wahrscheinlich durch Klopfen an einem Zahn unter den Weingärten oberhalb der Festung in Karlsburg, besitze jedoch auch zwei Exemplare aus Trenesin in Nordungarn, welche mir von Dr. Brancsek als Choragus picens zugesendet worden sind.

Adephaga.

I. Cicindelidae.

Cicindelinae.

1. Cicindela Dej.

soluta Latr. Kronstadt (Méhely).

silvicola Latr. Durch das Gebiet verbreitet, auf sonnigen Waldwegen bis in das Gebirge (Frecker Geb., Serbota).

hybrida L. Durch das ganze Berg- und Hügelland, namentlich an dem Ufer süsser Gewässer.

var. *riparia* Latr. Rodnagelb. (Vale vinului), Vargyastal (Deubel); Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz).

campestris L. Durch das ganze Gebiet verbreitet, an sonnigen Bergabhängen, Waldwegen bis ins Gebirge.

a. *coerulescens* Beuth. Zood, Puj (Hátszeg, Csiki).

a. *connata* Heer. Schässburg (c. a.).*

a. *manca* D. Torre (aflinis Illeer). Hermannstadt (Csiki); Nagyhagymás, Kronstadt (Deubel).

a. *funebris* Sturm. Kronstadt (Méhely); Petrozsény (Deubel).

germanica L. Karlsburg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Thalheim, Unterkerz, Fogarasch, Persány, Mediasch, Schässburg, Mezőség (Záh), Borszék, Sächs.-Regen (Bielz); Szamosujvár (Ormay). In den Flusstälern auf sandigen Felsen und Wiesen.

elegans var. *stigmatophora* Fisch. Torda, Szamosfalva bei Klausenburg (c. a.). Auf Salzboden. Die Dilacerat-Form mit vollständig unterbrochener Mittelbinde sehr selten.

chiloleuca Fisch. Déva, Reussmarkt, Salzburg, Torda, Szamosfalva, Baassen, Eidischt, Zsabentza, Szamosfalva, Mezőség (Záh). Auf Salzboden, höchstens sekundär durch Ueberschwemmungen an andern Lokalitäten.

In Schässburg findet sich diese Art nicht.

litterata var. *viennensis* Schrank. Porcsesd, Mediasch, Schässburg, Nagyenyed, Záh, Sächs.-Regen (Bielz); Karlsburg (c. a., in Flusstälern); Dicső-Szt. - Márton (Csiki); Nussbach (Deubel).

tunulata F. Auf Salzboden, nur sekundär an anderen Orten.

a. *fabricii* Beuth. Torda, Szamosujvár (Csiki).

a. *barbara* Cost. Klausenburg (Meleg völgy, Tarcsahegy, Csonthegy, Csiki).

- a. *nemoralis* Oliv. Schässburg (c. a., bei einer Ueberschwemmung der Kokel).
- a. *ragusae* Beuth. Salzburg b. H. (Csiki).
- a. *conunctae-pustulata* Doktat. Salzburg, Torda (Csiki).
- a. *venatoria* Poda. Torda (Biró).

II. Carabidae.

Carabinae.

2. Cyhrus Fabr.

rostratus L. Paringul, Mádo, Götzemberg, Präsbe, Kerzer, Arpascher Geb., Kronstadt, Schulergelände, Bucsecs, Piatra mare, Tesla, Dongókő, Grossschenk, Záh, Hargita, Marosgebirge (Bielz); Schanta, Gyögy, Remele (Nagyenyed, Ormay); Schässburg, Rotenturm, Retjezat, Nagyenyed, Rodnagelbige (c. a.).

var. *Hoppei* Ganglb. (*elongatus* Hoppe). Hätzscher Geb., Retjezat (Bielz); Porkovica (Ormay).

Ob wir den 19-23 mm grossen Hoppei Ganglb. haben, wäre erst sicherer zu erweisen, da meine Exemplare vom Retjezat zwar schlanker, aber nicht grösser als die Stammdform sind.

var. *pygmaeus* Chd. Surian, Zilinsjäser, Surul, Kerzer Geb. (Bielz); Schanta, Präsbe (Ormay); Bucsecs, Frecker Geb. (Serbota), Retjezat, Paringul, Borszék, Rodnagelbige (c. a.).

semigranulosus Pall. Zerneschter Gebirge, Kronstädter Gebirge (Deubel).

var. *balcanicus* Hopffg. Scheltal (Zenoga), Zood, Grossscheuer, Kerzer Gebirge, Dragus, Fogarasch, Kronstadt, Schulergelände, Nussbach, Biethalm, Mediasch, Schässb. (Bielz); Ompolyitza al (Ka Isburg, c. a.); Rodnagelbige, Vargyastal (Deubel); Rotenturm (Ormay).

attenuatus F. Birthälm, Mediasch (Bielz); Bodzaer Gebirge (Deubel).

3. Calosoma Weber.

inquisitor L. Hermannstadt, Grossscheuer, Szombat, Grossschenk, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Klausenburg, Bistritz (Bielz). In Eichenwäldern.

(Callipora.)

sycophanta L. Mühlbach, Hermannstadt, Reussdörfel, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Szamosujvár (Ormay).

var. *severum* Chd. Siebenbürgen (Klausenburg).

4. Procerus Dejean.

gigas Creutz. Rotenturmpass (Bielz).

* Sammlung des Verfassers.

5. Carabus Latr.

(Procrustes.)

corlaceus L. Hâtszeg, Déva, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Holzmengen, Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Hosszuvalu, Tömösscher Pass, Bucsecs, Piatra mare, Tesla, Dongókő, Bodzaer Pass, Nussbach, Gross-Schenk, Birthlám, Mediasch, Schässburg, Borszék, Sächsisch-Regen, Bistritz, Rodna, Klausenburg (Bielz).

Bielz hält die Rassen dieser Art, die allerdings ineinander übergehen, nicht auseinander; ich führe die Fundorte für die Varietaten daher an, soweit sie in meiner Sammlung vertreten sind. *V. subrugosus* Kr. ist nach dem europäischen Katalog synonym mit *Var. Hopffgarteni* Kr., der bei uns nicht beobachtet wurde, während die der *Var. spretus* Dej. genäherte Form (*V. banaticus* Redtenb.) nachgewiesen wurde.

var. rugifer Kraatz. Csukás, Előpatak, Nagyenyed, Schässburg, Borszék, Rodnaberge (c. a.).

var. spretus Dej. (*banaticus* Redtenb.). Déva, Karlsburg (c. a.); Klausenburg (Dr. Pachinger).

(Pseudoccebus.)

Irregularis F. Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Marosgebirge, Kuhhorn (Bielz); Schanta (Ormay).

var. Montandoni Buyss. (*Peronae* Hopffg.) Zood, Kronstadt, Bucsecs, Tömösscher Pass, Piatra-mare, Hosszuvalu, Tesla, Dongókő, Bodzaer Pass (Bielz); Bistra, Schuler Geb., Frecker Gebirge, (Serbota, c. a.).

(Megodontus.)

planicollis Küst. Schieltal (Strazsa), Dusch, Präsbe, Sterpu, Zood, Surul, Fogarascher Gebirge, Frecker Jäser, Porumbacher Gebirge, Negoj, Kerzer Gebirge, Bulea - Jäser, Frecker Gebirge (Bielz); Schanta (Ormay); Paringul, Retjezat, Bistra (c. a.).

var. verae Csiki. Südöstliche Geb. (Csiki).

Deubeli Reitter. Bucsecs (c. a.).

violaceus L. Rodnaberge, Frecker Geb. (Serbota), Malomvitz, Rotenturm, Szurdok-Pass (c. a.).

Bielz führt nur die Stammform an und die Varietät *cyanoleimbatis* Kr., die bei uns jedenfalls nicht vorkommt. Ich beschränke mich daher bei der Angabe der Fundorte auf diejenigen Formen, die in meiner Sammlung vertreten sind.

var. obliquus Thoms. Kerzer Geb. (Bielz).

Das Vorkommen dieser Varietät mit ihrer Abergart ist noch zu erweisen, da sie nicht mehr gesammelt worden ist.

a. *Germari* Sturm. Präsbe, Kerzer Geb., Bodzaer Pass, Kulihorn, Borgoer Pass (Bielz).

a. *pygmaeus* f. n. Schässburg (c. a.).

C. *violaceus* a. *pygmaeus*. Länge 20 mm. Sie hat Grösse und Gestalt des C. neesi Hoppe, aber die matten, fein gekörnten Flügeldecken des typischen *violaceus* mit goldgrünen Rändern der Flügeldecken und einem ähnlichen unbestimmten Fleck in den Gräben neben den Hiaterwinkeln des Halsschildes.

Der Seitenrand des Halsschildes ist vorne schmäler, hinten breiter abgesetzt als bei der typischen Form. Das vorliegende Exemplar ist wohl nur eine Zwergform des typischen *violaceus*.

var. Méhelyi Ganglb. Fogarascher Gebirge, Bucsecs, Schässburg, Előpatak (c. a.).

var. macilentus n. v. Schässburg, Bistra.

C. *violaceus* var. *macilentus* n. v. Herr Reitter, dem ich diese Varietät vorlegte, bezeichnete sie als *var. macilentus*, ohne sie beschrieben zu haben; ich akzeptiere den Namen. Sie hat dieselbe Grösse, wie *var. méhelyi*, ist aber auch im weiblichen Geschlechte schlanker als diese und in beiden Geschlechtern lebhaft, wie lackiert glänzend. Der Seitenrand der Flügeldecken ist blau oder grün die Punktiierung von Kopf und Halsschild etwas feiner, aber runzliger, die Flügeldecken sind kaum gekörnt, sondern sehr fein, aber deutlich verworren runzlig punktiert, die primären Trübchen nicht aangedeutet. Länge 25–27 mm. (Chaetocarabus.)

intricatus L. In den Wäldern des ganzen Gebietes unter Baumrinden oder in faulen Holz.

var. angustatus Haury. Schässburg (c. a.).

(Mesocarabns.)

catenulatus Scop. Königstein, Nagyhagy-más, Egyeskö (Balánbánya, c. a.). Scheint ausschliesslich in Kalkgebirgen zu leben.

(Platycarabns.)

Fabrichii Panz. Rodnaberg. (Bielz).

var. malachiticus Thomis. Rodnaberg. (Bielz, c. a.); Kelemengelberge (Müller).

(Hygrocarabus.)

variolosus Fbr. Durch das ganze Gebiet verbreitet, an sumpfigen Stellen.

var. costulifer Fleischer. Biharer Komitat (Fleischer).

(Chrysocarabus.)

auronitens F.

var. Escheri Pall. In allen Gebirgen unter Baumrinden und Steinen.

a. *funestus* Csiki. Parigul.

var. laevipennis Seidl. Rodnaberge, Marosgebirge, Görgénygeb., Kronstädter Gebirge.

a. *opacus* Haury. Zusammen mit dem vorigen.

(Tomocarabus.)

convexus F. Hâtszeg, Schieltal, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Törzburg, Mediasch, Schässburg, Oláhfalu, Hargita, Sächsisch-Regen, Marosgeb. (Bielz); Mezőfele (Maros-Tordaer Kom.), Szamosujvár, Rotenturm (Ormay); Detunata (Mallász); Bükszad, Dees (c. a.).

var. Merkli Hopffg. Kerzergebirge, Kronstadt, Hosszuvalu, S.-Regen (Bielz).

a. *gracilior* Géh. Siebenbürgen.

(Callistocarabus.)

marginalis F. Hermannstadt, Grossau, Marosgebirge (Bielz).

Bielz kannte die Varietät *decorus* Seidl. nicht; es ist wahrscheinlich, dass C. *marginalis* F. bei uns nicht, sondern nur die Varietät vorkommt.

var. decorus Seidlitz. Ratosnya (Birthler); Vargyastal. (In einem Helixgehäuse, Deubel.)

(Limnocarabns.)

clathratus L. Heldsdorf (Bielz); Kis-somlyó (Csik, Méhely.)

(Carabus s. str.)

granulatus L. Durch das ganze Gebiet his in die Gebirge verbreitet.

a. **rubripes** Géb. (rufofemoratus Letz.). Zusammen mit der Stammform.

a. **forticostis** Kr. Kronstädter Gebirge, Ober-Tömös (Deubel); Schässburg (c. a.).

var. **interslitialis** Duft. Dees (c. a.).

cancellatus Illig.

Bielz führt die Stammform fast für ganz Siebenbürgen, Deubel vom Königstein an; ich habe dieselbe noch nicht gesehen und bin der Ansicht, dass dieselbe bei uns gar nicht vorkommt. Bei dieser sind die Tüberkeln der Primärreihen flach und schwach entwickelt, die Zwischenräume der Tüberkelreihen und Rippen außerordentlich fein granuliert, matt; erstes Fühlglied rot, Beine schwarz (Stammform); ebenso fehlt uns a. *rubripes* Kr. und assimilis Duft., bononiensis Géb., tuberculatus Schm. Die Varietät böhmiensis Reitter gleicht der Varietät subgranular Reitter, nur besitzt sie rotes erstes Fühlglied und nur die Beine sind schwarz.

var. **Mühlfeldi** Géb. Nagyhagymás, Kelemegebirge, Schulergebirge (Holdhaus).

var. **biharicus** Reitter. Schässburg (c. a.); Hlászeger Tal (Deubel).

a. **pseudo tuberculatus** Lapong. Schässburg, Kronstadt, Csukás (c. a.).

var. **pseudo graniger** Reitter. Rodnageb. (c. a.).

var. **subgraniger** Reitter. Die häufigste Art: Torockó, Retjezat (Malomvizi), Pilis (Nagyenyel), Kronstadt, Rosenauer Gebirge, Schässburg (c. a.).

var. **graniger** Pallardi. Torockó, Retjezat, Balánbánya (c. a.).

var. **seythicus** Schm. (*pseudoscythicus*-Laponge). Kronstadt, Balánbánya, Borszék (c. a.); Rodnagebirge (Holdhaus).

a. **transsylvaniaeus**. Schulergebirge, Csukás, Schässburg (c. a.).

Carabus cancellatus a. **transsylvaniaeus**. Diese Varietät steht, was Größe, Gestalt, Farbung und grobe Runzelung der Flügeldecken-Intervalle anbetrifft, am nächsten dem *seythicus* Schm., von dem sie sich nur durch etwas glanzende, hell kupferrote Färbung unterscheidet.

var. **bucsecsianus** Born. Kronstadt, Schulergebirge, Bucsecs (c. a.).

var. **nigricornis** Dej. Torockó, Baassen, Pilis (Nagyenyel), Schässburg (c. a.).

Ulrichi Germ. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. **Leuckarti** Petri. Mit der Stammform, auch vom Schulner- und Rodnagelgebirge bekannt (Deubel).

Es ist nicht ausgeschlossen, dass bei uns nur die kräftiger skulptierte Form der var. Leuckarti vorkommt, die in der Regel nicht, wie Reitter (Bestimmungstabelle der Carabini) angibt, größer oder robuster als die Stammform ist, sondern durch breitere, stärkere Rippen und kräftigere Körner der Tüberkelreihen ausgezeichnet ist.

var. **fastuosus** Pall. Nagyág (Bielz). arvensis Herbst (nigrinus Westh.). Branisch-Wald (Hermannstadt), Surul, Bucsecs,

Schulergebirge, Tesla, Marosgebirge, Kuhhorn, Borgoer Pass (Bielz); Porumbacher Gebirge (Ormay).

var. **carpathus** Born. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge, Bucsecs (Deubel); Rodnagelgebirge, Nagyhagymás, Schässburg (c. a.).

obsoletus Sturm. Rodnagelgebirge (Ganglbauer, Waldregion des Koronjis, eine Form, die zwischen dem typischen obsoletus und der Varietät euchromus Pall. in der Mitte steht.

var. **Csikii** Mallász. Wahrscheinlich hat Mallász die von Ganglbauer im Rodnagelgebirge gesammelte Zwischenform als var. **Csikii** beschrieben. Hier gehörten wahrscheinlich die Bielz'schen Fundorte des obsoletus: Kapnikbánya, Laposer Gebirge, Görgény, Marosgeb., Gyergyó (Bielz).

var. **Uhligi** Holdhaus. Nagyhagymás, Kelemegegebirge (Holdhaus); Ratosnya (Müller).

var. **euchromus** Pall. Schieltal, Götzemberg, Präsbe, Fogarascher Gebirge, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge, Kronstädter Geb., Kronstadt, Piatra-mare (Bielz); Szurdokpass (c. a.).

a. **Bielzi** Birthler. Zibins-Gebirge (Bielz, c. a.).

var. **procerus** Bielz. (nagyagensis Birthl.). Zalatna, Nagyág, Déva (Bielz); Karlsburg (c. a.).

a. **Prunneri** Mall. Detunata.

var. **fossulifer** Fleischer. Biharer Gebirge (Fleischer); Nagyenyel (Kollegienwald, c. a.).

(Morphocarabns.)

Scheidleri Panz.

Scheidleri var. **Kollari** Pallardi. In meiner Sammlung befindet sich ein Exemplar dieser Varietät, das ich im Tauschwege von Kelecsényi in Tapolcsán erhielt und aus Dees stammen soll. Da ich der Fundortsangabe nicht trage, habe ich die Varietät nicht in unser Verzeichnis gesetzt.

var. **Méhelyanus** Csiki. Nagyhagymás, Kelemege (Holdhaus).

var. **comptus** Dej. Retjezat (Csiki); Torockó (c. a.).

Ich besitze zwei Exemplare aus Torockó, das eine (Männchen) besitzt nur vier Primär-Intervalle, muss also ein comptus sein, doch Erweiterungen der Fühlglieder kaum bemerkbar, das zweite (Weibchen) ist entschieden Hampei mit fünf Primär-Intervallen. Ich habe den Fundort Torockó daher als fraglich auch zu comptus gesetzt.

a. **Hopffgarteni** Kr. Dees. (Nach einem von Kelencsényi stammenden, in meiner Sammlung befindlichen Exemplar.)

var. **Rothi** Dej. Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Schenern, Neu lorf b. II., Holzmengen, Leschkirch, Girelsau, Talmesch, Porumbach, Szombat, Fogarasch, Gross-Schenk, Agnetheln, Mediasch, Schässburg (Bielz); Talmescher Geb. (c. a.).

- a. *vitiosus* Csiki.
 a. *ignoscus* Csiki.
 a. *varistriatus* Kr.
 a. *quadricatenatus* Kr.
 a. *lafestriatus* Kr.
- var. *Hampei* Küst. (aurosericeus Kr., Zopai Kr., marginatus Kr., Marusii Bielz). Vásárhely, Nyárádtal, S.-Regen, Tékerdörf, Záh, Gyeke, Nagyenyed, Zalatna, Karlsburg, Nagyág, Déva (Bielz); Töröczkó (c. a.).
- a. *dacicus* Bielz. (dacicus Csiki). Dees, Csákigorbó, Magyar-Lajos, Oláh-Lapospánya, Czibles, Rodna (Bielz); Naszód (c. a.); Szamosujvár (Csiki).
- Dacicus Bielz ist den Fundortsangaben nach entschieden identisch mit *dacicus* Csiki, daher ist Bielz als Autor anzutreten.
- a. *validus* Csiki. Nagyág (Csiki).
 a. *diffinis* Csiki (comptus Friv.?) Bihargebirge, Gyalu, Hidegszamos (Bielz); Klausenburg (Csiki).
 a. *spectabilis* Csiki. Rodnagebirge (Csiki, c. a.).
 a. *incompensus* Kraatz. Kronstadt, Tömöser Pass, Krízba (Bielz); Előpatak, Nussbach (Bielz, c. a.); Csukás, Schlergebirge (c. a.); Telek, Udvarhely (Csiki).
 a. *elegantissimus* Csiki. Kronstadt (Zinne), Baroth (Csiki).
 (Ernst Csiki, Kustos am ung. National-Museum, hat „Beiträge zur Kenntnis der ungarischen Morphocaralen“ (Annates Musei hung. IV. 1906) die in Ungarn vorkommenden Morphocaralen in 6 selbständige Arten eingeteilt, von denen 3 Arten in Siebenbürgen vertreten sind, und zwar:
1. *Carabus comptus* Dej. Retjezat.
 (var. *Hopfgarfeni* Kr. soll nur auf einer Bergkuppe der Szörényer Alpen vorkommen.)
 2. *Carabus Rothi* Dej. Hermannstädter, Grosskokler und Fogarascher Komitat.
 a. *vitiosus* Csiki.
 a. *Ignoscus* Csiki.
 a. *varistriatus* Kr.
 a. *quadricatenatus* Kr.
 a. *lafestriatus* Kr.
 3. *Carabus Hampei* Küster. Mezőség, Mieresch- und Kleinkokkatal.
 var. *validus* Csiki. Nagyág.
 var. *dacicus* Bielz. Szamostal (Szamosujvár, Naszól).
 var. *diffinis*. Csiki. Kolozsvár, Gyalu, Hidegszamos.
 Comptus Friv. ist identisch mit *diffinis* Csiki und wenn *Hampei* zur Art erhoben wird, kein Hindernis vorhanden, den Varietätsnamen *comptus* Friv. beizubehalten.
 - var. *spectabilis* Csiki. Rodnagebirge.
 var. *incompensus* Kr. Keresztfényhavas, Krízba, Tesla, Tömös, Telek, Nussbach, Udvarhely, Előpatak.
 - a. *elegantissimus* Csiki. Kronstadt (Zinne, Baroth)

- (Trachycarabns.)
- seabriusculus* Ol. Hátseg, Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Gross-Schenk, Kronstadt, Előpatak, Schässburg, Hargita, Csiker Gebirge, Záh (Bielz); Rotenturm (Ormay); Bükszad (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).
 var. *Lippi* Dej. Hátseg, Déva, Piski, Broos, Mühlbach, Gross-Schenk, Schässburg, Oláhfalu, Záh, Klausenburg, Gyalu (Bielz); Hermannstadt, Salzburg, Szamosujvár (Ormay); Puj b. Hátseg, Pilis (Nagyenyed, c. a.); Rodnagabe, Alsó-Rákos, Kronstadt, Ro'enturm (Deubel).
 var. *costulatus*. Retjezat (c. a.).
 C. serabensinus var. *costulatus*. Diese Varietät hat die Größe der Stammform und unterscheidet sich von derselben dadurch, dass die Flügeldecken wie bei v. Lippi deutlich punktiert gestreift und die inneren Zwischenräume in der Basishälfte fast glatt sind; den zweiten und sechsten Zwischenraum bilden in der Basishälfte nur schwach unterbrochene, glatte, etwas über die übrigen Zwischenräume erhobene Rippen, der vierte, achte und zwölft Zwischenraum sind deutliche Kettentreifen mit ziemlich tiefen Gruben.
- var. *minutus* Motsch. Rotenturm (c. a.); Kronstädter Gelirge (Deubel).
 (Denterocarabns.)
- montivagus* Pall. Déva, Birthälm, Mediasch, Persanyer Gebirge (Bielz); Stolzenburg, Seliste (Ormay).
 Wahrscheinlich kommt die Stammform bei uns gar nicht zur Entwicklung, sondern nur die Varietät blandus.
- var. *blandus* Friv. Biharer Gebirge (Reitter); Schässburg (c. a.); Vargyastal, Kronstadt (Deubel).
 (Orinocarabns.)
- concolor* F.
 var. *transylvanicus* Dej. In allen höheren Gebirgen Siebenbürgens, namentlich oberhalb der Baumregion.
 (Carpaphilops.)
- Linnei* Panz. In allen Gebirgen, auch in Wältern unseres Berglandes, z. B. in Schässburg.
 Eine auffallende Bildung findet sich bei einem sonst ganz normalen, 20 mm langen, aus Schässburg stammenden Exemplar (Weibchen): Beide Fühler desselben sind 13gliedrig, das 11. Glied ist fast so lang als das 10. und normal, das 12. ist nur $\frac{1}{3}$ so lang als das 11., aber ebenso dick, das 13. doppelt so lang als das 12. und nur halb so dick und etwas gebogen, das 12. und 13. zusammen sind so lang als das 11. Man erhält von der ganzen Bildung der Fühler nicht den Eindruck der Abnormalität.
- var. *Macarei* Dej. Kerzer Gebirge (Bielz); Negoi, Königstein, Bucsecs, Schlergebirge, Bodzaer Geb., Retjezat, Rodnagbirge (Deubel).
 var. *Ludovicus* Csiki. Rotenturm (Csiki).
 var. 5-costatus n. v. Schässburg. (In Wältern unter Baumrinden und Laub, c. a.); Kronstadt (col. Deubel).
 Die nene Varietät verdient wegen einiger wesentlicher Abweichungen von unseren Gebirgstromen Erwähnung und einen besonderen Namen. Das Hals-

schild ist schmäler und länger, der Seitenrand seiner ganzen Länge nach stärker aufgebogen, die Hintercken viel weniger nach abwärts gebogen, so dass der Hinterrand stärker ausgerandet erscheint. Die Flügeldecken besitzen die grösste Breite nicht hinter, sondern in oder vor der Mitte, in den Zwischenräumen der Grübchenreihen, deren Grübchen je drei Kiellinien unterbrechen, befinden sich fünf entwickelte, nicht unterbrochene Kiellinien. Während der Hals-schild in der Regel nach hinten deutlich ausgeschweift verengt ist, besitzt ein Exemplar einen beinahe quadratischen Halsschild, der nach hinten kaum merkbar verengt erscheint (a. quadratocollis).

a. *quadratocollis* m. Schässburg (c. a.).
(Phricocarabns.)

glabratus Payk. Götzenberg, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Törzburg, Bodzaer Pass, Gross-Schenk, S.-Regen, Kuhhorn, Klausenburg, Gyek (Bielz).

var. *punctatocostatus* Ilaury. Kerzer Geb. (Bielz).

var. *extensus* Kr. (breviusculus Kr.). Rotenturm, Bucsecs, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. *angustatus* n. v. Schässburg, Rotenturm, Kronstadt, Borszék (c. a.)

Carabus glabratns var. *angustatus* (Männchen und Weibchen). Von der Stammform, namentlich aber der Varietät *extensus*, durch schlankeren, schmalen Körper, von der ersten auch durch den lebhaften Glanz der Flügeldecken verschieden. Manche Stücke sind so schmal, dass sie auf den ersten Blick an *C. violaceus* var. Méhelyi oder var. *macilentus* m. erinnern, von welchen sie jedoch sicher durch breiteren gewölbteren, am Hinterrande nur schwach ausgerandeten Halsschild mit breiter aufgebogener Seitenrande, besonders aber durch den Besitz von nur zwei Borsten auf der Oberkante des zweiten Lippentastergliedes unterscheiden werden kann. Ein besonders schmales Exemplar (Männchen) ans dem Rotenturm besitzt auf dem zweiten Lippentastergliede drei Borsten. In der Penisform kann ich keinen Unterschied konstatieren. Von v. *subglabratns* Reitter unterscheidet sich diese Varietät durch feinere, verworrne Körnelung der Flügeldecken, keine Spur von gereihten Körnern, und höchstens an der Spitze mit einigen grösseren Körnchen und Grübchen, ebenso leicht aufgebogenem Seitenrand des Halsschildes wie bei der Stammform.

Nebriinae.

6. Leistus Frölich.

ferrugineus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

rufescens F. Schässburg (am Kokelufer unter Blättern im Ufergebüsch, Bielz, c. a.); Ujszékely (an der Kokel), Rodnagelbirge (c. a.).
(Pogenophorus.)

rufomarginatus Duft. Deva, Seliste, Präsbe, Gross-Schenk (Bielz); Rotenturm (Ormay); Schässburg (Witenberg, Wiesenberg, c. a.); Kronstadt (Scheeser).

nitidus Duft. Präsbe, Fogarascher Geb., Kronstadt (Bielz); Hátzeg Birge (Deubel).
(Oreobius.)

gracilis Fuss. Bucsecs (Bielz, Deubel, c. a.); Paringulgebirge, Retjezat (c. a.).

(Leistidins.)

picetus Fröl. Durch das ganze Berg- und Hügelland bis in die Gebirge (Wald-region); Kuhhorn (Ganglbauer).

alpicola Fuss. Frecker-, Bulca-Jäser, Bucsecs (Bielz); Kerzer Gebirge (Ormay); Präsbe (c. a.); Pietrosul (Müller).

7. Nebria Latr.

(Nebria Dan.)

livida L. An Flussufern. Hermannstadt, Harbach (Leschkirch), Altufer (Rotenturm, Kerz, Fogarasch, Bielz); Schässburg (Kokel, c. a.); Alsó-Rákos, Honigberg (Altufer, Deubel).

picicornis F. Rotenturm (Altufer), Kronstadt (Bielz); Kerz (Altufer, c. a.).

jokischii Sturm. Hátzeg (Deubel, vidit Ganglbauer).

var. *nigricornis* Villa. Schieltal (Skok), Paringul, Gurariu, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Hosszufalu, Rodna (Bielz); Schanta (Ormay).

Gyllenhali Schönh. Paringul, Piatra alba (Zibinsgebirge), Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Bucsecs, Hosszufalu (Bielz); Papolcz, Bodzaer Gebirge, Kovászna (Mébely); Rodnagabe. (Deubel).

Das Vorkommen der N. *Gyllenhali* auf dem Paringul und Kerzer Gebirge scheint mir zweifelhaft, da ich vom Kerzer Gebirge nur N. Heegeri besitze; ebenso zweifelhaft sind Bucsecs, Fogarascher und Zibins-Gebirge.

Heegeri Dej. Hátzeg Birge (Bielz); Retjezat, Kerzer Gebirge (Bulea, c. a.); Bucsecs, Zernerschter Geb. (Deubel); Ratsonya (Müller).

(Helobia.)

brevicollis F. (cursor Bedel). Hátzeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Marpol, Rotenturm, Fogarascher Geb., Schässburg (Bielz); Kerz (c. a.).
(Alpacus.)

carpathica Bielz. Paringul, Zibins-Jäser, Kristest (Bielz); Frecker Gebirge (Sorbota).

Fussii Bielz. Dees, Sátor (Stoikafalva); Magyar-Lapos, Oláhlaposbánya, Kapnikbánya, Czibles, Rodnagebirge (Bielz).

Reichi Dej. Paringul, Gurariu, Stefleste, Galbina, Kerzer Gebirge, Vistortal, Fogarascher Gebirge (Bielz); Präsbe, Bistra (Mühlbacher Gebirge, c. a.); Präsbe (Deubel).

var. *bissenica* Bielz. Surul, Frecker Geb., Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge (Bielz).

transsylvaniaica Germar. Paringul, Verfu lui Petru (Mühlbacher Gebirge), Surian, Zibinsgebirge, Zibinsjäser, Stefleste, Negovan, Sterpu, Galbina, Surul, Frecker Jäser, Negoi, Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge, Fogarascher Geb., Kronstädter Gebirge, Königstein, Bu-

csecs, Piatra - mare, Kelemen - Gebirge, Kuhhorn.
Soll auf dem Schulergebirge nicht vorkommen (Deubel).
a. *Ormayl* Ganglb. Mit der Stammform.
a. *alpigrada* Csiki. Karpathien.

Notiophilinae.

8. *Notiophilus Duméril.*

Da Bielz die zwei dem *N. aquaticus* und *palustris* ähnlichen Arten, *N. pusillus* Watterh. und *hypocrita* Putz nicht kannte, bleiben die vor ihm für die zwei ersten Arten angeführten Fundorte am besten aus.

pusillus Watterh. Schässburg, Karlsburg, Unterkerz, Hâtszeg, Hermannstadt, Bükk-szász (c. a.).

aquaticus L. Schuler - Gebirge, Bucecs, Retjezat (c. a.); Rodnagebirge, Nagy-hagymás (Deubel).

palustris Duft. Paringul, Előpatak, Schässburg, Balánbánya (c. a.).

hypocrita Putz. (laticollis Petri). Rotenturm, Bükk-szász, Tordaer Schlucht, Schässburg (c. a.); Negoi, Paringul, Rodnagelirge, Nagyhagymás (Deubel).

rufipes Curt. Hâtszeg, Kronstadt, Elő-patak (Bielz); Klausenburg, Borszék, Schässburg (c. a.).

biguttatus F. In Wältern durch das ganze Gebiet, in den Gebirgen bis oberhalb der Waldregion.

Omophroninae.

9. *Omophron Latr.*

In den Letten und im Sande an Flussufern.

limbatum F. Hammersdorf, Rotenturm, Kerz, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Klausenburg, Csáki-Gorbó (Bielz); Alsó-Rákos, Hâtszeg (c. a.); Rosenau (Deubel).

Elaphrinae.

10. *Blethisa Bonelli.*

multipunctata L. Reussener Teiche, Klausenburg, Gyéke (Bielz).

11. *Elaphrus Fabr.*

An Gewässern.

ullgnosus F. Hermannstadt, Hammersdorf, Szombat, Fogarasch, Gross-Schenk, Mediach, S.-Regen, Bistritz, Gyéke, Záh (Bielz); Rotenturm, Szamosujvár (Ormay); Schässburg (c. a.).

cupreus Duft. Szombat, Kronstadt, Sächsisch-Regen, Klausenburg (Bielz).

riparius L. Hermannstadt, Rotenturm, Szombat, Kronstadt, Sächsisch-Regen, Klausenburg, Csáki-Gorbó (Bielz).

Ulrichii Redtenb. Szombat, Kronstadt, S.-Regen, Klausenburg, Csáki-Gorbó (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schässburg, Alsó-Rákos, Naszód, Tordaer Schlucht (c. a.).

aureus Müll. Hâtszeg, Reussener Teiche, Rotenturm, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Iléviz, Schässburg, Sächsisch-Regen, Klausenburg, Dees (Bielz); Alsó-Rákos, Naszól, Unterkerz (c. a.); Hammersdorf, Szamosujvár (Ormay).

Lorocerinae.

12. *Lorocera Latr.*

pilioornis F. Hâtszeg, Götzenberg, Kronstadt, Schuler - Gebirge (?), Bodzaer Pass (Bielz); Rodnagebirge (c. a.); Honigberg (Altufer, Deubel).

Scaritinae.

13. *Clivina Latr.*

In der Erde grabende Tiere.

fossor L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

collaris Illst. Wie der vorige verbreitet.

14. *Dyschirius Bonelli.*

Die Arten leben, wie die der vorigen Gattung, grössten-teils an Gewässern.

digitatus Dej. Schässburg, Naszód (c. a.); Alsó-Rákos, Honigberg (Deubel).

latipennis Seidl. Rotenturm, (Altufer, Seidltz).

arenosus Steph. (thoracicus Bielz). Rotenturm, Szombat, Fogarasch, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz).

Nach Dr. Fleischer lebt diese Art auf Salzboden; daher scheint ein Teil der Fundorte, welche Bielz für diese Art angibt, nicht zuverlässig und eher auf *D. latipennis* Seidl. zu beziehen, wenigstens mit Bezug auf Rotenturm, Szombat und Fogarasch.

strumosus Er. Marosujvár, Torda. (Auf Salzboden, c. a.).

politus Dej. Kronstadt, Marienburg (Bielz); Schässburg, Unter-Kerz (c. a.); S.-Regen (Müller).

nitidus Dej. Dobra, Hermannstadt, Rotenturm, Poresest, Kronstadt, Marienburg b. Kr. (Bielz); Hammersdorf, Nagy-enyed (Ormay); Karlsburg, Unterkerz, Nussbach, Schässburg (c. a.).

Bonelli Putz. Karlsburg, Schässburg (c. a.); Honigberg (Altufer, Deubel).

Laertel Putz. (semistriatus Schaum nec Dej. nec Heer.). Karlsburg, Unterkerz, Schässburg, Rotenturm (Bielz, c. a.); Altufer (Deubel).

stomills Petri. Schässburg (Koke'ufer, c. a.); Rodnagebirge (Ganglbauer).

Die Art hat wohl die grösste Aehnlichkeit mit *D. intermedius* Putz., von dem sie sich nur durch feinere gegen die Spitze und die Seiten der Flügeldecke fast ganz erloschene Punktstreifen unterscheidet.

tensicollis Mars. (Fleischeri Deville). Torda (Salzboden, c. a.).

angustatus Ahr. Benzenzencz b. Broos (Bielz); Nagyenyed, Rotenturm, Schässburg (c. a.); Hâtszeg, Honigberg (Altufer, Deubel).

aeneus Dej. Dobra, Unter-Kerz, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Frecker Geb., Nagyenyed (c. a.); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Honigberg (Altufer, Deubel).

substriatus Duft. Dobra, Déva, Schässburg, Csáki-Gorbó (Bielz); Karlsburg, Rotenturm (c. a.).

ruficornis Putz. Karlsburg (Mieresch, Bielz, c. a.); Unter-Kerz, Bistra (am Mühlbach), Schässburg (Kokelufer, c. a.).

salinus Schaum. Déva, Salzburg, Nussbach (?), Eidisch, Zsabenitza (S.-Regen, Bielz); Marosujvár, Torda, Klausenburg (Umgebung, c. a.).

intermedius Putz. Nussbach, Rotenturm (Bielz); Schässburg (c. a.); Honigberg (Altufer, Deubel).

globosus Hbst. Hâtszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Rotenturm, Fogarasch (Bielz); Remete (Nagyenyed), Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rodnagebirge (alpin, Ganglbauer); Balánbánya, Schuler-Gebirge, Csukás, Dees, Unter-Kerz, Tordaer Schlucht, Paringul, Schässburg, Borszék (c. a.).

rufipes Dej. Gross-Scheuern (Bielz); Hammersdorf, Nagyenyed (Ormay); Baassen (Hutweide, c. a.); Hâtszeg, Honigberg (Altufer, Deubel).

laeviusculus Putz. Törzburg (Bielz); Schässburg (c. a.).

? **luteola** Chand. Déva (Salzboden, c. a.).

rotundipennis Chd. Gross-Scheuern (Bielz).

Broscinae.

15. Broscus Panz.

cephalotes L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

Bembidiinae.

16. Asaphidion Gozis.

(Tachypus Lap.)

An Gewässern und feuchten Orten.

caraboides Schrank. Hâtszeg, Hermannstadt, Talmesch, Rotenturm, Fogarasch, Marienburg b. Kr., S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Remete (Nagyenyed, Ormay); Schässburg, Nagyenyed, Tordaer Schlucht (c. a.); Kronstadt (Deubel).

pallipes Duft. Hâtszeg, Seliste, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Dees (Bielz); Schässburg, Bucsecs (c. a.); Nagyenyed, Kakova (Ormay).

flavipes L. Hâtszeg, Salzburg, Talmesch, Porcsest, Nussbach, Kronstadt, Törzburg, Előpatak, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay); Pilis (Nagyenyed, c. a.).

17. Bembidium Latr.

(Bracteon.)

striatum F. Hâtszeg, Girelsau, Rotenturm, Marienburg b. Kr. (Bielz); St. Annensee, Unter-Kerz (Altufer, c. a.); Kelenengebirge (Müller).

fornicatum Sturm. Hâtszeg, Unter-Kerz, Marienburg b. Kr., Schässburg, S.-Regen, Klausenburg, Dees (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm (c. a.); Honigberg (Deubel).

velox L. Hâtszeg, Rotenturm, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).

littorale Oliv. Rotenturm, Unter-Kerz, Kronstadt, Marienburg b. Kr., S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Hammersdorf, Remete (Nagyenyed, Ormay); Karlsburg (c. a.); Honigberg (Alt, Deubel).

(Pogonidium.)

taticolle Duft. Rotenturm, Birthälm, Mediasch, Klausenburg (Bielz); Schässburg (Kokel, c. a.).

(Chloridium.)

splendidum Sturm. Birthälm, Dees (Bielz); Schässburg (Kokel), Klausenburg (c. a.); Honigberg (Alt, Deubel).

(Neja.)

pygmaeum F. Hâtszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, Klausenburg (Bielz).

var. **bitunulatum** Bielz. Hâtszeg, Rotenturm, Fogarasch, Törzburg, Mediasch, Klausenburg (Bielz); Remete, Kakova, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt (Talinenberg, Deubel); Karlsburg, Schässburg, Nagyenyed (c. a.).

(Metallina.)

lampros Hbst. Durch das ganze Gebiet bis in die Gebirge.

var. **properaus** Steph. (velox Er., 14-striatum Thoms.). Mit der Stammform.

(Principium.)

punctulatum Drap. Surul, Ober-Sebes, Hosszuvalu (Bielz); Talmesch (Ormay); Rotenturm, St. Annensee, Naszód, Klausenburg, Unter-Kerz (c. a.); Honigberg (Alt, Deubel).

(Testidium.)

bipunctatum L. Neudorf b. H., Götzenberg, Fogarascher Gebirge (Bielz); Retjezat, Paringul, Kerzer Geb., Frecker Gebirge, Rodnagébirge (c. a.).

(Notaphus.)

dentellum Thbg. Klausenburg (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Baroth (Méhely); Nussbach, Marosujvár (c. a.); Honigberg (Deubel).

varlum Olio. Kronstadt, Nussbach (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Kakova (Ormay); Honigberg (Deubel); Marosujvár, Unter-Kerz (c. a.).

adustum Schaum. Salzburg, Rotenturm, Fogarasch, Gross-Schenk, Nussbach, S. Regen (Bielz); Hammersdorf, Nagyenyed (Ormay); Honigberg (Deubel); Schässburg (Kokel), Unter-Kerz (Alt, c. a.).

(Plataphodes.)

Fellmanni Mannh. Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Bucsees (c. a.).

(Plataphns.)

prasinum Duft. Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge (Bielz)

Hier scheint ein Irrtum vorzuliegen, da meine Exemplare von denselben Örtlichkeiten entschieden B. Fellmanni Mannh. sind; das Vorkommen des B. prasinum Duft. erscheint also sehr zweifelhaft.

(*Periphus*)

fasciolatum Duft. Hátszeg, Gurariu (Bielz); Alsó-Rákos, Borszék, Rotenturm, Retjezat (c. a.); Rodnagelirge (Deubel).

coeruleum Serv. Remete (Nagyenyed), Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

tricolor F. Hátszeg, Gurariu, Zood, Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge, Kronstadt, Törzburg, Marosgebirge, Borgoer Pass (Temeu, Bielz); Rotenturm, Kakova, Remete (Nagyenyed), Sebeshely, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Balánbánya, Ilvamika (Naszól, c. a.).

atrococeruleum S'eph. Borgoer Pass (Bielz); Kerzer Gebirge, Bulea (Ormay).

Das Vorkommen dieser dem westlichen Europa angehörigen Art bei uns scheint mir noch der Bestätigung zu bedürfen.

tibiale Duft. Gurariu, Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz); Schässburg, Ilvamika, Retjezat, Bistra, Balánbánya, Csukás, Szurduk-Pass (c. a.); Rodnagelirge (Ganzl auer).

fulvipes Sturm. Csáki-Gorbó, Borgoer Pass (Bielz).

testaceum Duft. Hátszeg, Hermannstadt, Rotenturm, Unter-Kerz, Marienburg b. Kr., Reps, Mediasch, Schässburg, S. Regen, Dees (Bielz); Nagyenyed (Ormay); Bistriz, Klausenburg, Ilvamika (Naszól). Nussbach (c. a.).

fluvatile Dej. Rotenturm, Fogarasch, Gross-Schenk (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Marienburg b. Kr. (c. a.).

Andreae Fr. Hátszeg, Rotenturm, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Schanta, Resinar, Remete (Ormay); Rodnagelirge (Ganglbauer); Balánbánya (c. a.).

var. **distinguendum** Duv. Reps (Bielz); Ilvamika (Naszód, c. a.).

var. **Bualli** Duv. Rodnagelirge (c. a.); Dees (Deubel?).

var. **temoratum** Sturm. Hátszeg, Gurariu, Zood, Marienburg bei Kr., Előpatak, Schässburg (Bielz); Kerzer Gebirge, Remete, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Déva, Ilvamika (Naszód), Unter-Kerz (c. a.).

ustulatum L. Hátszeg, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Marienburg b. Kr., Schässburg, Sächsisch-Regen (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay); Delunata (Mallász); Szurduk-Pass (c. a.).

rupestre L. Hátszeg, Szelsle, Gurariu, Bistriz (Bielz).

lunatum Duft. Kerz, Szombat (Bielz); Schässburg, Ujszékely (Kokel, c. a.); Honigberg (Altuser, Deubel).

bisignatum Men. Siebenbürgen (Bielz).

modestum F. Am Ufer stehender und fliessender Gewässer durch das ganze Hügel- und Bergland.

decorum Panz. Gurariu, Götzenberg, Gross-Schenk, Kronstadt (Bielz); Remete (Ormay); Alsó-Rákos, Balánbánya, Schässburg, Dees, Ilvamika (c. a.); Rodnagelirge (Deubel).

var. **alpinum** Dej. Frecker Gebirge (Sertoba), Rodnagelirge, Szurduk-Pass (c. a.).

dalmatinum Dej. Hermannstadt, Pilis (Nagyenyed), Tordaer Schlucht, Schässburg, Előpatak, Alsó-Rákos (c. a.); Rosenau (Bucsecs, subalpin), Vargyastal (Deubel).

brunnicorne Dej. Schässburg (Schleifen-graben, c. a.); Ilvamika (vidi); Predeal (Deubel).

Milleri Duv. Götzenberg, Előpatak (Bielz); Schässburg (Schleifenengraben, c. a.).

a. **brunneum**. Schässburg (c. a.).

B. Milleri Duv. a. **brunneum** m. Die meisten Exemplare aus Schässburg haben ganz braune Flügeldecken, oft auch braunen Halschild, es besitzt dann nur der Kopf eine schwärzliche Farbung; nicht selten wird auch dieser brann mit metallischem Schimmer, so dass der ganze Körper braun ist mit hellern Beinen, Fästern und ersten Fühlgliedern; für diese Abänderung schlage ich den Namen brunneum vor.

Stephensi Crotch. Schässburg, Ilvamika (Naszól, c. a.); Kronstadt (Deubel).

monticola Sturm. Rotenturm, Schässburg (c. a.); Vargyastal (Deubel); Detunata (Mallász).

transsylvaniaicum Bielz. Dees, Laposer Geb., Bistriz, Fogarasch (Bielz); Jaad (Bistr., c. a.).

Bielz führt als Fundort auch Schässburg an; da er aber B. brunnincorne nicht angibt, so liegt hier wahrscheinlich eine Verwechslung mit letzterer Art vor; ebenso wird es mit dem Fundorte Fogarasch sein.

var. **cardionotum** Puz. Zusammen mit der Stammform,

(*Synechostictus.*)

ruficorne Sturm. Götzenberg (Bielz); Nagy-Hagymás (Deubel).

Schässburg als Fundort ist zu streichen.

Mitterlanum Heyd. Kerzer Gebirge (Bielz); Balánbánya (c. a.); Rodnageb. (Ganglbauer); Hátzeg, Kronstadt (Deubel); Sebeshely (Broos, Ormay); Detunata (Mallász).

atrovioletaceum Duft. (*stomoides* Dej.). Kerzer Gebirge, Cskás, Rodnaberg, Paringul, Szováta (c. a.).

decoratum Duft. Gurariu, Fogarasch, Kronstadt (Bielz).

(*Pseudolimnaeum.*)

viridimicans Dan. Kerzer Gebirge (Ganglbauer); Bucsecs (Busten), Rodnaberg (Deubel).

(*Talanes.*)

aspericolte Germ. Baassen (Bielz).

(*Emphanes.*)

minimum F. Dobra, Hermannstadt, Mediasch, Schässburg (Bielz); Marosujvár, Malomvitz (Hátzeg, c. a.); Hammersdorf (Ormay).

var. **rivulare** Dej. Klausenburg (c. a.).

(*Testedilnum.*)

glaciale Heer. Zibinsjäser, Surul, Frecker Jäser, Kerzer Gebirge, Arpascher Geb., Bucsecs, Kuhhorn (Bielz); Frecker Geb. (Serbota), Paringul (c. a.)

(*Lopha.*)

quadriguttatum F. (*quadripustulatum* Serv.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Baassen, Schässburg, Maros-Ujvár, Rodnaberg (c. a.); Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay).

quadrinaculatum L. Hátzeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Zood, Kronstadt, Nussbach, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Paringul, Nagyenyed, Rotenturm (c. a.).

humerale Sturm. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

tenellum Er. Hátzeg, Fogarasch, Törzburg, Marienburg b. Kr., Héviz (Bielz); Ilavamika (Naszód), Nagyenyed, Karlsburg, Schässburg (c. a.); Honigberg (Alt-ufer), Dees (Deubel); Hammersdorf (Ormay).

a. **triste** Schilsky, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

Schüppeli Dej. Schässburg, Hermannstadt (c. a.); Balánbánya (Méhely); Rodnaberg (Deubel).

(*Trepaines.*)

Doris Gyll. Zood, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Kakova (Ormay).

articulatum Gyllh. Hátzeg, Neudorf b. II., Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Déva, Marosujvár, Baassen, Ilavamika (Naszód, c. a.); Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm, Gyögy (Bad, Ormay).

octomaculatum Goeze. Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Halvelagen (Weiher), Schässburg (Schleifengraben, c. a.).

(*Diplocampa.*)

assimile Gyllh. Schässb. (Atelshill, c. a.); Kronstadt (Deubel); Detunata (Mallász).

var. **fasciatum** m. Unter-Kerz, Klausenburg (Stadtteiche, c. a.).

B. assimile v. **fasciatum**. Kopf und Halsschild matt erzgrün, Flügeldecken hellbraun, mit gelber schiefer Querbinde hinter der Mitte, welche vnm Seitenrande bis zum dritten Streifen reicht, während die runde gelbe Makel der Stamniform vom Seitenrande bis etwa zum fünften Streifen reicht.

(*Philoctthus.*)

guttula F. Hermannstadt, Kronstadt, Sächsisch-Regen (Bielz); Hermannstadt, Kleinpold, Kakova, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

Bembidium obtusum F., welche Art Bielz für Schässburg anführt, ist irrtümlich in unser Verzeichnis gekommen, also zu streichen, obwohl ihr Vorkommen bei uns nicht ausgeschlossen ist.

Mannerheimi Sahlb. Hermannstadt, Schässburg (c. a.).

biguttatum F. Neudorf b. II., S.-Regen, Záh (Bielz); Honigberg (Altfuss), Marosujvár (c. a.); Hermannstadt, Talmesch, Szamosujvár (Ormay); Detunata (Mallász).

inoptatum Schaum. (*biguttatum* Redtenb.). Reps, Schässburg, Dees (c. a.); Szamosujvár (Méhely).

lunulatum Fourer. (*gutula* Redtenb.) Karlsburg, Marosujvár, Déva, Schässburg, Tordaer Schlucht, Dees (c. a.); Mező-Sámsond (Méhely).

18. *Tachys Stephens.*

bistriatus Duft. Hátzeg, Dobra, Salzburg, Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Törzburg, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Rotenturm (c. a.); Rodnaberg (Deubel); Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

a. **rufulus** Rey. Schässburg (c. a.).

micros Fisch. (*gregarius* Chaud.). Hermannstadt (Bielz); Rotenturm, Unter-Kerz, Szováta (c. a.).

scutellaris Steph. Szamosfalva (Bielz).

var. **laticollis** n. v. Déva, Torda (c. a.).

T. *soutellaris* v. *laticollis*. Länge 2-2.3 mm. Ausser durch geringere Grösse unterscheiden sich unsere Tiere von zwei aus Eisleben stammenden Exemplaren meiner Sammlung durch breiteren, an den Seiten vorn stärker gerundeten, nach hinten stärker verengten, gewölbteneren und glänzenderen Halsschild mit durchwegs ziemlich deutlicher Mittelfurche und seitlichem Quereindruck hinter dem Vorderrande; vor den Hinterwinkeln sind die Seiten kaum ausgebuchtet und diese selbst stumpfwinklig infolge der heiderseitigen Abschrägung des Hinterrandes. Die Farbung der Flügeldecken ist im allgemeinen dunkler, bei den meisten Exemplaren sind dieselben ganz braun.

Tachyura.

parvulus Dej. Nagyág, Neudorf bei H. (Bielz); Alsó-Rákos, Baassen, Bükk-szász (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

var. *curvimanus* Woll. Schässburg, Nagyenyed (c. a.).
quadrlsignatus Duft. Hâtszeg, Zood, Talmesch, Porcesset, Kerzer Gelirge, Mediasch, Dees (Bielz); Rotenturm, Unter-Kerz (c. a.); Kakova, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).
sexstrialis Duft.

var. *politus* n. var. Rotenturm, Baassen, Schässburg (c. a.).

T. *sexstratus* var. *politus*. Ich habe diese Art früher für Varietät *bishimaculatus* Cheor. (*tetrigraphus* Reitter, *diabachys* Schanm nec *Kolenati*) gehalten, welche dennoch aus unserm Verzeichnis zu streichen ist. Sie besitzt die Färbung und Zeichnung der Varietät *bishimaculatus* Cheor., unterscheidet sich aber von dieser, sowie von der Stammform durch die wie bei T. *quadrasignatus* Duft kraftig punktierten, an der Basis und vor der Spitze abgekürzten, stark vertieften drei Streifen der Flügeldecken; der vierte Streifen ist nur angedeutet.

var. *crux* Putz. Rodnagelirge (Bielz); Rotenturm (c. a.).

19. *Tachyta Kirby.*

nana Gyll. Durch das ganze Gebiet unter Baumrinden.

Trechinae.

Trechl.

20. *Perileptus Schaum.*

Am Ufer von Flüssen.

areolatus Creutz. Déva, Rotenturm, Reps. S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Unter-Kerz, Alsó-Rákos, Rodnagelirge (c. a.); Bistritz, Kronstadt, Balánbánya (Deubel).

21. *Thalassophilus Wollaston.*

longicornis Sturm. Klausenburg (Bielz); Alsó-Rákos (c. a.).

22. *Trechus Clairv.*

(*Trechoblemus*.)

micros Ilbst. Neudorf b. H., Fogarasch (Bielz); Rodnagelirge (Ganglbauer); Malomvitz (Lunka negru, Deubel).

(*Lasiotrechus*.)

discus F. Rotenturm, Kronstadt, Marienburg b. Kr., Schässburg, Marosgebirge (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Üjszékely (c. a.); Vargyas (Deubel); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).
 (Trechus s. str.)

quadriflarius Schrnk. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

var. *obtusus* Er. Kerzer Gebirge (Bielz). *nlgrinus* Putz. Szurul (Bielz).

rubens F. Präsbe (Bielz); Zibinsgebirge (Ormay); Előpatak, Szováta, Schässburg (c. a.); Obertömös (Deubel); Rodnagelirge (Ganglbauer).

americus (sculptus Schm.) Fairm. Előpatak (c. a.); Rodnagelirge (Bielz). *subnotatus* Dej.

var. *cardioiderus* Putz. (palpalis Dej.). Kerzer Gelirge, Kronstadt, Borgen Pass, Rodnagelirge (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Paringul, Puj (bei Hâtszeg), Schulergelirge, Csukás (c. a.); Rotenturm, Gyögy (Ormay).

latus Putz. Götzenberg, Präsbe, Surul (Bielz); Kerzer Gebirge, Malomvitz, Retjezat, Paringul, Schässburg (Wolkendorfer Grund, Schowesgraben), Balánbánya, Borszék, Rodnagelirge (c. a.); Schuler-Gebirge (Deubel); Schanta, Porkovicza, Gyögy (Ormay).

fontinalis Rybinski. Rodnagelirge (c. a.). Diese Art ist dem Tr. *latus* Putz sehr ähnlich, aber leicht von ihm zu unterscheiden durch das verdickte erste Glied der Hintertarsen.

insclitus K. Daniel. Oestliche Karpaten. *plicatus* Mill. Rodnagelirge (c. a., teste Ganglbauer).

Dejeani Putz. Retjezat, Paringul, Frecker Gebirge (Serbota). Kerzer Gebirge (Bulea, c. a.); Mühlbacher Gebirge, Zibinsgebirge, Surul, Königstein, Kelenengelirge (Bielz).

Tr. *dejeani* Putz wird im Rodnagelirge von Tr. *plicatus* Mill. vertreten.

banaticus Dej. Retjezat? (Deubel).

Bielz hat diese Art mit Tr. *Dejeani* Putz verwechselt, wie er Tr. *plicatus* Mill. mit Tr. *Dejeani* verwechselte. Tr. *banaticus* Dej. ist eine noch nicht sicher geklärte Art aus den Banater Bergen.

striatus Putz. Rodnagelirge (c. a., Ganglbauer).

Tr. *striatus* Putz, *pulchellus* Putz und *carpathicus* Rybinski mit var *breviusculus* Dan., von denen die beiden letzteren Bielz unkenntlich waren, sind einander nahe verwandt, die letztere Art mit Tr. *striatus* Putz oder eher mit Tr. *pulchellus* zusammengeworfen worden; daher führe ich für dieselben nur die neueren, mir bekannten Fundorte an.

marginalis Schaum. Hâtszeg (Piatra Sipotubui, Bielz); Malomvitz, Retjezat, Bucecs, Schuler-Gebirge (c. a.); Rosenauer Geb. (Deubel); Schanta, Präsbe, Porkovicza, Kerzer Gebirge (Ormay).

rhenensis Kaufmann. Siebenbürgen.

pulchellus Putz. Paringulgebirge, Frecker Gebirge (Serbota), Kerzer Geb. (Glasbüttel), Borszék, Rodnagelirge (c. a.).

carpathicus Rybinski. Balánbánya, Schuler-Gebirge, Bucecs, Rodnagelirge (c. a.).

var. *breviusculus* Dan. Csukás, Rodnagelirge? (c. a.).

ormayi Ganglb. Rotenturm, Bülös (c. a.); Schuler-Gebirge, Bodzaer Gebirge, Zernester Gebirge, Vargystal (Deubel).

Bielz führt auch an Tr. *Perthyi* Heer von Resinar, Surul und Görgénygebirge und Tr. *Longhii* Com. von Csáki-Gorhó, die bei uns sicher nicht vorkommen; ebenso Tr. *rotundipennis* Duft (Präsbe, Fogarascher, Kerzer Gebirge), Tr. *eroaticus* Dej. Fogarasch und Tr. *rotundatus* Dej. (Kerzer Gebirge).

procerus Putz. Surul, Frecker Gebirge, Negoi, Kerzer Gebirge, Arpascher, Fogarascher, Rodnagelirge (Bielz); Bucecs, Plaju foi (Zernest, Deubel).

corpulentus Wse. Präsbe (Bielz).
subterraneus Mill. Rodnagebirge (Bielz); Roreul (jenseits der Grenze in der Bukowina, Deubel).
ruthenus Reitter. Rodnagebirge (Kuhhorn, c. a.).
Kimakoviczi Ganglb. Frecker Geb. (Serbota), Kerzer Gebirge (Buleatal, an der Grenze und oberhalb der Baumregion, c. a.).

23. *Anophthalmus Sturm.*

(Divalinis.)
pseudoparoecus Csiki. Höhle bei Zalatna (Preszaka, c. a.).
Sziladyi Csiki. Höhle bei St. György im Erzgellirge (c. a.).
Dieneri Csiki. Bucsecs (Deubel, Csiki 1910); Rovartani Lapok, XVII. 5—8. füz. 1910.
Mallászi Csiki. Detunata.
Deubeli Ganglb. Retjezat (Zenoga-See, c. a.).
Deubelianus Csiki. Königstein (Valea Vlăduci a lui Tamas, Deubel).
gracilis n. sp. Kerzer Gebirge (Butianu, Lakutz, c. a.).

Anophthalmus gracilis. Long. 3'2 mm. Nitidus, testaceus, glaber, A. Deubeliado Csikii proximus, sed magnitudine minore, striis septem elytornim imprimis distinctus. Caput rotundatum, temporibus param convexis, solcis frontalibus usque ad stricturam capitis extensis, arcuatis, profundis; Oculi, pigmento non infecti, rotundi. Antennae breves, apicem versus incrassatas, articulo secundo quarto baud breviore. Prothorax capite vix latior, subcordatus, latitudine maxima brevior, lateribus basin versus leviter arcuatis, ante basin rectis, acutis, margine lateraliter subtiliter reflexo, dorso medio sulcato, intra angulos posticos vix excavatus. Elytra subparallela, lateribus medio parum rotundato ampliatis, humeris convexis, apice conjunctim rotundata, striis septem punctatis, duobus internis profundis, exteris subtilioribus, instructa, stria tercia forevis tribus, primo pone basin, secundo in medio, tertio ante apicem impressa.

Die neue Art steht entschieden dem mir unbekannten A. Deubelianus Csiki am nächsten, unterscheidet sich jedoch von demselben durch geringere Grösse (3'2 mm gegen 4'3 mm), deutliche sieben Punktstreifen der Flügeldecken, gleichlanges zweites und viertes Fühlerglied, der Beschreibung nach abweichende Kopfform und kurze Fühler. Sie nähert sich einigermassen auch dem Trechus Kimakoviczi Ganglb., von dem sie durch geringere Grösse, pigmentlose Augen, wesentlich schmäleren Kopf und Halschild und schmäler abgesetzten Seitenrand des letzteren abweicht. Von A. Deubeli Ganglb. unterscheidet sie sich durch geringere Grösse, weniger gleichbreite Gestalt, wesentlich schmäleren Kopf und Halschild, kürzere Fühler, stärker convex gerundete Schultern usw.

Csiki gibt nicht an, ob bei A. Deubelianus die Spitze der Flügeldecken einzeln oder zusammen abgerundet ist; da er sie mit A. Deubeli vergleicht, muss ich ersteres annehmen, und dann wäre dieses ein weiteres gutes Unterscheidungsmerkmal, da sie bei der neuen Art zusammen abgerundet sind.

Merkli Friv. Malomvitz (Hátszeg, Lunka negru); Paringulgebirge (Karsia, c. a.).
dacieus Friv.
var. **malomvicensis** Ganglb. Malomvitz (Hátszeg, Lunka negru, c. a.).
Dletti Ganglb. Zibinsgebirge (Vurfu mare, Csiki).
ovatluga Ganglb. Paringulgebirge (Baumgrenze, c. a.).

Budae Kenderesy. Höhle bei Ponoriciu (Hátszeg, c. a.).

Ganglbauer gibt die Grösse des A. Budae Kend. mit 5 mm an; mein Exemplar hat nur eine Länge von 4'6 mm.

Bielz führt auch A. Redtenbacheri Friv. ans einer Höhle bei Nagyenyed (Remete) an, doch dürfte diese Art bei uns nicht vorkommen, und eher A. Sziladyi Csiki oder eine neue Art in dieser Höhle leben.

Bielzi Seidl. Fogarascher Gebirge (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

var. **transylvanicus** Csiki. (pilosellus Ganglbauer, Miller). Schuler-Gebirge, Csukás, Vargyastal (in der Umgebung der Almascher Höhle, c. a.); Rodnagé, Bucsecs, Flintschhöhle bei Rosenau, Nagyhagymás (Deubel). Am Csukás fand ich zwei Exemplare unter den Wurzeln eines Eichenstumpfes.

var. **pilosellus** Mill. Rodnagebirge (Szaka, Deubel, 1 Exemplar).

24. *Epaphius Samouelle.*

secalis Payk. Petrozsény, Hermannstadt, Schässburg, Oláhfalu, Klausenburg (Bielz).

Patrobi.

25. *Patrobus Stephens.*

excavatus Payk. Schieltal, Zalatna, Mediasch, Fogarasch, Kronstadt, Bükszad, Ojtoz - Pass, Oláhfalu, Rojna - Gebirge (Kuhhorn, Bielz); Malomvitz, Előpatak, Schässburg (c. a.); Honigberg (Alt-ufer, Deubel); Hermannstadt, Torda, Gyógy (Ormay).

quadricollis Mill. Kerzer Gebirge, Bucsecs, Schuler-Gebirge, Tömöser Pass, Piatra Mare, Csukás, Tesla, Dongókő, Bodzaer Pass, Rodnagébirge (Bielz).

26. *Deltomerus Motsch.*

carpathicus Mill. Rodnagébirge (Bielz).

Pogoninae.

Leben ausschliesslich auf Salzboden.

27. *Pogonus Dej.*

Iuridipennis Germ. Szamosfalva, Kolos, Zabenica (S. - Regen, Bielz); Marosujvár, Déva (c. a.); Torda (Ormay).

iridipennis Nic. Déva, Salzburg, Szamosfalva, Kolos, Zabenica (Bielz); Marosujvár, Torda (c. a.).

chalceus Marsh. Persány (Bielz).

riparius Dej. Déva, Salzburg, Szamosfalva, Eidsch, Zabenica (Bielz); Szováta (c. a.).

persicus Chd.

var. **Peisonis** Ganglb. Déva, Baassen, Marosujvár (c. a.).

(Pogonistes.)

depreseus Motsch. Torda (c. a.).

Panagaeinae.

28. Panagaeus Latr.

- erux major** L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
 a. **Schaumi.** Schässburg, Előpatak (c. a.).
 a. **trimaculatus** Dej. Fogarasch, Schässburg (Bielz).
bipustulatus F. Hlászeg, Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Reschmar, Szelistye, Rotenturm, Salzburg, Szamosujvár (Ormay).

Chlaeniinae.

29. Chlaenius Bonelli.

An den Ufern der Gewässer und souchten Orten.
 (Chlaenites)

- spoliatus** Rossi. Salzburg b. H., Reussener Teiche, Girelsau, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay).

(Dinodes.)

- decipiens** Dufour (azureus Duft) Altufer bei Fogarasch (Bielz).

(Chlaenius i. sp.)

- festivus** F. Déva, Fogarasch, Mediasch, Gyéke (Bielz); Szamosujvár (Ormay).

- vestitus** Payk. (viridipunctatus Goeze.). Hlászeg, Hermannstadt, Neudorf bei H., Leschkirch, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Mediasch, S.-Regen, Schässburg, Dees, Gyéke (Bielz); Ober-Kerz, Rotenturm, Remete (Nagyenyed), Szamosujvár (Ormay).

- nitidulus** Schrnk. Am Ufer süßer Gewässer durch das ganze Berg- und Hügelland.

- nigricornis** F. Hermannstadt, Neudorf b. H., Gross-Schenk, S.-Regen, Gyéke (Bielz); Balánhánya (Deubel); Pókafalva (Unterweissenburger Komitat), Szamosujvár (Ormay).

- tristis** Schall. Déva, Reussener Teiche, Gyéke (Bielz); Hermannstadt, Dálnok (Háromszék, Ormay).

30. Callistus Bonelli.

- lunatus** F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

Oodinae.

31. Oodes Bonelli.

- heloploides** F. Hermannstadt, Kronstadt, Marosgebirge, Bistritz, Záh (Bielz).
gracilis Villa Rodna (Bielz); Schässburg (Röhricht im Atelsloch, c. a.); Kronstadt (Gesprenge, Deubel).

Licininae.

32. Badister Dej.

- unipustulatus** Bon. Hlászeg, Záh (Bielz); Reps, Nagyenyed, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
bipustulatus F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
 a. **binotatus** Fischer. Karlsburg (c. a.).
sodalis Duft. Hermannstadt, Grossscheuern, Hosszufalu, Klausenburg (Bielz); Schässburg, Előpatak (c. a.); Kronstadt, Honigherg (Altufer, Deubel).
 (Baudia.)
peltatus Panz. Kronstadt (Bielz); Honigberg (Altufer, Deubel).

33. Licinus Latreille.

(Neorescins.)

- Hoffmannseggii** Panz. Schieltal, Götznerberg, Präsbe, Porcsest, Frecker Geb., Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Königstein, Bucsecs, Tesla, Dongókő, Bozauer Pass, Sächs.-Regen, Marosgebirge (Bielz); Zalatna (Prázsaka), Bistra, Csukás, Büdös, Annensee, Retjezal, Schässburg, Schuler-Gebirge (c. a.); Schanta (Ormay).

(Licinus s. str.)

- cassideus** F. Déva, Fogarasch, Marosgebirge, Klausenburg (Bielz); Schässburg, Hlászeg, Puj (c. a.).

- depressus** Payk. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

Amblystominae.

34. Amblystomus Erichs.

- metallescens** Dej. Hermannstadt (Ormay).

Harpalinae.

Daptini.

35. Daptus Fischer.

- vittatus** Fisch. Déva (c. a.).
 a. **Kominekil** Bielz, Dóva, Eidisch (Birthler), Zsabenitza (Bielz).

36. Ophonus Stephens.

(Ophonus s. str.)

- obscurus** F. (columbinus Germ.). Salzburg, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Schässburg, Záh (Bielz); Alsó-Rákos, Pilis (Nagyenyed, c. a.).
sabulicola Panz. Déva, Birthlám, Mediasch, Schässburg, Klausenburg, S.-Regen (Bielz).

diffinis Dej. Előpatak (Bielz).

Das Vorkommen des *O. diffinis* Dej. in Siebenbürgen dürfte nicht genügend verbürgt sein. (Tachyophonus.)

rupicola Sturm. Mühlbach, Neudorf b. H., Götzemberg, Rotenturm, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Klausenburg (c. a.).

punctatulus Duft. (Iatcollis Mannh.). Kronstadt, Bükkzad, Marosgebirge, Bistritz, Gross-Scheuern, Mediasch, Hargita, Olahfalu (Bielz); Déva, Schässburg (c. a.); Szamosujvar (Ormay).

cordatus Duft. Präsbe, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

puncticollis Payk. Paringul, Götzemberg, Kerz, Kronstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg, Reps, Pilis (bei Nagyenyed, c. a.); Hermannstadt, Rotenturm, Magyar-Bükkös, Remete (b. Nagyenyed, Ormay).

brevicollis Serv. Paringul, Kerzer Geb., Zah (Bielz); Schässburg (c. a.).

var. ***parallelus*** Dej. Hammersdorf (Bielz).

azureus F. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

var. ***coeruleipennis*** Men. Rotenturm (Ormay).

cribricollis Dej. Kronstadt (Bielz).

signaticornis Duft. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Klausenburg (c. a.).

(Paraphonus.)

mendax Rossi. Déva, Hunyad (Bielz).

(Pseudophonous.)

maculicornis Duft. Kronstadt (Bielz); Rotenturm (Ormay).

var. ***complanatus*** Dej. Hatszeg, Birthalm, Mediasch, Schässburg (Kokelufufer, Bielz); Honigberg (Altufer, Deubel). (Pardileus.)

griseus Panz. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

pubescens Müll. Ebenso.

(Harpalophonus.)

calceatus Duft. Gross-Scheuern, Hosszu-falu, S.-Regen (Bielz); Kakova (Ormay).

hospes Sturm. Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Szamosujvar (Ormay).

var. ***Sturmi*** Dej. Hatszeg, Déva, Salzburg, Fogarasch, Hosszu-falu, Borszek, Zah (Bielz); Marosujvar (c. a.).

37. *Harpalus Latreille.*

aeneus F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. ***confusus*** Dej. Schässburg, Borszek (Bielz); Déva, Nussbach (c. a.); Rotenturm, Ober-Kerz, Szamosujvar (Ormay); Kronstadt (Deubel).

var. ***semipunctatus*** Dej. Schässburg (c. a.).

var. ***limbopunctatus*** Fuss. Hargita, Borszek (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Szakadat, Ober-Kerz, Rotenturm, Remete, Szamosujvar (Ormay); Olah-

falu, Rodna, Schuler-Gebirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. ***interstitialis*** Gredl. Déva (c. a.).

(Lasioharpalus.)

distinguendus Duft. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, auf Feldern.

smaragdinus Duft. Déva, Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Hosszu-falu, Hargita, S.-Regen, Zah (Bielz).

cupreus Dej. Déva, Salzburg, Hammersdorf, Gross-Schenk, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).

dimidiatus Rossi. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

(Harpaloxys.)

rufus Brüggem. Rotenturm, Kronstadt, Reps (Bielz); Torda, Gyeres (c. a.).

atratus Latr. Hermannstadt, Neudorf b. H., Kronstadt (Bielz); Hatszeg, Szurduk-Pass, Déva, Torda, Tordaer Schlucht, Rodnagbirge (c. a.); Rotenturm, Szamosujvar (Ormay).

var. ***subsinuatus*** Duft. Tordaer Schlucht (c. a.).

pygmaeus Dej. Déva (c. a.); Salzburg (Ormay). (Amblystus.)

latus L. Hermannstadt, Kronstadt, Tartlau, Schässburg, Olahfalu, S.-Regen, Borszek, Zah (Bielz); Déva, Nagyenyed, Rodnagbirge (c. a.); Michelsberg, Rotenturm, Ober-Kerz, Szamosujvar (Ormay.).

luteicornis Duft. Déva, Hermannstadt, Resinar, Kronstadt (Bielz); Klausenburg, Schässburg (c. a.); Rotenturm, Kerzer Gebirge (Ormay).

quadripunctatus Dej. Präsbe, Kerzer Gebirge (Bielz); Szurduk-Pass, Bistra, Rodna-Gebirge (c. a.); Hammersdorf, Schanta (Ormay).

rubripes Duft. Gross-Scheuern, Präsbe, Rotenturm, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Elopatak, Karlsburg, Pilis (Nagyenyed), Olahfalu (c. a.).

var. ***sobrinus*** Dej. Kronstadt (Bielz). (Harpaloderus.)

honestus Duft. Karlburg, Hatszeg, Szurduk-Pass, Schässburg, Borszek, Tordaer Schlucht, Déva, Nussbach (c. a.); Zernest, Honigberg (Altufer, Deubel). Da Bielz H. honestus Duft. und H. rufitarsis Duft. nicht von einander trennen konnte, sind seine Fundortangaben nicht verwendbar.

rufitarsis Duft. Karlburg (c. a.); Rodnagelirge (Deubel). (Harpalobius.)

neglectus Serv. Hermannstadt (Bielz); Kerzer Gebirge (Ormay.).

tuscicarpis Sturm. Kerzer Gebirge (Bielz).

Fröhlichi Sturm. Hermannstadt (Alter Berg, Bielz).

autumnalis Duft. Zood, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Tordaer Schlucht (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm, Ober-Kerz, Grossau (Ormay); Kronstadt (Deubel).

hlrites Panz. Hargita, S.-Regen, Záh, Gyeke (Bielz).
zabroides Dej. Torda (Deubel).
servus Duft. Déva, Kronstadt, Dees (Bielz); Retjezat (c. a.).
flavicornis Dej. Schässburg (Bielz); Karlsburg (c. a.).
tardus Panz. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
modestus Dej. Záh (Bielz); Karlsburg, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
anxius Duft. Hlászeg, Déva, Gross-Scheuern, Záh, Gyeke (Bielz); Karlsburg, Pilis (Nagyenyed), Nagyenyed (c. a.).
taefurnus Dej. Siebenbürgen.
 Siehe *Cata'ogus eo'opto:orum Europae etc.* Heyden etc. 1906, col. 68.
serripes Quens. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
 (Actephilus.)
picipennis Duft. Déva, Gross-Scheuern, Resinari, Marienburg b. Kr., Gyeke (Bielz); Karlsburg, Hermannstadt, Örlat, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
 (Microderes.)
scarifides Sturm. Klausenburg (Bielz).

Aenopalpini.

38. Trichotichnus Morawitz.

laevicollis Duft. (*satyrus* Strm.). In unseren Gebirgen.

39. Stenolophus Dej.

teutonus Schrnk. Hlászeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Reussener Teiche, Gross-Schenk, Hláz, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Borszék (Bielz); Pilis (Nagyenyed), Déva (c. a.); Hammersdorf, Rotenturm, Kerzer Gebirge (Ormay).
Skrimshiranus Steph. Gross-Schenk, Schässburg, S.-Regen, Záh, Gyeke (Bielz); Marosujvár (c. a.).
a. affinis Bach. Marosujvár, Puj (Hlászeg, c. a.).
discophorus Fisch. Kronstadt, Klausenburg (Bielz); Hosszuvalu, Schässburg (Kokelusfer, c. a.).
 var. *flaviscutulus* Motsch. Unter-Kerz, Schässburg (c. a.).
Steveni Kryn. Hammersdorf (Bachusfer), Reussener Teiche, Klausenburg, Gyeke (Bielz); Hermannstadt (Ormay).
mixtus Ilbst Hermannstadt, Schässburg, Záh (Bielz); Hlászeg (Deubel).
 var. *Ziegleri* Panz. Schässburg (c. a.).

40. Aenopalpus Dej.

flavicollis Strm. Dobra, Hammersdorf, Rotenturm, Fogarasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Unter-Kerz (c. a.); Kronstadt (Deubel); Torda.

brunnipes Sturm. Dobra (Bielz).
interstitialis Reitter. Déva (c. a.).
suturalis Dej. Szamosujvár (Ormay).
meridionalis L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
dorsalis F. Fogarasch (Altusfer, Bielz); Kronstadt (Deubel).
luteatus Duft. Kronstadt.
exiguus Dej. Gross-Scheuern, Mediasch, S.-Regen (Bielz).

41. Anthracus Motschulsky.

longicornis Schaum. Marosujvár (c. a.).
consputus Duft. Ilonigberg (Altfluss, Deubel).

42. Bradycellus Erichs.

harpalinus Serv. Schi-Ital (Bielz); Schässburg (c. a.); Rotenturm (Ormay); Schulgebirge, Rodnagelbirge (Deubel).
collaris Payk. Schässburg, Birthähm (Bielz); Baassen, Borszék (c. a.); Rönagebirge, Nagyhagymás (Deubel).

43. Dichirotrichus Duev.

pubescens Payk. Mühlbach, Salzburg, Szamosfalva, Kronstadt, Torda, Dees-Akna, Szováta (c. a.); Hermannstadt (Ormay), N.-Eilisch.
 var. *ustulatus* Dej. Salzburg, Szamosfalva (Bielz).
obsoletus Dij. Grossschenk (Bielz).

Das Vorkommen dieser dem südlichsten Europa angehörigen Art dürfte kaum wahrscheinlich sein, jedenfalls aber weiterer Belege bedürfen.

Anisodactylini.

44. Diachromns Erichs.

germanus L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

45. Anisodactylus Dejean.

(Hexatrichus.)
poeциloides Steph. Torda (Bielz, c. a.); Kronstadt (Deubel).
 (Anisodactylus s. str.)
binotatus F. Durch das ganze Gebiet.
 var. *spurcaticornis* Dej. Wie die Stammform.
nemorivagus Duft. Durch das ganze Gebiet.
signatus Panz. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

Zabrinae.

46. Zabrus Clairville.

tenebrioides Goeze. Hermannstadt, Salzburg, Kronstadt, Hosszuvalu, S.-Regen, Klausenburg (Bielz).

Amarlinae.

47. Amara Bonelli.

(Triaena.)

fulvipes Serv. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Szamosujvár (Ormay).

concinna Zimm. (amalilis Hampe). Salzburg, S.-Regen (Bielz); Ober-Kerz (Ormay).

tricuspidata Dej. Freck, Kronstadt (Bielz); Retjezat, Malomiviz, Rotenturm, Petrosény, Ponor (Hátszeg, c. a.); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).

plebeja Gyllh. Kronstadt (Bielz); Petrosény, Schässburg (auf Grasrispen), Nieder-Eidisch (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

(Amara s. str.)

similata Gyllh. Hammersdorf, Gross-Scheuern, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Záh, Gyeke (Bielz); Nagyenyed, Borszék (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

ovata F. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Retjezat, Rodnageb. (c. a.); Kronstadt (Deubel); Rotenturm, Schanta (Ormay).

a. **adamantina** Kolenati. Schässburg (c. a.).

saphyrea Dej. Déva (Bielz).

monifaga Sturm. Präsbe, Kronstädter Geb. (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Borszék (c. a.); Hermannstadt, Hammersdorf, Szelište (Ormay); Schuler - Gebirge (Deubel).

nitida Sturm. Hátszeg, Präsbe, Reps, S.-Regen (Bielz); Retjezat, Rotenturm, Schässburg, Rodnagebirge (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

communis Panz. Durch das ganze Gebiet.

convexior Steph. Schässburg, Pilis (Nagyenyed, c. a.); Kronstadt, Zernest, Tüsnad (Deubel).

lunicollis Schiölte. Hermannstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Rodnagebirge (c. a.); Porumbacher Gebirge, Nagyág (Ormay).

Schimperi Wenck. Bucsecs, Rodnagebirge (c. a.); Vale vinului (Rodnagebirge, Ganglbauer).

curta Dej. Schieltal, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Heitau, Fogarasch, Nussbach (Bielz); Karlsburg, Ro Inagebirge, Alsó-Rákos (c. a.); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt, Nagyhagymás (Deubel); Detunata (Mallász).

aenea Degeer. Durch das ganze Gebiet.

spreta Dej. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Schanta, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt, Zernest (Deubel).

famelica Zimm. Kerzer Gebirge (Bielz); Rodnagebirge, Marosujvár (c. a.).

eurynota Panz. (vulgaris F.). Hermannstadt, Schässburg, Rodna, Záh (Bielz); Karls-

burg, Baassen (c. a.); Ober-Kerz, Miriszlo (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Kronstadt, Schuler - Gebirge (Deubel).

familiaris Duft. Durch das ganze Gebiet. **anthobia**. Villa Déva (c. a.).

lucida Duft. Kronstadt (Bielz); Schässburg, Marosujvár (c. a.).

tibialis Payk. Gross-Scheuern, Oláhfalu (Bielz); Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Ormay); Borszék (c. a.).

(Celia.)

ingenua Duft. Déva, Hermannstadt, Sächsisch-Regen, Záh (Bielz); Schässburg, Baasseu, Borszék (c. a.).

cursitans Zimm. Schässburg, Pilis (Nagyenyed, c. a.).

municipalis Mill. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Hátszeg (Deubel); Schässburg (c. a.).

misella Mill. Zibinsgebirge, Surul, Frecker Gebirge, Kerzer Geb., Bucsecs, Piatra mare, Csukás (Bielz); Rodnagebirge (Ganglbauer, c. a.).

erratica Duft. Hermannstadt, Borszék, Dees (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Retjezat, Paringul (c. a.); Bucsecs, Nagyhagymás (Deubel); Arpascher Gebirge (Ormay); Rodnagebirge (Ganglbauer).

Quenseli Schönh. Bucsecs (Deubel, c. a.).

bifrons Gyll. (livida F.). Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Reps, Klausenburg (Bielz); Kronstadt (Deubel); Karlsburg, Reps (c. a.).

(Aerodon.)

brunnea Gyll. Kronstadt (Bielz).

(Bradytus.)

apricaria Payk. Hermannstadt, Michelsberg, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszuvalu, Dees, Záh (Bielz); Schässburg, Klausenburg, Bistritz (c. a.); Salzburg, Nagyenyed (Ormay).

fulva Dej. Hermannstadt, Zood, Mediasch, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Rotenturm (c. a.); Hammersdorf, Miriszlo (Unterweissenburger Komitat, Ormay); S.-Regen, Bistritz.

censularis Duft. Hermannstadt, Götzemberg, Arpascher Gebirge, Kronstadt, Hosszuvalu, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Nagyenyed (c. a.).

(Cyrtotonus.)

aulica Panz. Csih, Götzemberg, Mediasch, Schässburg, Nussbach, Krizlia, Kelemengebirge, Klausenburg (Bielz); Unter-Kerz, Előpatak, Klausenburg, Rodnagelbirge (c. a.); Vargyastal (Deubel); Hermannstadt, Hammersdorf, Bistra (Ormay).

convexuscula Marsh. Hosszuvalu, Záh (Bielz).

(Lerides.)

nobilis Duft. Kronstadt (Bielz).

(Percosia.)

equesiris Duft. Unter-Kerz (Bielz); Schässburg, Bistra, Balánbánya, Klausenburg. Pilis (Nagyenyed), Rodnagebirge (c. a.).

Pterostichinae.

Stomlni.

48. Stomls Clairville.

pumicatus Panz. Im Gebirge und im Bergland verbreitet.

Pterostichlni.

49. Abax Bonelli.

ater Villa L. (striola F.). In den Wältern des ganzen Gelietes.

Nach Seidlitz (F. transs.) soll bei uns nur die dem südlichen Europa eigentümliche Varietät A. v. inferior Seidl. vorkommen.

var. **inferior** Seidl. Bistra, Schässburg (c. a.).

parallelus Duft. Durch das ganze Gebiet.

carinatus Duft. Håtszeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Holzmengen, Götzemberg, Porumbak, Kerzer Gelirge, Arpascher Gebirge, Fogarascher Gelirge, Nussbach, Reps, Schässburg, Oláhfalu, Marosgebirge, Dees (Bielz); Rotenturm, Szamosujvár (Ormay); Detunata (Mallász).

var. **latus** Dej. Siebenbürgen (Håtszeg? Bielz).

var. **porcatus** Duft. Håtszeg, Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm, Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(Abacopercus.)

Schüppeli Pall. Déva, Detunata, Gyalu, S.-Regen (Bielz); Klausenburg (c. a.). var. **Rendschmidii** Germ. Retjezat, Holzmengen, Girelsau, Frecker Geb., Kerzer Gebirge, Arpascher Gelirge, Kronstadt. Rucsecs, Tesla, Dongókó, Bozauer Pass, Birthálm, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Zalatna (Prászaka), Törczkó, Reps, Nagyenyed, Rotenturm, Klausenburg (c. a.); Hammersdorf, Rakovicza, Präsbe, Déva (Ormay); Detunata (Mallász).

50. Molops Bonelli.

robustus Dej. Siebenbürgen (Bielz).

elatus F. Götzenberg, Präsbe, Fogarasch, Talmesch (Bielz).

Nussbach und Oláhfalu als Fundorte des M. elatus F. sind zu streichen; ob M. elatus überhaupt bei uns vorkommt, ist noch zu erweisen, da er vom ähnlichen M. alpestris Dej. sicher nur durch die Penisform unterschieden werden kann und Ormay vom Götzentberg den M. alpestris Dej. nachweist.

alpestris Dej. Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Götzenberg (Ormay); Szurduk-Pass (c. a.).

? **ovipennis** Chd. Kronstadt (Bielz).

Debei hat Molops ovipennis Chd. bei Kronstadt nie gesammelt; ebensowenig ist die Varietät wieder gesammelt worden, so dass das Vorkommen dieser Art bei uns sehr fraglich erscheint.

? var. **medius** Chd. Kerzer Gebirge (Bielz). **pieceus** Panz. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

var. **montanus** Heer. Kerzer Gebirge (Bielz). **orthogonius** Chd. Siebenbürgen (Bielz).

51. Pterostichus Bonelli.

(Adelosia.)

macer Marsh. Håtszeg, Csiker Gebirge (Bielz); Baassen (c. a.); Hermannstadt, Salzburg, Szakadát (Ormay).

(Poecilus Bon.)

Koyi Germ. Kronstädter Gebirge (Bielz); Transsylvania (c. a.).

marginalis Dej. Malomvitz, Retjezat, Bistra, Rodnagebirge, Tordaer Schlucht (c. a.); Bálványos bei Torja (Méhely).

a. **Szepigletti** Csiki. Rodnagebirge (c. a.); Nagyhagymás, Bucecs, Königstein, Schulergelirge (Deubel).

lepidus Leske. Schieltal, Håtszeg, Präsbe, Surul, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Königstein, Hoszzafalu, Tartlau, Nussbach, Rüksszáf, Gross-Schenk, Schässburg, Oláhfalu, Hargita, S.-Regen (Bielz); Unter-Kerz, Ratsonya, Szurduk-Pass, Bistra (c. a.); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Detunata (Mallász).

cupreus L. (cursorius Heer.). Durch das ganze Geliet verbreitet.

a. **affinis** Sturm. Mit der Stammform.

a. **erythropus** Falz. Mit der Stammform.

coerulescens L. Håtszeg, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Klausenburg, Schässburg, Borszök, Rodnagab., Petrozsény, Bükksszáf (c. a.).

striatopunctatus Duft (subcoeruleus Schaum. nec Quens.). Dobra, Rotenturm, Reussner Teiche, Fogarasch, Schässburg, Dees (Bielz); Karlsburg, Ujszékely b. Sch. (c. a.).

Pt. subcoeruleus Quens., welcher im Kaukasus vorkommt, ist bei uns nicht nachgewiesen, und die Angaben Bielz's beziehen sich auf striatopunctatus Duft, der an Flussufera nicht selten ist.

(Pedius.)

inaequalis Marsh. Götzenberg (Bielz); Schässburg (unter Weidenrinde, c. a.); Várhegy (Deubel).

(Lagarus.)

vernalis Panz. (biimpressus Fuss.). Håtszeg, Hermannstadt, Dobra, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Gross-Schenk, Héviz, Kronstadt, Nussbach, Marienburg b. Kr., Bükksszáf, S.-Regen, Záh, Schässburg (Bielz); Szurduk-Pass, Reps, Retjezat, Nagyenyed, Pilis (b. Nagyenyed, c. a.); Rotenturm, Kerzer Gebirge, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

var. cursor Dej. Marosujvár (c. a.); Kis-szék (Méhely).

(*Lyperosomus*)

aferimus Herbst. Gross-Schenk, Sächs.-Regen, Csíker Gebirge (Bielz).

elongatus Duft. Klausenburg (Bielz). (Bothriopteris.)

oblongopunctatus Fbr. In den Wäldern des ganzen Gebietes verbreitet.

angustatus Duft. Retjezat, Zibinsgebirge, Zood (Bielz); Kerzer Gebirge (Bulea, Ormay).

(*Platysma*)

niger Schall. Hátszeg, Retjezat, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Gross-Schenk, Kronstadt, Hosszu-falu, Nussbach, Reps, Mediasch, Oláhfalu, Borszék, S.-Regen, Záh (Bielz); Schässburg, Karlburg, Rodnagelbirge (c. a.); Hermannstadt, Götzenberg, Schanta, Präsbe, Kerzer Gebirge (Ormay); Detunata (Mallász).

Pt. niger v. distinguendus Heer. ist ans unserm Verzeichnis zu streichen, obgleich ich zwischen zwei Exemplaren des distinguendus aus Uralsk und unserem Pt. niger keinen wesentlichen Unterschied zu entdecken vermag.

(*Omaseus*)

vulgaris L. Schieltal, Hátszeg, Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszu-falu, Marienburg, Nussbach, Mediasch (Bielz); Schässburg, Klausenburg, Torda (c. a.); Hermannstadt, Ober-Kerz (Ormay); Detunata (Mallász).

(*Pseudomaseus*)

nigrita F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, Tömöspass, Bükszák, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Vidra (Aranyos-Tal), Záh (Bielz); Paringul, Pilis (Nagyenyed), Klausenburg (c. a.); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Detunata (Mallász).

anthracinus Illig. Hátszeg, Hermannstadt, Fogarascher Geb., Kronstadt, Hosszu-falu, Schässburg (Bielz); Retjezat, Klausenburg (c. a.); Hammersdorf, Kerzer Gebirge, Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay).

gracilis Dej. S.-Regen, Klausenburg (Bielz).

minor Gyllh. Déva, Hermannstadt (j. W.), Gross-Scheuern, S.-Regen, Dees. Záh (Bielz); Előpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel); Kerzer Gebirge (Ormay).

(*Argutor*)

interstinctus Sturm. Hátszeg, Gross-Scheuern, Nussbach, Schässburg, Oláhfalu, Záh (Bielz); Schässburg, Pilis (Nagyenyed), Klausenburg (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm, Stolzenburg, Kákova, Dálnok (Háromszék, Ormay).

strennuus Panz. Hátszeg, Präsbe, Gross-Schenk, Bükszák, S.-Regen (Bielz); Balánbánya, Szurduk-Pass, Klausenburg, (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm,

Talmesch, Arpascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Porumbaker Gebirge, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

diligens Sturm. Hátszeg (Bielz); Csukás, Frecker Gebirge (Serbota), Paringul, Borszék, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Götzenberg (Ormay).

(*Orites*)

negligens Sturm. S.-Regen (Bielz).

Da Pt. negligens bis jetzt nur vom Riesen-gebirge bekannt geworden ist, und die Bielz-sche Angabe durch neuere Funde bis jetzt noch nicht bestätigt worden ist, scheint das Vorkommen dieser Art bei uns nicht ausser allem Zweifel.

(*Pseudorthomus*)

unctulatus Duft. Vistea mare, Kronstädter Gebirge, Schuler-Gebirge, Kelemenge-birge (Bielz); Retjezat, Frecker Geb. (Serbota), Bucsecs, Borszék, Rodnagel. (c. a.); Schanta, Porkovicza, Präsbe, Porumbaker Gebirge, Arpascher Geb. (Ormay).

subsinnatus Dej. Besineu, Präsbe, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Arpascher Ge-birge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge, Bucsecs (Bielz).

Bielz führt auch Pt. subsinnatus Dej. von zahlreichen Fundorten an, an denen später nur Pt. unctulatus Duft. nachgewiesen worden ist, was das Vorkommen dieser Art bei uns sehr in Frage stellt.

(*Haptoderus*)

brevis Duft. Kronstädter Gebirge (Bielz); Retjezat, Szurduk-Pass (c. a.).

bielzi Fuss. (*festinans* Chd.). Bihargeb. (Muncsel mare bei Rekiczel).

(*Steropns*)

rufitarsis Dej. Rodnagelirge (Deubel. c. a., Ganglb.); Detunala (Mallász). Schanta, Porkovicza, Bistra, Arpascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Porumbaker Gebirge (Ormay).

var. *Deubeli* Ganglb. Schuler-Gebirge, Csukás, Balánbánya, Borszék, Ro Nagelb., Bistra (c. a.); Detunata (Mallász).

var. *tenuimarginatus* Chd. Negovan, Präsbe, Surul, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Bucsecs, Piatra mare, Tesla, Dongókő, Bozauer Pass, Rodnagelbirge (Bielz); Paringulgebirge, Retjezat (c. a.).

aethiops Panz. Surul, Kronstädter Geb., Schuler-Gebirge, Czibles, Rodnagelbirge (Bielz).

Das Vorkommen des Pt. aethiops Panz. scheint mir sehr fraglich, da das Tier seit Bielz nicht mehr gesammelt worden ist.

madidus F. Marosgebirge, Rodnagelbirge (Kuhhorn, Bielz).

Aus demselben Grunde ist auch das Vor-kommen des Pt. madidus bei uns nicht wahr-scheinlich.

cophasoides Dej. Déva (Bielz).

(*Cophosus*)

cylindricus Hbst. Hermannstadt (Bielz).

(Pterostichus s. str.)

melas Creutz. Holzmengen, Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Mediasch, Schässburg, Reps, Oláhfalu, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Tordaer Schlucht, Klausenburg (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm, Schanta, Remete (Nagyenyed), Szamosujvár (Ormay).

var. **hungaricus** Dej. (transsylvaniae Chaud.). Kerzer Gebirge, Kronstadt, Porcsest, Piatra mare, Csukás, Tesla, Dongókő, Bozauer Pass (Bielz); Hermannstall, Götzenberg, Schanta, Remete, Szamosujvár (Ormay); Bistra, Schässburg, Balánbánya, Oláhfalu, Retjezat, Nagyenyed, Toroczkó, Tordaer Schlucht (c. a.); Detunata (Mallász); Schuler-Geb., Nagyhagymás (Deubel).

Die siebenbürgischen Stücke des Pt. hungaricus Dej. sind kleiner und gedrungener als vier Exemplare, welche ich aus Ungarn besitze, auch ist der Halsschild bei den siebenbürgischen Stücken nach hinten in der Regel nicht viel stärker als nach vorne verengt; in der Form der Hinterrust-Episternen, die Seiditz als Unterschied hervorhebt, finde ich keinen bemerkbaren Unterschied.

Kokeili Mill. Fogarascher Gebirge, Rodnaberg (Kuhhorn, Bielz).

(Petrophilus.)

foveolatus Duft. Fogarascher Geb., Kronstädter Gebirge, Bucsecs, Predeal, Marosgelirge, Rodnaberg (Bielz); Schulergelirge (c. a.).

var. **interruptestriatus** Bielz. Surul, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Rodnaberg (Ganglbauer, c. a.); Detunata (Mallász).

Findeli Dej. In sämtlichen höheren Randgebirgen.

(Cheporus.)

transversalis Duft.

var. **Etelkae** Ormay. Retjezat, Detunata, Aranyostal (Skerisora, Bielz); Paringul, Nagyenyel (c. a.).

Ich habe die Bielz'schen Fundorte des Pt. transversalis Duft auch zu Etelkae gezogen, da es mir zweifellos scheint, dass sie sich auf die Varietät beziehen. Um so mehr wundert es mich, dass Ormay den Pt. transversalis von Remete anführt, das unweit Nagyenyed liegt, woher mir Pt. Etelkae vorliegt.

(Oreophilus.)

maurus Duft. Paringul, Surul, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge (Bulea), Kronstädter Gebirge, Bucsecs (Bielz).

a. **erythromerus** Ganglb. (malinus Strm.). Zusammen mit der Stammform.

(Bryobius.)

Jurinei Panz.

var. **Heydeni** Dej. Retjezat, Besineu, Galbina, Präsbe, Surul, Frecker Gebirge (Negoi). Kerzer, Arpascher, Fogarascher, Kronstädter Gebirge, Bucsecs, Piatra mare (Bielz); Malomvitz, Bistra, Paringulgebirge, Rodnaberg (c. a.); Schanta, Porkovicza (Ormay).

(Calopterus.)

fossulatus Quens. Reljezat, Zibinsgebirge, Fogarascher Gebirge (Bielz).

var. **Welensi** Drap. (Klugi Dej.). In allen höheren Gebirgen.

var. **marginatus** n. v. Rodnaberg (c. a.).

Im Rodnaberg kommt eine Form des Pt. fossulatus Quens. vor, welche deutlich gerandete Flügeldeckenbasis besitzt, wodurch sie dem Pt. variolatus Dej. noch ähnlicher wird, von dem sie sich nur durch kürzere Basalgrübchen des Halsschildes und seichter Quereindrücke vor der Basis desselben zu unterscheiden scheint. Ich schlage für diese Varietät den Namen marginatus vor. Oft besitzt sie wie die Varietät Welensi Drap. zwei Basalgrübchen auf der Halsschildbasis.

52. *Sphodrus Clairv.*

leucophthalmus L. Déva, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Holzmengen, Girelsau, Kronstadt, Hosszuval, Krizba, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Klausenburg, Záh (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

53. *Laemostenus Bonelli.*

(Cryptotrichus.)

janthinus Duft.

var. **coeruleus** Dej. Hermannstadt, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Rotenturm (Ormay).

(Laemostenus.)

venustus Clairv. Schässburg (Breite, Witeberg, am Fusse, unter der Rinde, im morschen Holze bohler Eichen im Herbst und im ersten Frühjahr); Riuszad (Ormay).

(Pristonychus.)

punctatus Dej. Schässburg (c. a.); Kronstadt, Rosenau (Méhely).

terricola Ilbst. (inaequalis Panz.). Hermannstadt, Birthalm, Kronstadt, Hosszuval, Krizba (Bielz).

Nachdem diese Art seit Bielz nicht mehr gesammelt wurde, gewinnt es fast den Anschein, als ob hier eine Verwechslung mit L. punctatus Dej. vorliege, der dem L. terricola sehr ähnlich ist.

54. *Platyderus Schaum.*

ruficollis Marsh. Hammersdorf, Mediasch (Bielz); Toroczkó (Ormay).

Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese dem Westen Europas angehörige Art nur irrtümlich in unser Verzeichnis gekommen ist, da Pt. ruficollis Marsh. früher nur als Varietät des Pl. ruficollis angesehen wurde.

rufus Duft. Schiatal, Präsbe, Porcsest, Surul, Kerzer Gebirge, Königstein, Schässburg, Borszék (Bielz); Karlsburg, Rotenturm, Csukás, Zalatna (c. a.); Déva, Hammersdorf, Götzenberg, Riuszad (Ormay); Bistritz (Prof. Müller).

55. *Calathus Bonelli.*

fuscipes Goeze. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
var. **latus** Serv. (*punctipennis* Germ.). Detunata (Mallász).

erratus Sahlb. Hátszeg, Götzenberg, Präsbe, Porcsest, Kronstadt, Tömös-Pass, Bükszás, Oláhfalu, Marosgebirge, Borszék (Bielz); Schuler-Gebirge, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Detunata (Mallász).

ambiguus Payk. Gross-Scheuern, Götzenberg, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Mediasch, Borszék (Bielz); Rotenturm, Intra-Gald, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Detunata (Mallász).

metallicus Dej. In den höheren Gebirgen.
mollis Marsh. Rodnagebirge (c. a.); Bucsecs (Deubel).

melanocephalus L. Im ganzen Gebiete verbreitet.

var. **alpinus** Dej. Petrozsény, Surul, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Bucsecs (Bielz); Präsbe (Ormay).

var. **noricus** Dan. Bucsecs (c. a.).

micropterus Duft. Surul, Zibinsgebirge, Stefleste, Bucsecs (Bielz); Paringul, Retjezat, Borszék, Rodnagebirge (c. a.); Nagyhagymás, Pietrosul (Kelemengeb., Deubel).

56. *Dolichus Schall.*

halensis Schall. Déva, Kasanest, Vácza (Bad), Piski, Hermannstadt, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.).

57. *Synuchus.*

nivalis Panz. Retjezat, Schieltal, Déva, Götzenberg, Surul, Bükszás, Gyalu (Hidegszamos, Bielz); Schässburg, Borszék, Csukás (c. a.); Bistra, Kerzer Gebirge (Ormay); Hátszeg, Kronstadt (Deubel).

58. *Olisthopus Dejean.*

Sturmi Duft. Mühlbach (Rekita), Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg, Előpatak, Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel).

rotundatus Duft. Déva, Hermannstadt, Oláhfalu (Bielz); Schässburg (c. a.).

59. *Agonum Bonelli.*

(Anchomenus.)

ruficorne Goeze. An den Ufern süsser Gewässer und an feuchten Stellen durch das ganze Gebiet.

(Anchus.)

obscurum Herbst. Hátszeg, Hermannstadt, Fogarasch, S.-Regen, Bánffy-Hunyad, Zäh (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(Platynus.)

scrobiculatum F. Götzenberg, Zood, Präsbe, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge (Bielz); Malomvitz (c. a.).

banaticum Friv. Retjezat, Zenoga-See, Vale Valeriaska (c. a.).

glaciale Reitter. Negoj, Kerzer Gebirge, Vister-Tal, Fogarascher, Kronstädter, Schuler-Gebirge, Piatra mare (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Bucsecs (c. a.).

(Limodromus.)

assimile Payk. Durch das ganze Berg- und Hügelland bis in die Gebirge in Wältern.

(Batenus.)

livens Gyllh. Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

(Agonum s. str.)

quadripunctatum Dej. Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

impressum Panz. Schanta (Ormay). Schässburg als Fundort des A. impressum ist zu streichen.

sexpunctatum L. Hátszeg, Retjezat, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Bucsecs, Hosszufalu, Tartlau, Bükszás, Mediasch, Schässburg, Oláhfalu, Marosgebirge (Bielz); Szurduk-Pass, Annensee, Borszék, Nussbach, Frecker Geb. (Serbota), Tordaer Schlucht, Rodnagelirge (c. a.); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

viridicupreum Goeze. Honigberg (Altufer, Deubel).

var. **austriacum** F. Präsbe, Girelsau, S.-Regen, Dees, Zäh (Bielz); Klausenburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Honigberg (Altufer, Deubel).

marginatum L. Hátszeg, Salzburg, Rotenturm, Hammersdorf, Szombat, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Klausenburg (Bielz); Karlsburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

Mülleri Herbst. Durch das ganze Berg- und Hügelland.

a. **tibiale** Heer. Dees, Naszód, Klausenburg (c. a.); Ba'ánhánya (Deubel).

a. **amethystinum** n. a. Paringulgebirge (c. a.).

A. Müller a. **amethystinum**: Oberseite ganz blaugrün gefärbt bis auf den schmal bronze-farbigen Seitenrand des Halschildes und den breit bronze-farbigen Seitenrand der Flügeldecken.

gracilipes Duft. Petrozsény (Paringul, Bielz).

Ist aus der Reihe der bei Schässburg bis jetzt aufgefundenen Käfer zu streichen.

versutum Gyllh. Gross-Scheuern, Marpod, Bükszár (Bielz); Götsenberg (Ormay); Honigberg (Altufier, Deubel).

viduum Panz. Retjezat, Schieltal, Neudorf b. H., Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Annen-See, Schässburg, Oláhfalu, Marosgebirge (Bielz); Paringul, Klausenburg, Dees, Szurdok-Pass (c. a.); Rotenturm, Szamosujvár (Ormay).

var. moestum Duft. Hermannstadt, Kronstadt, Záh, Gyeke (Bielz); Retjezat, Paringul (c. a.).

m. emarginatum Gyllh. Klausenburg (c. a.). (Europilus.)

antennarium Dutt. Retjezat, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Schässburg, Pilis (Nagyenyed, c. a.); Hammersdorf, Rotenturm (Ormay).

Ormay führt auch A. scitulum Dej. von Hermannstadt und Baumgarten an, was wahrscheinlich auf Irrtum beruht, da die Art der westeuropäischen Fauna angehört.

micans Nicol. Hermannstadt (Bielz); Schässburg, Ujszékely (Kokel), Dees (c. a.); Honigberg (Deubel).

fuliginosum Panz. Gross-Scheuern (Bielz); Retjezat, Klausenburg (c. a.).

piceum L. Gross-Scheuern (Bielz). **gracile** Gyll. Kronstadt (Gespreng, Deubel, Méhely).

Thoreyl Dej. Záh (Bielz).

var. puellum Dej. Gross-Scheuern (Bielz). (Idiochroma, Clibanarius.)

dorsalis Pontopp. Durch das ganze Berg- und Hügelland bis in die Gebirge.

Lebiinae.

60. Lebia Latreille.

(Lamprias.)

cyancephala L. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Marpod, Kerz, Fogarasch, Kronstadt, Predeal, Tartlau, Mediasch, S.-Regen, Dees (Bielz); Puj (Hátszeg), Malomvíz, Baassen, Schässburg, Rodnagelgebirge (c. a.); Salzburg, Hammersdorf, Rotenturm, Stolzenburg (Ormay).

chlorocephala Hoffm. Wie der vorige verbreitet.

(Lebia s. str.)

erux minor L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

trimaculata Vill. Déva, Klausenburg (Bielz); Felső-Orbó (Ormay).

marginata Geoffr. Déva, Mediasch, Sächs.-Regen, Klausenburg (Bielz); Unter-Kerz (Altufier auf Weidengebüsch), Schässburg (Kokel, c. a.); Rosenau (auf Weide, Deubel).

humeralis Dej. S.-Regen (Bielz); Schässburg (Scherkes, Gr.-Alischer Reg., c. a.).

scapularis Geoffr. (nec. Fourer.). Mediasch (Bielz).

61. Llonychus Wissmann.

quadrillum Duft. Rotenturm, S.-Regen, Dees (Bielz); Pi-trosény, Nagyenyed (c. a.); Altufier (Deubel).

var. major Mill. Siebenbürgen (Bielz).

62. Metabletus Schmidt-Goebel.

obscuroguttatus Duft. Hermannstadt, Neudorf b. II., Birthálm, S.-Regen, Záh (Bielz); Rotenturm (c. a.).

pallipes Dej. Hátszeg, Déva, Hermannstadt, Oláhfalu, Gyeke (Bielz).

frunicatellus L. Hátszeg, Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Zalatna, Reps, Schässburg, Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel).

63. Microlestes Schmidt-Goebel.

(Blechrus Motsch.)

minutulus Goze. (glabratus Duft.). Hátszeg, Schieltal, Dusch, Kerzer Gebirge, Schässburg, S.-Regen, Záh, Gyeke (Bielz); Kronstadt (Deubel, Méhely).

maurus Sturm. Schässburg, Tordaer Schlucht, Hátszeg (c. a.); Gyeke, Záh, Vurvurasa (Méhely); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

64. Dromius Bonelli.

longiceps Dej. Hermannstadt, Hammersdorf, Mediasch, Schässburg (Bielz).

linearis Oliv. Hátszeg, Mediasch, Birthálm, Schässburg (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Rotenturm, Borszék, Rodnagel (c. a.); Klausenburg (Müller).

agilis F. Hammersdorf, Gross-Scheuern, Rotenturm, Kerzer-, Arpascher-Gebirge (Bielz); Borszék, Schässburg (c. a.); Schuler-Gebirge (Deubel); Bistritz (Müller).

longulus Friv. Schässburg. (In morschem Zwetschken- und Lindenholz, auf Ahorn unter Moos, c. a.).

fenestratus F. Kronstadt, Csukás, Nagy-hagymás (Deubel).

quadrinotatus Panz. Fogarasch (Bielz); Rotenturm, S.-Regen (Bielz); Baassen, Schässburg, Buesecs (c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

quadrinotatus Panz. Fogarasch (Bielz); Rotenturm, Gyögy (Ormay).

quadrisignatus Dej. Schässburg (Sieghofberg unter der Rinde eines Apfelbaumes und unter Moos, c. a.); Hermannstadt (unter Weidenrinde, Ormay).

nigriventris Thoms. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Rotenturm (c. a.); Hammersdorf, Kleinpol (Ormay).

65. Demetrias Bonelli.

(Aëtophorus.)

imperialis Germ. Kronstadt, Klausenburg, Záh (Bielz).

(Demetrias s. str.)

monostigma Sam. Hátszeg, Gross-Scheuern (Bielz); Unter-Kerz (Altufer), Schässburg (Kokelufur, c. a.); Honigberg (Altufer, Deubel); Hermannstadt (Ormay); Klausenburg (Müller).

atricapillus L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Schässburg, Hosszuvalu (Bielz); Unter-Kerz (Altufer), Ponor bei Puj (Hátszeg, c. a.); Hátszeg, Rosenau (Deubel); Klausenburg (Müller).

66. Cymindis Latreille.

(Cymindis s. str.)

humeralis Geoffr. Schieltal, Rotenturm, Porcsest, Reps, Nussbach, Kronstadt, Ojtosz-Pass, Oláhfalu, Csik, Balánbánya, Marosgebirge, Klausenburg (Bielz); Puj (Hátszeg), Előpatak, Rodnagelbirge, Schässburg (Fuchslöch im Moos, c. a.); Talmesch, Nagyág (Ormay); Detunata (Mallász).

axillaris F. Déva, Gross-Scheuern (Bielz); Hátszeg, Pilis (Nagyenyed, c. a.); Klausenburg (Müller).

cingulata Dej. Déva, Godinest, Mada, Guaraiu, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Krizba, Piatra mare, Tesla, Dongókő, Hargita, Oláhfalu, Keroly (Bielz); Balánbánya, Rotenturm, Tordaer Schlucht, Rodnagelbirge, Schässburg (c. a.); Nagyhagymás (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

67. Polystichus Bonelli.

connexus Geoffr. Klausenburg (Müller).

Odacanthinae.

68. Odacantha Paykull.

melanura L. Gross-Scheuern, Klausenburg, Záh (Bielz); Hermannstadt (Lazaret, c. a.).

Dryptinae.

69. Drypta Latreille.

dentata Rossi. Hátszeg, Hermannstadt, Schässburg (Bielz); Unter-Kerz, Rotenturm, Klausenburg (c. a.); Keisd, Várhegy (Deubel); S.-Regen (Müller).

Brachyninae.

70. Brachinus Weber.

crepitans L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

psophia Serv. Hátszeg, Dobra, Déva, Mediasch, Dees (Bielz); Karlsburg, Schässburg (c. a.); Szamosujvár (Ormay).

immaculicornis Dej. Dobra, Déva, Mediasch (Bielz).

expladens Duft. Hátszeg, Hermannstadt, Girelsau, Kronstadt, Tartlau, Schässburg, S.-Regen, Gyeke, Katona (Mezőség, Bielz).

var. **streptes** Fisch. Klausenburg, Karlsburg, Schässburg (c. a.).

var. **glabratus** Dej. Hátszeg, Gross-Schenk, Mediasch, S.-Regen, Dees (Bielz); Schässburg, Karlsburg (c. a.); Honigberg (Deubel).

71. Aptinus Bonelli.

bombarda Illig. Klausenburg (Bielz); Schässburg, Baassen (c. a.).

III. Haliplidae.

72. Haliphus Latreille.

obliquus F. (amoenus Oliv.) Hermannstadt, Neudorf b. H. (Bielz); Klausenburg, Előpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel).

variegatus Sturm. Mezőség, Gyeke (Bielz).

fulvus F. Hermannstadt, Sibo, Schässburg (Bielz); Nussbach (c. a.); Kronstadt (Deubel, Gespreng).

flavicollis Sturm. (impressus Er.?). Hátszeg, Neudorf b. H. (Bielz); Kronstadt (Deubel).

laminatus Schall. (cinerus Aubé). Schässburg (Bielz); Lotriora (Rotenturm), Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

ruficollis Degeer. Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Fogarasch (Bielz); Klausenburg, Schässburg, Nussbach (c. a.); Kronstadt (Deubel); Maaren (rechtes Altufer, Ormay).

var. **Heydeni** Wehncke. Schässburg (c. a.).

fulvicollis Er. Schässburg, Mezőség (Záh, Gyeke, Bielz); Baassen (c. a.).

fluviatilis Aubé. Neudorf b. H., Zood (Bielz); Baassen, Schässburg (c. a.).

lineatocollis Marsh. Lotriora (Rotenturm, c. a.).

73. Cnemidotus Illig.

impressus Panz. (caesus Duft.) Hermannstadt, Poplaka b. H., Unter-Kerz, S.-Regen (Bielz); Klausenburg (c. a.); Maaren (Altufer, Ormay).

IV. Dytiscidae.

Hydroporinae.

74. *Oxynoptilus Schaum.*

cuspidatus Kunze. Kolos (Bielz).

75. *Hyphydrus Illig.*

ovalis L. (ferrugineus L.) Fogarasch, Nussbach, S.-Regen, Klausenburg, Gyeke (Bielz); Kronstadt (Deubel); Maaren (Altuer, Ormay).

76. *Hygrotus Steph.*

inaequalis F. Hermannstadt, Unter-Kerz, Fogarasch, Nussbach, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Agostonfalva, Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

versicolor Schall. Hermannstadt, Reussener Teiche (Bielz); Kakova (Ormay).

decoratus Gylh. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

77. *Coelambus Thomson.*

impressopunctatus Schall. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerz, Kronstadt, Nussbach (Bielz); Halvelagen bei Sch., Agostonfalva (c. a.); Maaren (Alt), Nagyenyed, Szamosujvár (Ormay).

parallelogrammus Ahrs. Kronstadt, Záh (Bielz).

enneagrammus Ahrs. (*nigrolineatus* Aub.). Déva, Salzburg (Bielz).

confluens F. Neudorf, Baassen (Bielz); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

78. *Bidessus Sharp.*

unistriatus Illig. (*parvulus* Panz.). Rotenturm (Bielz); Karlsburg (c. a.); Hermannstadt, Maaren (Alt, Ormay).

geminus F. (*minimus* Bedel). Salzburg, Hermannstadt, Neudorf b. II, Holzmengen, Unter-Kerz, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Iléviz, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Orlat, Karlsburg, Baassen, Halvelagen b. Sch., Marosujvár (c. a.); Kakova, Maaren (Alt), Nagyenyed (Ormay).

79. *Hydroporus Clairville.*

(Deronectes.)

platynotus Germ. Rotenturm (Lauterbach, c. a.).

(Oreodytes.)

Sanmarki C. R. Sahlb. Kronstadt, Tartlau (Bielz).

(*Graptodytes.*)

pictus F. Hermannstadt (Bielz); Maaren (Alt, Ormay); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

granularis L. (*minimus* Scop?). Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Honigberg (Deubel).

(*Hydroporus i. sp.*)

Genei Aubé.

var. *oblique-signatus* Bielz. Klausenburg (Bielz).

lineatus Degeer. (*quadridelineatus* Drap.). Klausenburg (Bielz); Honigberg (Deubel); Salzburg (Müller).

halensis F. Mediasch, Klausenburg (Bielz); Schässburg, Baassen (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Bistritz, S.-Regen (Müller).

dorsalis F. Arapatak (Bielz); Honigberg (Deubel).

erythrocephalus L. Götzenberg, Kerzer Gebirge, Schässburg (Bielz); Oláhfalu, Nussbach (c. a.); Hermannstadt, Maaren (Alt, Ormay); Kronstadt (Deubel); Marosvásárhely (Müller).

var. *deplanatus* Gylh. Oláhfalu, Schässburg (c. a.).

rufifrons Duft. Hermannstadt, Rotenturm (Bielz); Honigberg (Deubel).

sealesianus Steph. Klausenburg (Stadt-teiche, c. a.).

angustatus Sturm. Hermannstadt (Bielz); Kronstadt (Gespreng), Honigberg (Deubel).

palustris L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

ellypticus n. sp. Rotenturm (Lautertal in fliessendem Quellwasser, c. a.), zwei Exemplare.

Hydroporus ellypcticus, Länge 35 mm.
Hydropore marginato Duft. simius, magatudine minore, corpore angustiore, convexiore, elytris minus subtiliter et minus dense punctulatis, margine elytrorum laterali basin versus distincte curvato diversus. Hydropore *palustri* L. etiam prepinquus, sed forma et corpore convexiore, latiore, nitidore, forma metathoracis, signatura elytrorum etc. abunde distinctus. Fuscus, nitidus, capite medi, lateribus prothoracis, margine basali et laterali, macuis duobus elytrorum, antennis, palpis, pedibusque testaceis. Corpus convexum, laetus rotundatum medio latissimum. Caput disperse punctulatum, subtriangularis, antennae gracilliores, testaceae, apicem versus cum apice palporum, obscures. Prothorax convexus, ante basin vix impressus, iuxta angulos posterios feveela rotunda obsoletus, disperse punctatus, lateribus distincte subtiliter marginatis. Elytra punctulata, subtiliter pilosa, margine laterali basin versus ascendente. Processus prosternalis obsolete tuberculatus, alae laterales metathoracis apice angustae, lineiforme terminatae, metathorax, coxae posticæ abdominisque segmentum I et II disperse profundius, segmenta cetera subtius punctata, segmentum ultimum longitudinaliter rugosum. Unguiculi tarsorum anteriorum aequales.

Durch die deutlich aufsteigende Seiterandlinie der Flügeldecken bei abgestutzten Fertssätzen der Hinterflüchten gehört die Art in die Gruppe des *H. palustris*, von welchem sie sich durch verhältnismässig breiteren, gewölbteren Halschild, seitlich regelmässig gerundeten, glänzendere Körper, kürzere und feinere Behaarung

der Flügeldecken, linienförmig anslanfende Spitze der Seitenfügel des Metathorax, tiefere und entfernte Punktierung und grösseren Glanz der Unterseite, durch die Färbung der Flügeldecken und durch gleiche Klaue der Vordertarsen des Männchen unterscheidet. Die Flügeldecken sind dunkelbraun, ein ziemlich breiter, gerader, an der Naht nicht nach hinten erweiterter Basalfleck, der die Naht nicht erreicht, aber mit dem vorne breit, hinten schmal und verwachsen gelben Sei enrände zusammenhängt, zwei Flecken auf der hintern Hälfte neben dem Seitenrande, von denen der vordere sich linienförmig nach hinten verlängert, der hintere punktförmig ist, wenig scharf abgegrenzt gelb. Auf dem Prosternum ist ein Höckerchen nicht bemerkbar, wohl aber eine halbkreisförmige, nach vorn offene, erhabene Linie, die Spitze des Hinterbrustflügels ist sehr kurz, schmal, linienförmig, während sie bei *H. palustris* ein schmales, aber doch deutliches Dreieck bildet. Die Klaue der Vordertarsen sind bei beiden Exemplaren gleich.

Ich habe die Art verglichen mit zahlreichen *H. palustris* aus Siebenbürgen, Norwegen und Böhmen, auch mit *H. marginatus* aus Steiermark, von dem er sich durch schmälere Gestalt, weniger feine und dichte Punktierung der Flügeldecken und deutlich aufgetragenen Seitenrand der Flügeldecken unterscheidet, während er ihm in Färbung und Glanz sehr ähnlich ist.

tristis Payk. Oláhfalu, Nussbach (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Méhely).

elongatulus Sturm. Kerzer Gebirge (Bielz); Nagyenyed (Ormay).

marginatus Duft. Hermannstadt (Bielz); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

planus F. Hermannstadt, Balánbánya, Záh (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Rotenturm, Halvelagen b. Sch., Klausenburg, Előpatak (c. a.); Honigberg (Deubel); Maaren (Alt, Ormay); S.-Regen (Müller).

pubescens Gyll. Mezőség (Záh, Bielz); Kronstadt (Deubel).

morio Heer. (*nivalis* Heer.). Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

discretus Fairm. Bükszad, Schässburg. (In Tümpeln, c. a.).

nigrita F. Balánbánya, Torda (Bielz); Borszék, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

melanarius Sturm. Kerzer Gebirge (Bielz); Paringulgebirge (c. a.).

ferrugineus Steph. Michelsberg, Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge (Bielz).

Noterinae.

80. Noterus Clairville.

crassicornis Müll. Hermannstadt, Unter-Kerz, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Klausenburg, Agostonfalva, Halvelagen bei Sch. (c. a.).

clavicornis Deg. Hátszeg, Hermannstadt, Kerz, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Maaren (Alt), Kakova (Ormay).

Laccophilinae.

81. Laccophilus.

variegatus Sturm. Dobra (Lapusnyak), Klausenburg (Bielz).

obscurus Panz. Fogarasch (Bielz); Baassen, Klausenburg, Halvelagen b. Sch. (c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel); S.-Regen (Müller).

virescens Brahm (hyalinus Degeer). Hermannstadt, Thalheim, Nussbach, Előpatak, Héviz, Mediasch, Schässburg, Gyeke, Záh (Bielz); Maaren (Alt), Kakova, Szamosujvár (Ormay).

Colymbetinae.

82. Agabus Linné.

(Gaurodytes.)

guttatus Payk. Gurariu, Götzenberg, Zood, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Törzburger Pass, Balánbánya, S.-Regen, Záh (Bielz); Rotenturm, Bistra, Malomvitz (c. a.); Gyógy (Ormay).

biguttatus Oliv. Malomvitz (c. a.).

var. *nitidus* F. (fontinalis Steph.). Götzenberg, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Balánbánya (Bielz).

bipustulatus L. In stehendem Süßwasser durch das ganze Gebiet, auch im Gebirge (Buteanu Lakuz und Frecker Gebirge Serbota, c. a.).

regalis Petri. Kerzer Gebirge (Buleasee), Borszék (Közhegy, c. a.).

Ormay führt A. Solieri autorum = A. regalis Petri auch vom Buteanu (Lakuz-Tümpel) an; ich habe in diesem nur A. bipustulatus L. in grosser Zahl gesammelt. Die Vereinigung unseres A. regalis mit A. Solieri v. Kiesenwetteri Seidlitz vom Berge Kern in Illyrien, wie sie Dr. Holdhaus (Abh. K. k. Z. b. Gesellsch., Wien, VI. 1) ohne weitere Begründung annimmt, kann ich nicht akzeptieren: Nach Kiesenwetter sind die Tiere aus Illyrien sehr klein und weichen im übrigen vom echten A. Solieri nicht ab. A. regalis aber besitzt die Grösse der norwegischen Tiere (9—10⁵ mm.); dazu kommt noch ein Unterschied in der Skulptur der Oberseite, den ich in meiner Beschreibung nicht anführte: die eingeritzten Linien der Oberfläche bilden wesentlich breitere Maschen; der Verlauf der eingeritzten Linien wird dadurch vollkommen unregelmässig und die von ihnen eingeschlossenen Felder sind mehr weniger breit unregelmässig-polyedrisch, während bei A. Solieri die Linien unter einander mehr weniger parallel verlaufen, an dem Vorder- und Hinterrande zugespitzt sind und dadurch die längsrissige, der des A. bipustulatus sich nähernde Skulptur erzeugen.

paludosus F. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Honigberg (Tümpel, Deubel).

uliginosus L. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz).

congener Payk. Mediasch, Bozauer Pass (Bistritz, Forduló, Bielz).

affinis Payk. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (c. a.).

(Scytodidae.)

Sturm Gyll. Hermannstadt, Szombat (Bielz).
(Eriglenus.)

undulatus Schrk. (Hermannni Bedel). Hermannstadt, Götzemberg, Kronstadt, Schässburg, Oláhfalu, Csáki Gorbó (Salomon, Bielz); Klausenburg (c. a.).
labiatus Brahm (femoralis Payk.). Schieltal, Hammersdorf (Bielz); Honigberg (Tümpel am Altfluss, Deubel).

83. *Platambus Thomson.*

maculatus L. (inaequalis Panz.). Zood, Szombat, Fogarasch, Nussbach, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Malomiviz, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Ober-Kerz (Ormay); IIátszeg, Zernes, Vargyasbach (Denbel).

84. *Copelatus Erichs.*

ruficollis Schall. Hermannstadt, S.-Regen, Mediasch (Bielz); Maaren, Szamosujvár (Ormay); Honigberg (Deubel).

85. *Hybius Erichs.*

fenestratus F. Hermannstadt, Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Rotenturm (Ormay); Honigberg (Denbel).

futiginosus F. Hermannstadt, Neudorf b. II., Kerzer Gebirge, Fogarasch, Nussbach, Mediasch, S.-Regen, Záh (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Baassen, Klausenburg, Kronstadt (c. a.); Honigberg (Denbel).

subaeneus Er. Mezőség (Záh, Bielz); Schässburg, Nussbach (c. a.).

ater Degeer. Hermannstadt, Neudorf b. H., Fogarasch, Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (Deubel).

obscurus Marsh. S.-Regen (Bielz).

guttiger Gyllh. Präsbe, Kerzer Gebirge (Bielz).

86. *Rhantus Lacordaire.*

Grapei Gyllh. Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Gespreng, Méhely).

punctatus Geoffr. Hermannstadt, Neudorf b. II., Thalheim, Girelsau, Unter-Kerz, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Ágestonfalva (c. a.).

notatus F. (suturalis Lacord.). Hermannstadt, Girelsau, S.-Regen, Záh (Bielz); Klausenburg (c. a.).

adspersus F. (bistriatus Bedel nec Bergström). Hermannstadt, Girelsau, Unter-Kerz, Fogarasch (Bielz); Schässburg (c. a.); Honigberg, Brenndorf (Altflussufer in Tümpeln, Deubel).

Bielz führt Rh. bistriatus Bergstr. — **adspersus** F. an. Die Synonymie seines Rh. bistriatus mit Rh. adspersus F. beweist, dass seine Art der Rh. adspersus F. ist; demnach

ist Rh. bistriatus Bergström vor der Hand aus unserem Verzeichnis zu streichen.

exoletus Forst. Hermannstadt (Bielz); Brenndorf (Deubel).

87. *Colymbetes Clairville.*

fuscus L. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Gyeke, Záh (Bielz); Karlsburg, Baassen, Klausenburg (c. a.); Rotenturm (Ormay).

Dytiscinae.

88. *Hydaticus Leach.*

seminiger Deg. Hermannstadt, Fogarasch, Schässburg (Bielz); Karlburg, Kronstadt, Klausenburg (c. a.); Maaren (Altufer, Ormay).

transversalis Pontopp. Mühlbach, Hermannstadt, Schässburg (Bielz); Nagyenyed, Miriszló, Kakova (Ormay); Kronstadt (Deubel); S.-Regen (Müller).

stagnalis F. Burzenland (Brenndorf, Altfluss in Tümpeln, Deubel, c. a.).

89. *Graphoderes Thomson.*

austriacus Sturm. Hermannstadt, Mezőség (Záh, Bielz).

bilineatus Deg. Brenndorf (Altfluss in Tümpeln, Deubel).

cinereus L. Hermannstadt, Nussbach, Mediasch, Gyeke (Bielz); Nieder-Eidisch (c. a.); Maaren (Altufer), Salzburg, Szamosujvár (Ormay); Brenndorf, Honigberg (Altufer in Tümpeln, Deubel).

zonatus Hoppe. Kronstadt (Gespreng, Méhely).

90. *Aeilius Leach.*

sulcatus L. Hermannstadt, Salzburg, Girelsau, Unter-Kerz, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Baassen (c. a.); Szamosujvár (Ormay).

91. *Dytiscus L.*

marginalis L. Hermannstadt, Unter-Kerz, Szombat, Fogarasch, Gross-Schenk, Kronstadt, Hosszuvalu, Schässburg. S.-Regen, Gyeke (Bielz); Rotenturm, Poplaka (Ormay).

var. ♀ **conformis** Kunze. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, S.-Bogen (Bielz); Schässburg (c. a.).

dimidiatus Bergstr. Hermannstadt, Unter-Kerz, Fogarasch, Gross-Schenk, Schässburg, S.-Regen, Marosgebirge (Bielz); Honigberg (Deubel).

circumcinctus Ahr. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt (Bielz).

circumflexus F. Hermannstadt, Girelsau (Bielz); Schässburg (c. a.); Altfluss (Deubel); Salzburg (Ormay).

92. Cybister Curtis.

laferimarginalis Deg. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt (?Deubel), Mediasch, Záh, Gyeke (Bielz); Salzburg, Nagyenyed, Tinód (Unterwiessenburger Komitat), Marosujvár, Miriszló, Szamosujvár (Ormay); Schässburg (c. a.).

V. Gyrinidae.

93. Gyrinus Geoffroy.

bicolor Payk. Hermannstadt, Mezőség (Záh, Bielz); Szamosujvár (Ormay).

colymbus Er. Halvelagen bei Sch. (c. a.).
distinctus Aub. Rotenturm (Lauterbach), Bükszásd (c. a.).

var. *hungaricus* Seidl. Rotenturm, Bükszásd (c. a.).

natator L. Schässburg, Héviz, Bükszásd (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Da Bielz G. *colymbus* Er. und *distinctus* Aub. nicht bekannt waren, führe ich als Fundorte des G. *natator* L. nur jene an, die mir bekannt geworden sind.

94. Orectochilus Lacord.

villosus Müll. Fogarasch, Mediasch, Klausenburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Vargyasbach (Deubel); Sächs.-Regen (Müller).

VI. Rhysodidae.

95. Rhysodes Dalm.

(*Omoglymnus*.)

Germari Ganglb. Alsó-Rákos (Tepe, Deubel).

(*Rhysodes* s. str.)

sulcatus F. (*exaratus* Dalm.). Kronstadt (Noa, Fichte, Mélhy); Nussbach (Eiche b. Ameisen, Deubel).

Polyphaga.

Staphylinoidea.

VII. Staphylinidae.

Piestinae.

Plestini.

96. Slagonium Kirby.

quadricorne Kirby. Hermannstadt (Bielz); Kerzer Gebirge (Bulea-See), Baassen, Schässburg (c. a.); Klausenburg (Müller).

humerale Germ. Schässburg (c. a.).

97. Thoracophorus Motsch.

corticinus Motsch. Hermannstadt (Bielz); Baassen (Alter Nussbaum), Schässburg (Eichenholz, c. a.); Kronstadt (Götzentempel oberhalb der Flintschöhle, alte Buche bei Lasius brunneus).

Oxytelinae.

Micropeplini.

98. Micropeplus Latreille.

laevipennis Epp. Rodnagebirge, Nagyhagy-más, Bucsecs, Schuler-Gebirge (aus Grashüscheln gesiebt, Deubel); Schässburg (Hausgarten, wahrscheinlich aus Gesiebsel vom Kerzer Gebirge stammend, 20. Februar 1910, c. a.).

staphylinoides Marsh. Neudorf b. H. (Bielz).

fulvus Er. Malomvitz (Lunka negru, Bachufer unter Moos, c. a.).

porcatus F. S.-Regen (Bielz); Előpatak (in einem Tümpel, c. a.); Kronstadt (gesiebt und gekötschert, Deubel); S.-Regen (Müller).

Phloeoccharini.

99. Phloeocaris Mannerheim.

subtilissima Mannh. Durch das ganze Gebiet verbreitet unter Baumrinde und Laub.

100. Olistherus Heer.

substriatus Gyllh. Negoi, Fogarascher Geb. (Bielz); Bucsecs, Bistra (c. a.); Schuler-Gebirge (Deuhel); Porkovicza (Zoodtal, Ormay).

Proteinini.

101. Metopsia Wollaston.

(*Phoeobium* Er.)

clypeatum Müll. Schässburg (auf Pilzen, c. a.); Gyógy (Ormay); Kronstadt (Zinne, Deubel).

102. Megarthrus Stephens.

depressus Payk. Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel); Schanta (Ormay).

affinis Mill. (*sinuatocollis* Kr.). Hermannstadt (Bielz); Koronjis (Rodnagebirge, c. a.); Bodzaer Gebirge, Zernest (Deubel).

denticolis Beck. Hermannstadt, Schässburg (Bielz); Bistra (c. a.); Sächs.-Regen (Müller).

sinuatocollis Lac. Rodnagebirge, Schniergebirge, Bistra, Retjezat (c. a.).

hemipodus Illig. Hermannstadt (j. W.), Rotenturm (Bielz); Schässburg, Baassen, Karlsburg (Ompolyitza, c. a.); Tusnád (Deubel); Bistrítz (Müller).

103. *Proteinus Latreille.*

- ovalis** Steph. Kronstadt (Zinne), Bucsecs (subalpin, Deubel).
brachypterus F. Mediasch (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Schässburg, Balánbánya (c. a.); Hermannstadt, Götzenberg, Schanta, Kerzer Gebirge (Ormay); Rosenau (Deubel).
limbatus Makl.
var. **oblongus** Petri. Schässburg, Ober-Kerz, Rotenturm, Büdös (c. a.).
macropterus Gyllh. Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.); Schanta, Prásbe (Ormay); Bistritz (Müller).
atomarius Er. Hermannstadt, Kronstadt (Bielz).

Omalini.

104. *Anthobium Steph.*

- (*Anthobium s. str.*)
anale Er. Zibinsgebirge (Bielz); Rodnagbirge (c. a.).
alpinum Heer. (*montanum* Er.). Resinar, Kerzer Gebirge (Bielz); Schuler-Gebirge, Frecker Gebirge (Serbota), Retjezat, Schässburg, Kronstadt, Haassen, Borszék (c. a.).
palligerum Kiesenw. Alsó-Rákos, Schässburg, Oláhfalu (c. a.); Kronstadt (Deubel); Schanta, Kerzer Gebirge (Ormay); Detunata (Mallász).
longipenne Er. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Oláhfalu (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Schulergieberge, Unter-Kerz, Retjezat, Bistra, Balánbánya (c. a.); Götzenberg (Ormay); Detunata (Mallász).
(Eusphalerum).
ophthalmicus Payk. Zibinsgebirge, Sächs.-Regen (Bielz); Kerzer Gebirge, Rodnagbirge (c. a.); Bucsecs (subalpin, Deubel).
sorbi Gyllh. Michelsberg, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Bistritz (Müller).
Marshami Fauv. Kronstadt (Bielz); Götzenberg (Ormay).
torquatum Marsh. Schanta, Kerzer Gebirge (Ormay).

Das Vorkommen dieser dem Westen Europas angehörigen Arten, *A. torquatum* Marsh. und *obsoletum* Er., bedarf jedenfalls weiterer Bestätigung.

- limbatum** Er. Kronstadt (Bielz); Schanta, Resinar (Ormay); Schuler-Gebirge, Rosenau (Deubel).
abdominale Grav. Fogarasch, Kronstadt? (Bielz).

Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser Art in Kronstadt.

- primum** Steph. Girelsau, Zood, Kronstadt (Bielz); Retjezat, Schässburg, Schulergieberge (c. a.); Götzenberg (Ormay).

obsoletum Er. Zibinsgebirge (Bielz).

minutum F. Zibinsgebirge, Kronstadt, Oláhfalu (Bielz); Schässburg (c. a.); Klauenburg (Müller).

florale Panz. Gölzenberg, Fogarasch (Bielz); Zibinsgebirge (Klamm), Retjezat, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

105. *Aerulia Thomson.*

inflata Gyll. In unsern Gebirgen verbreitet.

106. *Aerolecha Thomson.*

striata Grav. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg (einigemale im Flug gefangen, dann aus Holzabfällen, Rinden etc. gesiebt, am 20. Februar siebte ich eine grössere Anzahl aus verwesenden Pflanzenstoffen im Hausgarten). Puj (Ilátszeg, c. a.).

107. *Phyllodrepa Thomson.*

(*Phyllodrepa s. str.*)

floralis Payk. (*rufipes* Fauv. ex parte, *maculicornis* Heer.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Geb., Frecker Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schulergieberge, Balánbánya, Előpatak, Szováta, Schässburg (Kokel, Geniste, c. a.); Kronstadt (Deubel); Schanta (Ormay).

var. **nigra** Grav. Zibinsgebirge (Bielz).

salicis Gyllh. Hermannstadt (Bielz).

melanocephala F. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg (unter Eichenrinde und in altem Eichenholz, in Nestern der Lasius fuliginosus und brunneus, c. a.); Rosenau (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

(*Droephila*.)

ioptera Steph. Szurduk-Pass (unter Rotbuchenrinde, Mai 1910, c. a.).

scabriuscula Kr. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Schulergieberge (Deubel).

linearis Zetterst. Bistra (wahrscheinlich unter Tannenrinde, c. a.).

(*Hapalaraea*.)

pygmaea Gyll. Schässburg (in alten Eichen bei Lasius brunneus, c. a.); Csukás, Rotenturm (Deubel).

(*Dialycera*.)

distincticornis Baudi. Schässburg (zwei Exemplare, das eine gekötscherl, das andere unter der Rinde eines alten Eichenstumpfes, c. a.).

Die Art ist zwar nur aus dem südlichen Gallien und Piemont bekannt; da jedoch die Beschreibung genau auf die vorliegenden Exemplare passt, dürfte kaum eine Verwechslung vorliegen. Dr. Bernhauer sah das eine der beiden Exemplare und bestätigte meine Determination.

108. *Omallum Gravenhorst.*

- rivulare** Payk. Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Alsó-Rákos, Rotenturm, Hátsszeg (c. a.); Hermannstadt, Michelsberg, Heltau, Zood, Grosspold (Ormay).
funebre Fauv. Rodnagelbirge (Hochalpin, aus Grasbüscheln gesiebt, Deubel).
oxyacanthae Grav. Frecker Gebirge (Sorbota, c. a.); Rodnagelbirge (Deubel, Ganglbauer); Bucsecs (Deubel).
caesum Grav. Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Schuler-Gebirge, Malomvitz, Toroczkó, Ilátszeg, Rotenturm, Unter-Kerz, Frecker Gebirge (Sorbota, c. a.); Zood, Schanta, Gyögy (Ormay); S.-Regen (Müller).
excavatum Steph. Gross - Scheuern, Mediasch (Bielz); Unter-Kerz, Frecker Gebirge (Sorbota, c. a.); Csukás, Bucsecs (Deubel); Hermannstadt (Ormay); Rodnagelbirge (Ganglbauer).
validum Kr. Bucsecs (alpin, Deubel).
ferrugineum Kr. Rotenturm, Bistra (c. a.).
Lokayi Fleischer. Bucsecs (Deubel, c. a.); in einem Jahre aus trockenem Reisig bei der Schutzhütte in grosser Anzahl, später nicht mehr gesammelt).

109. *Phloeonomus Heer.*

- (Xylostiba.)
monilicornis Gyll. Kronstadt (Deubel); Rodnagelbirge (Ganglbauer, unter der losen, feuchten Rinde von Bergahorn). (Phloeostiba.)
planus Payk. Gross - Scheuern (Bielz); Ratsonya (unter Erlenrinde), Bistra, Schässburg (am ausfliessenden Saft und unter Buchenrinde oft in grosser Zahl, c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay).
lapponicus Zett. Bistra (1 Exemplar, c. a.).
 (Phloeonomus s. str.)
pusillus Grav. Hermannstadt (Bielz); Frecker Gebirge (Sorbota, c. a.); Kronstadt, Zernest (c. a.).
minimus Er. Schässburg (unter Eichenrinde oder aus Eichenholz, 11. April, c. a.).

110. *Xylodromus Heer.*

- affinis** Gerh. (cephalotes Epp.). Oláhfalu (Bad Homrod, c. a.).
concininus Marsh. Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz); Schässburg (Breite in altem Eichenholz, c. a.); Hátsszeg (Deubel).
depressus Grav. (deplanatus Gyllh.) Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Reps, Oláhfalu, Schässburg (Lindenholz, c. a.); Hermannstadt (Ormay); Ratsonya (Müller).
testaceus Er. Hermannstadt (Bielz); Hátsszeg (c. a.); Wolkendorf bei Kr. (Deubel).

111. *Philorinum Kraatz.*

- sordidum** Steph.
 var. **Hopfgarteni** Epp. Siebenbürgen (Epelshain-Hopfgarten).

112. *Phyllodrepoidea Ganglbauer.*

- crenata** Grav. Kerzer Gebirge (Bielz).

113. *Lathrimaeum Erickson.*

- melanocephalum** Ill. Zibinsgebirge, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg (einmal an Rinderknochen, c. a.); Schuler-Gebirge, Bucsecs (Deubel, subalpin); Präsbe (Ormay).

- atrocephalum** Gyll. Kronstadt (Bielz); Schässburg (unter Laub, sehr häufig, c. a.); Hermannstadt, Heltau, Gyögy (Ormay).

- unicolor** Marsh. Zibinsgebirge (Bielz).

L. unicolor Marsh., dem westlichen Europa angehörig, dürfte irrtümlich in unser Verzeichnis gekommen sein.

114. *Olophrum Erichs.*

- boreale** Payk. Schässburg (einmal gesammelt, c. a.).

- assimile** Payk. Kronstadt (Bielz); Baassen, Schässburg (Kokelufer unter Blättern in Weidengebüsch, c. a.); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay).

- alpinum** Heer. Hátsszeger Gebirge (subalpin, Deubel).

115. *Arpedium Erichs.*

- quadrum** Grav. Zibinsgebirge (Bielz); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

116. *Acidota Mannerh.*

- erenata** F. Ober - Sebes, Kerzer Gebirge (Bielz); Bucsecs, Schuler - Gebirge, Nagyhagymás, Rodnagelbirge (Deubel).

- eruentata** Mannh. Schässburg (7. November, Atelishill, Kokelufer im Geniste, c. a.).

117. *Amphichroum Kraatz.*

- canaliculatum** Erichs. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge (Bielz); Malomvitz, Szováta (c. a.); Bucsecs, Schuler - Gebirge, Nagyhagymás, Rodnagelbirge (Deubel).

- hirtellum** Heer. Kronstadt (Ritivoi, 1 ♂, c. a.).

118. *Lesteva Latreille.*

- pubescens** Mannh. Rotenturm, Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Balánbánya, Csukás (c. a.); Bucsecs (Deubel); Hermannstadt, Heltau, Vidra (Erzgebirge), Remete (Nagyenyed, Ormay).

longelytrata Goeze (linlor F., maura Er.). Durch das ganze Berg- und Gebirgsland an Flussufern.
punctata Er. Zibinsgebirge (Bielz); Bánkánya (c. a.); Präsbe (Ormay).

119. *Geodromicus Redtenb.*

plagiatus F. Baassen (Bielz); Vargyas (in der Nähe der Almascher Höhle, Deubel).
 a. *nigrita* Müll. Unter-Kerz, Tordaer Schlucht (c. a.).
suturalis a. *concolor* Luze. (Grosses Exemplar). Schässburg (Kokelufer, c. a.).
puncticollis Wse. (*cerdicolis* Petri). Schässburg (Kokelufer, einmal unter Kukurutzstroh im Frühjahr gesammelt).

120. *Anthophagus Gravenh.*

Die Arten leben auf Blätten und Nadelholz, doch werden einige auch unter Steinen auf Alpenwiesen gesammelt.

(*Anthophagus i. sp.*)
bicornis Block. Präsbe, Kerzer Gebirge, Marosgebirge (Bielz); Kronstadt, Zernest (Deubel); Retjezat, Bucsecs (c. a.); Schanta (Ormay); Detunata (Mallász).
alpinus Payk. Szurul, Zibins-, Kerzer-, Kronstädter Gebirge (Bielz); Rodnagebirge (c. a.); Detunata (Mallász).
sudeticus Kiesew. Zibinsgebirge, Negoi, Kerzer Gebirge (Bielz); Retjezat, Paringul, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Bucsecs (Deubel).
alpestris Heer. Surul, Zibinsgebirge, Präsbe, Fogarasch, Fogarascher, Kerzer Geb. (Bielz); Retjezat, Paringul, Bistra, Borszék, Rodnagebirge, Bucsecs, Schuler-Gebirge, Schässburg (c. a.); Detunata (Mallász).
abbreviatus F. Kronstadt (Bielz); Csukás, Büdös, Schässburg (c. a.); Bistriz, Schuler-, Fogarascher Gebirge (Deubel).
 a. *fascifer* Reitter. Schässburg (c. a.).
melanoccephalus Heer. Zibins-, Fogarascher Gebirge (Bielz).

A. *melanoccephalus* Heer dürfte wohl bei uns nicht vorkommen; wahrscheinlich liegt hier eine Verwechslung mit A. *omalinus* Zett. vor, den Bielz nicht anführt.

omalinus Zett. Bucsecs, Schuler-Gebirge (c. a.); Paringul, Hátzegger Gebirge, Nagyhagymás (Deubel).

(*Phaganthus*)

caraboides L. Zibinsgebirge, Hosszuvalu, Kronstadt (Bielz); Schässburg (auf Weidenblüten, wohl durch das ganze Gebiet verbreitet).

praeustus Müll. Zernest (Plaju foi, Deubel).

121. *Eudectus Redtenb.*

Graudi Redtenb. Bucsecs (Alpin und subalpin gesiebt, Deubel).

122. *Coryphlodes Bernhauer.*

Deubeli Bernb. Rodnagebirge, Bucsecs (aus Grasbüscheln gesiebt, Deubel).

123. *Niphetodes Mill.*

Die Arten werden aus Grasbüscheln gesiebt. (Niphetodes s. str.)

Redlenbacheri Mill. Rodnagebirge (Korenjis, c. a.), Kuhhorn, Deubel).
Spaethi Ganglb. Rodnagebirge (Kuhhorn, c. a., Deubel).
Eppelsheimeri Ganglb. Rodnagebirge (Kuhhorn, Korenjis, c. a., Saka, Deubel). (Hypsonothrus.)
Deubeli Ganglb. Rodnagebirge (Kuhhorn), Bucsecs (Deubel, c. a.); Kerzer Gebirge (Vunetare, c. a.).

Oxytelli.

124. *Syntomium Curtis.*

aeneum Müll. Retenturm, Büdös, Frecker Gebirge (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

125. *Deleaster Erichs.*

An Flussufern im Geniste.

dichrous Grav. Kronstadt (Bielz); Unter-Kerz, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Retenturm (Ormay).
 var. *Leachi* Curt. Michelsberg, Zoed, Rotenturm, Ober-Schebesch, Peresest, Gross-Schenk, Kronstadt, Hosszuvalu (Bielz); Unter-Kerz, Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.).

126. *Coprophilus Latreille.*

striatulus F. Gross-Scheuern, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel); Schässburg (c. a.).

127. *Acrognathus Er.*

mandibularis Gyll. Honigberg (Altufer, Deubel).

128. *Planeustomus Duval.*

Kahri Kraatz. Siebenbürgen. (Lebt auf sumpfigen Wiesen, gräbt in der Erde, schwärmt gegen Sonnenuntergang).

palpalis Er. Honigberg (Altufer, Deubel).

129. *Ancyrophorus Kraatz.*

longipennis Fairm. Bucsecs (Subalpin, Deubel).

omalinus Er. Csukás (Bachufer unter Steinen, c. a.).

130. *Thinobius Kiesenw.*

(*Thinophilus*.)

linearis Kr. Honigberg (Altufer, Deubel).

131. *Trogophloeus Mannerh.*

(*Thinodromus.*)

dilatatus Er. Hermannstadt (Bielz); Rotenturm (c. a.); Rodnagebirge (Valea vinalui), Alsó-Rákos (Deubel).

hircifollis Rey. Rotenturm (Altufer unter Steinen, c. a.); Honigberg, Alsó-Rákos (Deubel).

(*Carpalimus.*)

arcuatus Steph. Gross-Schenk (Bielz); Unter-Kerz, Alsó-Rákos (Altufer, c. a.); Honigbreg (Altufer, Deubel).

(*Trogophloeus s. str.*)

bilineatus Steph. An den Ufern süsser Gewässer durch das ganze Berg- und Hügelland.

rivularis Motsch. Schässburg (c. a.); Bistritz, Honigberg (Deubel).

(*Boopinus.*)

memnonius Er. Honigberg (Altufer, Deubel).

politus Kiesenw. Karlshurg, Unter-Kerz (c. a.).

(*Taenosoma.*)

elongatus Er. Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Schässburg (Kokelufer, häufig, c. a.); Talmesch (Ormay).

impressus Lec. Baroth (Méhely); Honigberg (Altufer, Deubel).

corticinus Grav. Hermannstadt, Kronstadt, S.-Regen, Záh (Bielz); Rotenturm, Schässburg (c. a.); Talmesch (Ormay).

punctatellus Er. Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Schässburg (c. a.).

pusillus. Schässburg (Fuchsloch, c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

subtilis Er. Schässburg (Kokelufer, c. a.).

(*Troginus.*)

exiguus Er. Karlshurg (Bielz); Schässburg (Kokelufer, c. a.); Honigberg (Altufer, Deubel).

132. *Haploderus Stephens.*

caelatus Grav. Hászeg, Götzenberg, Frásbe, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Talmesch (Ormay); Bistritz (Müller).

caesus Er. Neudorf b. H. (Bielz); Karlshurg (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

133. *Oxytelus Gravenh.*

Die Arten leben unter faulenden Pflanzen- und Tierstoffen, oft in Exrementen.

(*Oxytelus s. str.*)

rugosus F. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

opacus Kr. Fogarasch (Bielz).

rugifrons Hochb. Hászeg, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Baassen, Oláhfalu (c. a.).

Insecatus Grav. Hermannstadt, Holzmengen, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Schässburg (3. April, auf Kohlblättern),

Marosujvár (c. a.); Schuler-Gehirge, Altufer (Deubel).

fulvipes Er. Rotenturm (unter Blättern, c. a.).

(*Tanycraerus.*)

laqueatus Marsh. (*Iuteipennis* Er.). Salzburg, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Rodnagebirge, Borszék, Bucsecs (c. a.); Paringul, Schulergebirge (Deubel). (Caccporus.)

piceus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

(*Epomotylus.*)

sculptus Grav. Kronstadt, Schässburg, Záh (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Déva (c. a.).

(*Anotylus.*)

inustus Grav. Schässburg (Fuchsloch am ausfliessenden Safte einer Buche, Witeberg, c. a.).

sculpturatus Grav. Kronstadt, Rotenturm, Zalatna (Prászaka), Schässburg (c. a.).

politus Er. Schässburg (Fuchsloch in 1 Exemplar, c. a.).

nifidulus Grav. Hermannstadt, Götzenberg, Kerzer Gehirge (Bielz); Kronstadt, Schässburg, Toroczkó, Naszód, Rodnagelände (c. a.).

intricatus Er. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.).

complanatus Er. Schässburg, Oláhfalu (Bielz); Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

clypeonitens Pand. Kerzer Gehirge, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Zalatna (Prászaka), Schässburg, Karlsburg (c. a.).

tetracarinatus Block. Hermannstadt, Holzmengen, Götzenberg, Kerzer Gehirge, Schässburg, Oláhfalu, Gyeke (Bielz); Gyögy (Ormay); Paringul (Deubel).

hamatus Fairm. Kerzer Gehirge (Bielz); Rosenauer Geb., Rodnagelände (Deubel).

134. *Platystethus Mannh.*

Die Arten dieser Gattung leben ähnlich wie die der vorigen.

(*Pyctocraerus.*)

arenarius Geoffr. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

laevis Kiesenw. Rodnagelände. (Oberhalb der Baumregion aus Grashüschen gesiebt, Deubel).

(*Platystethus s. str.*)

cornutus Grav. Hermannstadt, Grossschenk, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Rodnagelände (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. **alutaceus** Thoms. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

capito Heer. Karlsburg, Schässburg, Rodnagelände (c. a.); Schulergebirge, Honigberg (Altufer, Deubel).

nodifrons Sahlb. Rodnagelände (Deubel).

nitens Sahlb. Unter-Kerz, Schässburg, Torda, Rodnagelände (c. a.); Kronstadt (Deubel).

135. *Bledius Mannh.*

Die Arten dieser Gattung graben Gänge in der Erde, besonders in der Nähe der Gewässer.

(*Bledius s. str.*)

furcatus Ol. (*taurus* Germ.). Déva (Bielz).

tricornis Hbst. Salzburg, Schässburg (Bielz); Torda, Marosujvár, Baassen (c. a.); Szamosujvár, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Nieder-Eidisch (Müller).

unicornis Germ. Déva, Salzburg (Bielz); Torda, Baassen, Szováta (c. a.)

(Elbodus.)

bicornis Germ. Salzburg (Bielz); Torda (c. a.).

(*Bledioides*)

littoralis Heer. Kronstadt, Tartlau (Bielz).

pallipes Grav. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Unter-Kerz, Schässburg (Kokel-ufer, c. a.); Altufer (Deubel).

longulus Er. Schässburg (c. a.).

opacus Block. Hermannstadt, Birthälm, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Rotenturm, Schässburg, Baassen, Alsó-Rákos (c. a.).

atricapillus Germ. Hátszeg, Schässburg (Kokelufer in feuchten Letten, c. a.).

var. **nanus** Er. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (Kulterberg, Waldrand in lehmig-sandiger Erde, c. a.).

fracticornis Payk. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Baassen, Előpatak (c. a.); Hátszeg, Kronstadt (Deubel); Klausenburg (Müller).

procerulus Er. Hátszeg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

erassicollis Lac. Birthälm (Bielz); Baroth (Méhely).

cirraticollis Heer. Hermannstadt, Neudorf b. H., Mediaseh, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Nagyenyed (c. a.); Kronstadt (Deubel).

dissimilis Er. Hermannstadt, Tartlau (Bielz); Karlsburg, Schässburg (Kokel-ufer, c. a.).

var. **nigricans** Er. Schässburg (c. a.).

erraticus Er. Hermannstadt (Bielz); Kerzer Gebirge, Schässburg (Kulterberg zusammen mit Bl. *nanus* Er., c. a.); Kronstadt (Deubel).

(*Hesperophilus*.)

subterraneus Er. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (Kokelufer, c. a.); Altufer (Deubel).

arenarius Payk. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz).

fossor Heer. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (Kokelufer, c. a.).

Oxyporini.

Oxyporini.

136. *Oxyporus Fbr.*

Die Arten leben auf Hutpilzen.

rufus L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

maxillosus F. Hátszeg, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Bistra, Csukás (c. a.).

var. **angularis** Gebl. Csukás (c. a.).

var. **Schönherrii** Mannh. Csukás (c. a.).

Steninae.

Stenini.

137. *Stenus Latr.*

(*Stenus s. str.*)

biguttatus L. Im ganzen Berg- und Hügelland an den Ufern der süßen Gewässer.

var. **bipustulatus** Thoms. Fogarasch (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

bipunctatus Er. Wie der vorige verbreitet, auch am Annen-See bei Tusnád.

longipes Heer. Déva, Zalatna, Héviz, Schässburg, Raassen, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. **carinifrons**. Schässburg (Kokel, c. a.)

Stenus longipes var. **carinifrons**.

Die Taster dieser Varietät sind ähnlich gefärbt wie die des Sternus biguttatus L., das erste Glied ist ganz, das zweite in der Wurzelhälfte gelb, das dritte an der Wurzel sehr schmal, etwas heller. Die ausgehöhlte Stirne ist kräftig gekielt. Bei einem Weibchen ist der Körper bläulichschwarz ohne Metallschimmer, während ein Männchen aus Mehadia lebhaften Schimmer besonders auf dem Abdomen besitzt. Die Varietät gehört zu den unterschieden zu St. longipes, da sie den schlanken Körper dieser Art besitzt; auch die gelbrote Makel auf den Flügeldecken stimmt nach Größe und Lage genau mit der bei St. longipes überein, ebenso die Punktierungen des Abdomens, welche bis zur Spitze desselben kräftiger und tiefer ist als bei St. biguttatus, auf welche diese Varietät nach der Tasterfärbung und Körperform gedeutet werden könnte. Auch die männlichen Geschlechtsauszeichnungen an den hinteren Ventralsegmenten stimmen mit denen des St. longipes überein.

guttula Müll. Hátszeg, Schässburg (Bielz); Karlsburg, Szurduk-Pass, Reps (c. a.).

stigmula Er. Schässburg (c. a.); Bredendorf (Priesterhügel am Altufer, Deubel).

bimaculatus Gyll. Hermannstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel); Klausenburg.

Juno Payk. Hermannstadt (Bielz); Kronstadt (Gespreg, Deubel).

ater Mannh. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

clavicornis Scop. Schässburg, Reps, Nussbach, Kronstadt, Záh (Bielz); Tordaer Schlucht, Petrozsény, Rotenturm, Baassen (c. a.).

providus Er. Kronstadt, Bükszár, Schässburg (Bielz); Baassen, Karlsburg, Szováta (c. a.); Hermannstadt, Heltau, Rotenturm, Kleinpold (Ormay).
scrutator Er. Kronstadt, Schässburg, Oláhfalu (Bielz).
Rogerii Kr. Rodnagebirge (Valea viului). Oláhfalu (c. a.).
silvester Er. Rodna - Gebirge, Tordaer Schlucht, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Klausenburg (Müller).
proditor Er. Gyögy (Bad, Ormay).
asphaltinus Er. Talmesch (Bielz); Schässburg (c. a.).
fossulatus Er. Kronstadt, Bükszár (Bielz); Zalatna, Topánfalva, Schässburg, (Schleifengraben, c. a.).
gracilipes Kr. Kerzer Gebirge, Retjezat (c. a.); Vargyashbach (Deubel).
atterimus Er. Schässburg (bei Formica rufa), Gross-Alisch b. Sch. (c. a.); Kronstadt (Deubel); Rotenturm (Ormay).
alpicola Fauv. Csukás, Bucsecs, Königstein (Deubel).
(Nestnas.)
ruralis Er. Fogarasch (Bielz); Nussbach, Unter-Kerz, Nagyenyed (c. a.).
buphtalmus Grav. Hermannstadt (Bielz); Ober - Kerz, Unter - Kerz, Alsó - Rákos (Tepe), Schässburg (Kokelufer, c. a.); Honigberg (Altufier, Deubel); Kerzer Gebirge (Ormay); Maros - Gebirge (Müller).
incrasatus Er. Kronstadt (Gespreng, Deubel); Unter-Kerz (c. a.).
canaliculatus Gyll. Hermannstadt (Bielz).
morio Grav. Fogarasch, Schässburg (Bielz); Schässburg, Rodnagebirge (c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).
trivialis Kr. Nagyenyed (c. a.).
melanarius Steph. Kronstadt (Gespreng, Méhely); St. Annen-See (c. a.).
atratus Er. Oláhfalu (Bielz); Nagyenyed (c. a.).
subdepressus Rey. Unter-Kerz (c. a.).
melanopus Marsh. Hermannstadt (Bielz); Rotenturm (Ormay).
foraminosus Er. Schässburg (Bielz).
nanus Steph. Schässburg, Rotenturm (c. a.); Nagyhagymás, Schuler - Gebirge, Rodnagebirge (Deubel); Hermannstadt (Ormay).
circularis Grav. Hátszeg, Kerzer Gebirge, Schässburg (Bielz); Karlburg, Balánbánya, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay).
vafellus Er. Gross-Scheuern (Bielz); Unter-Kerz (c. a.).
cautus Er. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Ober-Kerz (c. a.).
fuscipes Grav. Hermannstadt (Bielz); Honigberg, Brenndorf (Altufier, Deubel).

Argus Grav. Honigberg (Altufier, Deubel).
humilis Er. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
var. **phyllobates** Pennecke. Hátszeg Gebirge, Rodnagebirge (Deubel).
carbonarius Gyll. Nussbach (Bielz); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay). (Tesnus.)
eumerus Kiesenw. Schässburg, Paringul, Borszék (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).
opticus Grav. Hermannstadt (Bielz).
erassus Steph. Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Schässburg, Tordaer Schlucht, Unter-Kerz (Klosterweiher, c. a.).
formicetorum Mannh. Schässburg (c. a.).
nigritulus Gyllh. Hermannstadt (Bielz).
brunnipes Steph. Hátszeg, Rodnagebirge (c. a.).
(Hypostenus.)
latifrons Er. Mezőség (Záh, Bielz); Kronstadt (Gespreng, Deubel).
tarsalis Ljungh. Petrozsény (c. a.); Hátszeg (Deubel).
similis Hbst. Hátszeg, Neudorf bei H., Schässburg, Reps, Héviz (Bielz); Schuler - Gebirge, Unter - Kerz, Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt, Schanta (Ormay); Detunata (Mallász).
solutus Er. Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).
cicindeloides Schall. Hátszeg, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Schässburg (Bielz); Unter-Kerz, Schuler - Gebirge, Baassen, Marosujvár (c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt, Michelsberg, Talmesch, Rotenturm (Ormay).
fornicatus Steph. Kronstadt (Gespreng, Méhely); Honigberg (Altufier, Deubel). (Hemistenus.)
binotatus Ljungh. Holzmengen, Záh (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt, Schuler-Gebirge (Deubel).
pallitarsis Steph. Holzmengen (Bielz); Brenndorf (Altufier), Kronstadt (Gespreng, Deubel).
picipes Steph. Hátszeg, Schässburg (Bielz).
bifoveolatus Gyll. Kronstadt (Deubel).
(Parastenus.)
glacialis Heer. Frecker Gebirge (Serbota), Kerzer Gebirge (Bulea), Rodnagebirge (c. a.); Bucecs, Paringul, Negoi (Deubel).
fuscicornis Er. Hermannstadt (c. a.).
Die Art wird wohl oft verwechselt werden mit St. **vafellus** Er. und **Argus** Grav., von denen sie leicht unterschieden werden kann durch tiefer gespaltenes viertes Tarsenglied und das gestreckte erste Glied der Hintertarsen, das deutlich länger ist als das Krallenglied.
geniculatus Grav. Hermannstadt (Bielz).
flavipalpis Thoms. Schässburg (c. a.).
transsilvanicus Bernh. Rodnagebirge (Saca, Deubel, c. a.); Bucecs (c. a.).

palustris Er. Retjezat (Zenoga-See, c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Deubel).

Schässburg und Héviz sind zu streichen.

impressus Germ. Hermannstadt (Bielz).

Schässburg und Héviz sind zu streichen.

Erichsoni Rye. Hermannstadt, Kronstadt, Reps, S.-Regen (Bielz); Alsó-Rákos, Schässburg, Baassen, Balánbánya, Ratsonya, Rodnagelirge (c. a.).

montivagus Heer. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Talmesch, Rotenturm, Präsbe (Ormay); Büdös, Borszék, Csuakás, Bucsecs (c. a.); S.-Regen (Müller).

var. *coarcticollis* Epp. Frecker Gebirge (Serbota), Borszék, Ratsonya, Rodnagelirge (c. a.); Nagy-Hagymás (Deubel).

var. *carpathicus* Ganglb. Schuler-Gebirge, Alsó-Rákos, Balánbánya, Rosenauer Gebirge (c. a.); Nagyhagymás, Paringul, Rodnagelirge (Deubel).

obscuripes Ganglb. Rodnagelirge (Ganglbauer, Deubel, c. a.); Bucsecs, Nagy-hagymás (Deubel).

pallipes Grav. Előpatak (c. a.); Kronstadt (Gespreng), Honigberg (Altufier, Deubel); Rotenturm (Ormay).

Kolbei Gerh. Schässburg, Rotenturm, Borszék (c. a.); Várhegy (Deubel); Rodnagelirge (Tianglbauer).

Reitteri Weis. Rodnagelirge (Szaka, Pintredu, aus Grashüscheln gesiebt, c. a.); Bucsecs (Deubel).

138. *Dianous Samouelle.*

coerulescens Gyllh. Déva, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Csuakás, Szurduk-Pass, Paringul (c. a.); Rodnagelirge (Valea vinului), Törzburg, Hátszeg (Deubel).

Euaesthetinae.

Euaesthetini.

139. *Euaesthetus Leconte.*

bipunctatus Ljungb. Kronstadt (Bielz); Schässburg (Breite, Witeberg, aus Grashüscheln gesiebt), Unter-Kerz (Klosterweiher, aus Moos gesiebt, c. a.).

ruficapillus Lae. Kronstadt (Gespreng), Rodnagelirge (Alpin, Deubel).

taeviusculus Maunh. Schuler-Gebirge (Deubel).

Paederinae.

Paederini.

140. *Astenus Stephens.*

(*Sauvius* Er.)

uniformis Duv. Rosenau (Umgebung der Flintschöhle, Deubel).

filiformis Latr. Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Unter-Kerz, Marienburg b. Kr., S.-Regen, Záh (Bielz); Rotenturm, Kákova (Ormay); Kronstadt (Deubel).

a. *laticeps*. Előpatak, Schässburg (c. a.).

A. *filiformis* a. *laticeps* Länge 4'5—6 mm. Zur Vergleichung lagen mir vor zwei Exemplare *Astenus filiformis* Latr. aus Berlin. Unsere Exemplare besitzen meistens einen breiteren und grösseren Kopf mit flacheren Augen und in der Anlage rechtwinkligen, weniger breit abgerundeten Schläfen, wodurch diese parallel oder nahezu parallel zu einander verlaufen, während sie bei den Berliner Stücken deutlich nach hinten konvergieren. Die Flügeldecken sowie die ersten Hinterleibsegmente sind etwas weniger dicht und größer, körnig punktiert, glänzender, fast wie bei A. *cribellus* Baudí, der mir aus Margellao (von Reitter stammend) vorliegt, von dem unsere Art jedoch durch breiteren, robusteren Körper, längere Flügeldecken, namentlich aber grösseren Kopf und breiteren Hals-schild zu unterscheiden ist.

angustatus Payk. Gross-Scheuern (Bielz); Karlsburg, Déva, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel). Wahrscheinlich über unser ganzes Hügel- und Bergland verbreitet.

var. *neglectus* Mark. Schässburg, Marienburg b. Sch., Borszék (c. a.); Rotenturm (Ormay); Kronstadt (bei Ameisen, Deubel).

immaculatus Steph. Hermanns'alt, Előpatak (Bielz); Schässburg (c. a.).

141. *Paederus Fabr.*

(*Paederidus*)

ruficollis F. (*sanguinicollis* Steph.). Hermannstadt, Holzmeien, Kerz, Arpascher Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Marienburg b. Kr., Héviz, Schässburg, Mediasch, Marosgebirge, Präsbe (Bielz); Karlsburg, Hátszeg, Nagyenyed, Petrozsény, Előpatak (c. a.); Rotenturm, Talmesch, Remete, Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay).

gemellus Kr. Hátszeg, Arpascher Gebirge, Dees (Bielz); Petrozsény, Unter-Kerz, Héviz, Schässburg, Naszód, Ilvamika b. Naszól (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(*Paederus s. str.*)

riparius L. Hátszeg, Gross-Scheuern, Marienburg bei Kr. (Bielz); Heltau (Ormay); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

fuscipes Curt. Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Kronstadt, Előpatak, Mediasch, Sächs.-Iegen, Dees (Bielz); Schässburg, Marosujvár, Petrozsény (c. a.); Rodnagelirge (alpin), Schuler-Gebirge (Deubel).

limnophilus Er. Hátszeg, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Poresest, Marienburg b. Kr., Bükszad, Mediasch, Schässburg (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Ilvamika (bei Naszód, c. a.); Kronstadt, Rodnagelirge (Deubel).

littoralis Grav. (*gregarius* Fauv., *vulgaris* Mill.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

brevipennis Lac. Gross-Scheuern, Rotenturm, Záh, Gyeke (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Rodnagelbirge (c. a.); Törzburg (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

142. *Stilicus Serville.*

angustatus Geoffr. (*fragilis* Grav.). Hátszeg, Ober-Sebes, Reps, S.-Regen, Dees (Bielz); Karlsburg, Schässburg (c. a.); Honigberg (Altufer, Deubel); Hermannstadt (Ormay).

subtilis Er. Hermannstadt, Schässburg, Oláhfalu (Bielz); Karlsburg, Reps (c. a.); Rotenturm (Ormay); Kronstadt (Deubel).

rufipes Germ. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Balán-hánya, Ober-Kerz, Előpatak, Karlsburg (c. a.); Schanta (Ormay); Kronstadt (Deubel).

similis Er. Hátszeg, Gross-Scheuern, Neudorf b. II., Mediasch, Schässburg, Oláhfalu, S.-Regen, Záh (Bielz); Unter-Kerz (c. a.); Rotenturm, Hermannstadt (Ormay).

orbiculatus Payk. Hermannstadt, Holznen-gen, Marienburg bei Kr., Bükszad (Bielz); Karlsburg, Unter-Kerz, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Rotenturm (Ormay).

Erichsoni Fauv. Hermannstadt, Karlsburg, Schässburg (c. a.); Rosenau, Zernest (Deubel).

143. *Scopaeus Kraatz.*

sulcicollis Steph. (*cognatus* Rey.). Kerzer Gebirge, Rotenturm (Ormay); Hátszeg, Schässburg, Baassen. (Auch in Maulwurfshaufen, in welchen die gelbe Ameise lebt).

minutus Er. (*sulcicollis* aut. et Ganglbauer). Kronstadt, Oláhfalu (Bielz); Schässburg, Rotenturm (c. a.).

minimus Er. Rotenturm, Ober-Kerz (Glas-hütte), Schässburg, Borszék (c. a.).

bicolor Baudi. Nagyenyed (c. a.).

gracilis Sperk. Schässburg, Büdös, Naszód (c. a.); Rodnagelbirge (Deubel).

laevigatus Gyllh. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Baassen, Unter-Kerz (c. a.); Hátszeg, Kronstadt (Deubel).

144. *Lithocharis Lacord.*

ochracea Grav. Karlsburg, Mezőség (Záh, Bielz); Schässburg (Türkenhill, von Schilfrohr geklopft, Oktober, c. a.).

145. *Medon Stephens.*

(*Medon* s. str.)

castaneus Grav. Hermannstadt (Bielz).

brunneus Er. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Toroczkó, Büdös, Schässburg, Szováta (c. a.).

ferrugineus Er. (*brachypennis* m. olim, nitidus Petri). Schässburg (Scherkes, am Waldrande unter Blättern im ersten Frühjahr, einmal im Fuchsloch).

fuscus Mannh. Gross-Scheuern, Holzmengen (Bielz); Baassen, Rotenturm, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Ge-spreng, Deubel); Kakova (Ormay).

rufiventris Nordm. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (Breite, in einer alten Eiche, c. a.).

(Chloeocaris.)

melanocephalus F. Hátszeg, Hermannstadt, Zool (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Marosujvár (c. a.); Kronstadt (Deubel). (Pseudomedon.)

obsoletus Nordm. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (Kokelufer, in Geniste, 6. November, c. a.).

var. **obscurellus** Er. Hermannstadt (Bielz).

146. *Lathrobium Gravenh.*

(*Lobrathium*)

multipunctatum Grav. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel); Rotenturm (Ormay).

(Platydomene.)

sodale Kr. Siebenbürgen (Katalog. col. Europa, 1906).

L. *angusticolle* Lac. ist aus dem Verzeich-nisse siebenb. Käfer zu streichen.

picipes Er. Kerzer Gebirge (Ormay).

(Tetartopus.)

quadratum Payk. Déva, Mezőség (Záh, Bielz); Schässburg (Kokelufer, c. a.); Hermannstadt (Ormay).

terminatum Grav. Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg, Ivamika (Naszól, c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel); Her-mannstadt (Ormay).

angustatum Lac. Gross-Scheuern (Bielz); Rodnagelbirge, Honigberg (Altufer, Deubel).

Nach Ganglbauer (Käfer von Mitteleuropa) soll diese Art nur im Westen von Europa bis Wien vorkommen; daher sind die Angaben für das Vorkommen der Art bei uns zu über-prüfen, zumal Bielz L. *scutellare* Nolm. nur als Varietät des L. *angustatum* auffasst.

scutellare Nordm. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg, Baassen (c. a.).

(*Lathrobium* s. str.)

rufipenne Gyllh. Kerzer Gebirge (Bielz). Bükszad als Fundort des L. *rufipenne* Gyllh. ist irrtümlich aufgenommen worden.

elongatum L. Zibinsgebirge, Krizba, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Hermann-stadt, Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Or-may).

- geminum** Kr. (boreale Thoms. nec. Hochb.). Bükszál (Bielz); Schässburg, Rodnagebirge (c. a.); Honigberg (Altufier, Deubel); Gyergyó-Tölgyes (Ormay).
ripicola Czwal. Kronstadt, Zernest, Vargastal (Deubel).
laevipenne Heer. Bükszál (Bielz); Hátszeg (Kriva lja), Rotenturm, Schässburg, Ilvamika (Naszód, c. a.); Rodnagebirge, Kronstadt (Deubel).
castaneipenne Kol. Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Schässburg (c. a.); Rodnagebirge (Deubel); Geisterwald (Méhely).
fulvipenne Grav. Hátszeg, Präsbe, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay); Borszék (c. a.).
var. **Letzneri** Gerh. Honigberg (Altufier, Deubel); Schässburg (c. a.).
brunnipes F. Déva, Kerzer Gebirge, Mezőség (Záh, Bielz); Hammersdorf, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay).
foveatum Steph. Honigberg (Altufier, Deubel).
filiforme Grav. Honigberg (Altufier, Deubel).
longulum Grav. Zibins-Gelirge (Bielz); Unter-Kerz, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay).
var. **longipenne** Fairm. Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).
dilutum Er. Schässburg (c. a.).
pallidum Nordm. Schässburg (c. a.); Geisterwald (Méhely); Várhegy (Deubel).
(Glyptomerus.)
coecum Friv. Rotenturm (Ormay); Karlsburg (aus einem verpilzten, modrigen Buchenstumpf gesiebt, c. a.).

147. *Scimbalium* Erichs.

- anale** Nordm. Siebenbürgen (Katalog, Coleopt. Europae).

148. *Achenium* Curtis.

- humile** Nic. Hermannstadt, Mezőség (Záh, Bielz); Baassen, Karlsburg (c. a.); Honigberg (Altufier), Várhegy (Deubel); Szamosujvár (Ormay).

149. *Dolicaon* Laporte.

- biguttalus** Lac. Déva (c. a.); Klausenburg (Müller).

150. *Cryptobium* Mannh.

- fractorne** Payk. Zibinsgelirge, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Hermannstadt, Schässburg (Breite, auf sumpfigem Boden aus Gras üsceli gesiebt, c. a.);

- Rotenturm, Präsbe (Ormay); Kronstadt (Gespreng, Deubel); Rodnagebirge (Ganglbauer).
var. **brevipenne** Muls. Schässburg (c. a., mit der Stammform).

Staphylininae.

Xantholinini.

151. *Leptacinus* Erichs.

- batychrus** Gyll. Hermannstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Hátszeg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
var. **linearis** Grav. Kronstadt (Deubel).
formicetorum Maerk. Schässburg. (In den Nestern der grossen braunen Ameise, c. a.); Kronstadt (ebenso, Deubel).

152. *Xantholinus* Serville.

- (Gyrohypnus.)
punctulatus Payk. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
var. **Thomsoni** Schwarz. Zusammen mit der Stammform.
angustatus Steph. (ochraceus Gyll.). Hermannstadt, Reps, Schässburg, Mezőség (Záh, Bielz); Rotenturm (Ormay); Kronstadt, Nagyhagymás, Rodnagebirge (Deubel).
atratus Heer. Kronstadt (bei Aneisen), Rodnagelirge (Deubel).
(Xantholinus s. str.)
relucens Grav. Gyergyó-Tölgyes (Ormay).
glaber Nordm. Schässburg. (In alten Eichen bei Lasius brunneus, c. a.).
rufipennis Er. Kerzer Gebirge (Bielz); Honigberg (Altufier), Nussbach (Deubel).
decorus Er. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Sächsisch-Regen (Bielz); Hátszeg, Baassen, Schässlburg. (In alten Eichen bei Lasius brunneus, c. a.); Bistritz (Müller).
tricolor F. Gross-Scheuern, Oláhfalu, S.-Regen (Bielz); Malomvitz (Hátszeg), Schässburg, Ilvamika (Naszód, c. a.); Hermannstadt, Kronstadt, Hátszeg, Zernest, Alsó-Rákos (Deubel); Michelsberg, Heitau, Rotenturm, Präsbe, Pörrumbaker Gebirge (Ormay).
crassicornis Hochb. Schuler-Gebirge (Deubel).
procerus Er. Hátszeg (Bielz).
validus n. sp. Schässburg (Kokelufer, c. a.).

- Xantholinus validus** n. sp.
Nicro-piceus nitidus, palpis, autonarum articulis tribus basalibus, pedibus, abdominis segmentis ultimis, meso- et metasterno rufo-testaceis, elytris pallidi testaceis. Caput oviforme, disperse subtiliter punctatum, medio laeve, striis frontalibus interioribus postice vix convergentibus, oculis medioribus. Prothorax capite angustior, latitudine maxima squali longior, basin versus conspicue angustatus, lateribus disperse irregulatiter punctatus. Elytra prothorace vix breviora, vix latiora, nitida, disperse subtiliter

punctata. Abdomen modice nitidum, subtiliter coriacuum, valde disperse punctulatum.

Länge 10'5—11'5 mm. 2 specimina.

Etwa von der Gestalt und Grösse des *X. relucens*, aber durch vollkommen eiförmigen Kopf, feine und gleichartige Punktierung desselben und andere Merkmale leicht zu unterscheiden.

Der Kopf ist vollkommen eiförmig, nach hinten stark gerundet, erweitert, mit vollkommen abgerundeten und breiten Schläfen, die vorderen Stirnfurchen parallel, nur an der äussersten erlöschenden Spitze etwas nach innen gebogen, die hinteren Stirnfurchen vom inneren Augenrande schief nach rückwärts gerichtet und etwas ausserhalb der Richtung der vordern Stirnfurchen in einem Grübchen endigend; sehr zerstreut und fein punktiert mit breiter, glatter Mittellinie. Die Fühler schwarz, die drei ersten Glieder heller, das dritte etwas länger als das zweite, konisch, die folgenden Glieder quer, die vorletzten an der Spitze fast doppelt so breit als lang. Der Hals schild schmäler als der Kopf, fast um die Hälfte länger als breit, nach hinten deutlich, wenn auch nicht sehr stark verengt, mit breitem, glattem Mittelfeld, die Seiten verworren fein punktiert, die Punkte vorne zahlreicher als hinten in der Mitte sehr spärlich und von derselben Stärke, wie die des Kopfes, separierte Mittelfreien kaum erkennbar. Flügeldecken fast von Hals schildlänge und kaum breiter als der Halsschild an der breitesten Stelle, glänzend zerstreut, feiner als der Halsschild und seicht punktiert. Schildchen glatt und dunkel. Hinterleib gewölbt, parallel, mässig, etwas fettig glänzend, fein chagriniert mit sehr zerstreuten feinen Punkten, sehr fein, etwas abstehend behaart (bei seitlicher Ansicht deutlich erkennbar) mit einzelnen längeren Borsten am Seitenrande, an der Spitze und auf der Unterseite, eine einzelne Borste steht auf dem fünften sichtbaren Dorsalsegmente zu beiden Seiten der Scheibenmitte vor dem Hinterrande. Tarsen nicht erweitert, sexuelle Unterschiede nicht bemerklich.

Ich hielt die Art bisher für *X. procerus* Er. Bei der Revision meiner Sammlung fiel mir der bedeutende Größenunterschied zwischen meinen Exemplaren und den Angaben Erichstes auf und die Bemerkung bei Kraatz (Insekten Deutschlands, Staphylinini, p. 637), dass *X. procerus* die „ansehnlichste europäische Art sei“. Später teilte mir Dr. Bernhauer, dem ich ein Stück vorlegte, mit, dass ihm das Tier unbekannt sei. Obgleich es nun schwer und unsicher ist, nach der Beschreibung Unterschiede aufzufinden, so glaube ich, ausser dem Größenunterschiede, dem übrigens aus bekannten Gründen keine allzugrosse Bedeutung beigelegt werden darf, doch einige Unterschiede konstatieren zu können. Während die neue Art der Gestalt nach in die Nähe des *X. relucens* gehört, besitzt sie die Kopfform und Punktierung des *X. distans*. Die Färbung von Kopf und Hals schild ist dunkelbraun, bei *X. procerus* schwarz mit Metallschimmer, bei letzterem sind die Flügeldecken braunrot, bei der neuen Art hell gelbbräun, wie bei *X. relucens*. Die drei ersten Fühlerglieder sind bei beiden Exemplaren heller, bei *X. procerus* schwarz. Die Kopfpunktierung des letzteren scheint kräftiger zu sein als bei der neuen Art, bei der sie ebenso fein ist als bei *X. distans* und etwas feiner als bei *X. tricolor*; auch die Punktierung der Flügeldecken ist zerstreuter, feiner und seichter als bei *X. procerus*.

Ob der von Bielz aus Hátszeg angeführte *X. procerus* auch bieher gehört, kann vorläufig nicht entschieden werden, da mir Tiere aus dieser Gegend fehlen.

cribripennis Fauv. Schieltal (Bielz); Csukás (? c. a.).

distans Rey. Kronstadt (Bielz); Paringul, Zalatna, Rotenturm, Frecker Gebirge (Serbota), Kerzer Gebirge, Schuler-Gebirge, Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.).

linearis Oliv. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. longiventris Heer. Karlsburg, Unter-Kerz, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

153. *Nudobius* Thomson.

tenuis Grav. (Wingelmülleri Bern.). Kronstadt (Bielz); Schässburg, Bistra, Borszék (c. a.); Hátszeg (Deubel); Rodnaberge (Ganglbauer, unter Fichtenrinde); Negoi (Wingelmüller teste Bernhauer).

154. *Gauropterus* Thomson.

(Eulissus Epp.)

fulgidus F. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Marosgebirge, Dees (Bielz); Puj (Hátszeg), Schässburg (c. a.); Kerzer Gebirge, Gyögy (Ormay); S.-Regen (Müller).

155. *Baptolinus* Kraatz.

pilicornis Payk. Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Bozauer Pass (Bielz); Bistra, Paringul, Retjezat, Bucsecs (c. a.); Schanta, Prásbe, Zood (Ormay).

affinis Payk. In unserm Berg- und Gebirgswäldern unter der Rinde verschiedener Baumarten.

156. *Othius* Stephens.

punctulatus Goeze (fulvipennis F.). Gross-Scheuern, Mediasch, Kronstadt, Hosszufalu, Bozauer Pass, S.-Regen, Malomvitz, Hermannstadt, Büdös, Schässburg (in Wäldern unter Laub, c. a.); Götzenberg, Szamosujvár (Ormay).

laeviusculus Steph. Schässburg (c. a.).

melanocephalus Grav. Kronstadt (Bielz); Rodnagelirge (c. a.).

lapidicola Kiesenw. Kerzer Gelirge, Kronstadt (Bielz); Bucsecs, Rodnagelirge (Deubel).

mirmecophilus Kiesenw. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

transylvanicus Ganglbauer. Rotenturm, Schuler-Gebirge, Csukás, Rosenauer Gebirge, Balánbánya (Egeskő), Rodnaberge (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

crassus Motsch. (pallidus Brancsik). Zibinsgebirge (Porkovicza), Kerzer Geb., Gyögy (Ormay); Malomvitz, Topánfalva, Ratosnya, Borszék, Balánbánya, Büdös, Bucsecs (c. a.); Bucsecs, Rodnagelirge (Ganglbauer).

*Staphylini.***157. *Actobius Fauvel.***

cinerascens Grav. Zibinsgebirge, Mezösg (Záh, Bielz); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

**158. *Neobisnius Ganglbauer.*
(*Bisnius Thoms.*)**

vilosulus Steph. Schässburg (Kokelufer, im Geniste, c. a.); Kronstadt, Dees (Deubel).

procerulus Grav. Törzburg (Deubel).

var. *prolixus* Er. Zibinsgebirge, Fogarasch (Bielz); Rotenturm (Altufier unter Steinen), Schässburg (Kokelufer, c. a.); Kronstadt, Bistritz, Rodnageb. (Deubel).

159. *Hesperus Fauvel.*

rufipennis Grav. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg. (In Eichenmulden, ein ♀ am ausfliessenden Eichensaft, ein ♂ im Moos am Fusse eines Ahornstamms).

160. *Philonthus Stephens.*

(*Philonthus s. str.*)

splendens F. Zibinsjäser, Negovan, Kerzer Gebirge, Hosszufalu, Dongókő, S.-Regen, Mezösg (Záh, Bielz); Rotenturm, Frecker Gebirge (Serbota), Klausenburg (Malomvölgy, c. a.); Nagyhagymás (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

intermedius Lac. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg (Rinderdünger), Klausenburg (c. a.).

laminatus Creutz. Götzenberg, Kronstadt, Bodzaer Pass, Mediasch (Bielz); Retjezat, Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagebirge (c. a.); Klausenburg (Müller).

laevicollis Lac. Neudorf b. H., Präsbe, Frecker Jäser, Kronstadt, Piatra mare, Bozauer Pass, Mediasch, Bistritz (Bielz); Hermannstadt, Frecker Geb. (Serbota), Balánbánya, Bistra, Rodnagebirge (c. a.).

montivagus Heer. Kerzer Gebirge (Bulea, Ormay); Retjezat, Paringul, Frecker Gebirge (Serbota), Bucees, Schässburg, Rodnagelbirge (c. a.).

cyanipennis F. Fogarascher Geb., Königstein (Bielz); Szováta, Schässburg (Fuchslochgraben unter Blättern, c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay); S.-Regen (Müller).

aeneus Rossi. Im ganzen Berg- und Hügel-land verbreitet.

chalceus Steph. Hermannstadt, Schässburg (Breite, unter Eichenrinde, c. a.); Kronstadt (Deubel).

addendus Sharp. Kronstadt (Noa, Méhely); Klausenburg (c. a.).

carbonarius Gyll. Zibinsgebirge (Bielz); Karlsburg, Schässburg, Nagyenyed (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Méhely).

temporalis Rey. Kerzer Gebirge (Bulea), Dongókő, Bozauer Pass (Bielz); Szováta (c. a.).

atratus Grav. Déva, Gross-Scheuern, Gross-Schenk, Bükszad, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Bülös, Schässburg (c. a.); Kerzer Gebirge, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

var. *coeruleoescens* Lac. Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rotenturm, Ilvamika (Naszód, c. a.).

Bodemeyeri Epp. Rodnagebirge (Deubel).

rotundicollis Men. Dobra, Déva, Götzenberg (Bielz); Rotenturm (c. a.); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt (Deubel).

aerosus Kiesenw. Retjezat (2 Exemplare, c. a.).

Meine zwei Exemplare (♂ und ♀) besitzen bloss eine Länge von 7,5 (♂) — 9,5 (♀) mm.

ebeninus Grav. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, auch im Rodnagebirge.

corruscus Grav. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt, Schuler-Gebirge (Deubel).

concinnus Grav. Kronstadt, Oberkomana (Méhely); Karlsburg, Schässburg, Rodnagelbirge, Naszód (c. a.); Nagyhagymás (Deubel); Detunata (Mallász).

sanguinolentus Grav. Gross-Scheuern, Michelsberg, Schässburg (Bielz); Kronstadt (Deubel); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Klausenburg (c. a.).

immundus Gylly. Hermannstadt, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Schässburg, Baassen, Ilvamika (Naszód), Bükszad, Rotenturm, Marosujvár (c. a.).

debilis Grav. Kronstadt, Bükszad, Mezősg (Záh, Bielz); Schässburg (unter verwesenden Pflanzenstoffen, 20. Februar), Frecker Gebirge (Leita, in Sägespänen beim Sägewerk), Dees, Rodnagebirge, Naszód (c. a.); Detunata (Mallász).

decorus Grav. In den Wäldern des ganzen Gebietes.

fuscipennis Mannh. (politus F.). Neudorf b. H., Kronstadt, Tartlau. Mediasch, Schässburg (Kokelufer), Dees (Bielz); Klausenburg, Reps (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

Mannerheimi Fauv. (lucens Er.) Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz); Rotenturm (Ormay, c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

varlus Gylly. Mediasch, Oláhfalu (Bielz); Schässburg (Witeberg), Frecker Geb. (Serbota), Marosujvár, Tordaer

Schlucht, Naszód (c. a.); Kronstadt (Deubel); Detunata (Mallász).
a. bimaculatus Grav. Gross-Scheuern, S.-Regen (Bielz).
frigidus Kiesenw. Retjezat, Paringul, Bucecs (c. a.); Hátszeg (Deubel).
marginatus Stroem. Götzenberg, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schuler-Gebirge, Mediasch (Bielz); Rotenturm, Szurduk-Pass (c. a.); Zoodgebirge (Porkovicza, Ormay); Marosgebirge (Müller).
lepidus Grav. Déva, Reps, Előpalak, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Alsó-Rákos, Ratosnya, Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay).
nitidulus Grav. Déva (Bielz).
longicornis Steph. Kronstadt (Bielz).
fenestratus Fauv. (*bipustulatus* Woll.) Hermannstadt (Ormay).
cruentatus Gmel. Michelsberg, Mediasch, Borgoer Pass (Bielz); Oláhfalu, Szurdukpass, Paringul, Schässburg (c. a.); Detunata (Mallász); Bistritz (Müller).
varians Payk. Gross-Schenk, Mezőség (Záh, Bielz); Rotenturm, Schässburg, Karlsburg, Illyamika (Naszód), Rodnagebirge (c. a.); Kronstadt, Nagyhagymás (Deubel).
var. *agilis* Grav. Hermannstadt, Detunata (Bielz); Ober-Komana (Méhely); Schässburg (c. a.); Rodnagebirge (Deubel); Detunata (Mallász).
albipes Grav. Zibinsgebirge, Kronstadt, Bucecs, Csukás, S.-Regen (Bielz); Schässburg (Garten unter faulenden Pflanzenstoffen, c. a.); Hermannstadt (Ormay).
var. *alpinus* Epp. Zoodgebirge, Kronstadt (Bielz).
Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser Varietät in Kronstadt.
cephalotes Grav. Hermannstadt, Holzmen gen, Kronstadt (Bielz); Oláhfalu (c. a.); Almaser Höhle (in grosser Menge, Deubel).
timetarius Grav. Hermannstadt, Neudorf b. H., Kronstadt, Schuler-Gebirge, Mediasch, Oláhfalu, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Nagyenyed, Rodnagebirge, Szurduk-Pass (c. a.); Baumgarten b. H., Kerzer Gebirge (Ormay).
sordidus Grav. Klausenburg (Bielz); Rotenturm (Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Marosgebirge (Müller).
Scribae Fauv. Talmesch (Bielz).
fuscus Grav. Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Honigberg (Alt-ufer, Deubel).
umbratilis Grav. Klausenburg (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt (Deubel).
corvinus Er. Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay).

ventrallis Grav. Schielthal, Oláhfalu (Bielz); Déva (c. a.); Kronstadt (Deubel).
discoidens Grav. Déva, Büksál, Oláhfalu (Bielz); Hermannstadt, Remete (Nagyenyed, Ormay).
quisquiliarius Gylli. Hermannstadt, Héviz, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Alsó-Rákos, Nagyenyed (c. a.); Kronstadt (Deubel).
var. *inquinatus* Steph. Gyögy (Ormay); Baróth (Méhely); Schässburg (c. a.).
rufimanns Er. Zibinsgebirge (Bielz).
fumarius Grav. Mezőség (Záh, Bielz); Schässburg (Knopf an feuchter Stelle, c. a.).
virgo Grav. Schässburg (c. a.).
micans Grav. Marosujvár (c. a.); Kronstadt, Nagyhagymás (Deubel).
fulvipes F. Hermannstadt, Schässburg (Kokelufer, nicht selten, Bielz); Marosujvár, Naszód, Illyamika (c. a.); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt, Hátszeg (Deubel); Detunata (Mallász); S.-Regen (Müller).
punctetus Grav. Kronstadt (Bielz).
(Rahigus.)
tenuis F. Hátszeg, Zood, Präsbe, Nussbach, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Baassen, Schässburg (c. a.); Brenndorf (Altufer, Deubel).
pullus Nordm. Déva, Nussbach, Oláhfalu (Bielz); Petrosény, Puj (Hátszeg), Zalaina, Rotenturm, Schässburg (Kokelufer, c. a.); Rodnagebirge, Hátszeg (Deubel); Kerzer Gebirge (Ormay).
(Gabrius.)
vernalis Grav. Im ganzen Berg- und Hügel land verbreitet.
femoralis Hochh. Balánbánya (Vigyázókő, Méhely); Hátszeg (Deubel).
exiguus Nordm. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Rodnagebirge (Deubel).
astutus Er. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Szurduk-Pass (c. a.).
nigrifrons Grav. Im ganzen Gebiete verbreitet.
var. *trossulus* Nordm. Schässburg, Tordaer Schlucht, Rodnagebirge (c. a.).
var. *piliger* Rey. Rodnagebirge (Deubel, c. a.).
splendidulus Grav. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
Philonthus thermarum Aubé, welcher von Bielz aus Bükszad angeführt wurde, ist zu streichen, da das betreffende Exemplar meiner Sammlung ein kleiner, unausgefärberter Philonthus splendidulus Grav. ist.

161. *Staphylinus* Linné.

(Trichoderma.)

pubescens Deg. Götzenberg, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Puj (Hátszeg), Kerzer Gebirge, Klausenburg, Rodnagebirge (c. a.); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

(Abemus.)

chloropterus Panz. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, S.-Regen (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rodnagel, Kerzer Gebirge, Puj (Hátszeg), Klausenburg (c. a.).

(Platydracus.)

fulvipes Scop. Zibinsgebirge, Gurariu, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Balánbánya (c. a.).

steroorarius Oliv. Gross-Scheuern, Borgoer Pass, Kelemgelbirge (Bielz); Nagyhagymás (Deubel).

chalcoccephalus F. Hermannstadt, Zibinsgebirge, Gross-Schenk, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Fogarascher Gebirge (c. a.); Götzenberg (Ormay); S.-Regen (Müller).

latebricola Grav. Schässburg (c. a.).

(Staphylinus s. str.)

caesareus Cederb. Im ganzen Berg- und Hügelland verbreitet.

erythropterus L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

(Goërius.)

olens Müll. Schieltal, Zibinsgebirge, Obersebes, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).

tenebricosus Grav. (brachyptera Fairm.). Hátszeg, Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Nussbach, Kronstadt, Schässburg, Oláhfalu (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Präsbe (Ormay).

ophthalmicus Scop. Königstein (Bielz); Nagylak (Un erweissenlunger Komitat, Ormay); Nagyhagymás (Deubel).

similis F. (nitens Fauv.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

macrocephalus Grav. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Porumbacher Gebirge (Ormay); Rodnagelbirge, Balánbánya (Egyeskö, c. a.).

var. **ormayi** Reitter. Präsie, Schanta (Ormay); Schuler-Gebirge, Freeker Gebirge (Serbota), Büdös (c. a.); Pietrosul (Kelemgelbirge), Bucsecs (Deubel).

var. **alpestris** Er. Zibinsgebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Nagyhagymás (Deubel).

(Pseudocypus.)

brunnipes F. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); S.-Regen (Müller).

fuscatus Grav. Götzenberg, Kronstadt, Busecs, Mediasch, Marosgebirge (Bielz); Heltau, Hermannstadt, Toroczkó, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rodnagel, Schässburg (c. a.).

mus Brüll. Surul (Bielz); Balánbánya, Schässburg (c. a.).

plicennis F. Zibinsgebirge, Kerzer Geb., Königstein, Hosszufalu, Bükszad (Bielz); Nagyenyed (Ormay); Toroczkó, Baassen, Schässburg, Tordaer Schlucht, Puj (Hátszeg), Klausenburg (c. a.); Deutunata (Mallász); Marosgebirge Müll.).

aeneocephalus Dej. Talmesch, Kronstadt, Bucsecs, Dongókő, Mezőség (Záh, Bielz); Rotenturm, Kerzer Gebirge (Ormay); Retjezat, Malomvitz (c. a.); Marosgele (Müller).

fulvipennis Er. Hammersdorf, Fogarasch (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Szamosujvár (Ormay); Baassen, Schässburg (c. a.); Nagylagymás, Kronstadt (Deubel); Klausenburg (Müller). (Tasgius.)

pedator Grav. Zibinsgebirge (Bielz); Puj (Hátszeg, c. a.); Várhely (Müller). (Ocypus.)

falcifer Nordm. Mediasch (Bielz).

globulifer Geöffr. (edentulus Block.). Hátszeg, Hermannstadt, Götzenberg, Kronstadt, Hosszufalu, Sächs.-Regen (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Schässburg, Nagyenyed (c. a.).

compressus Marsh. Zibinsgebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg, Kerzer Gebirge, Schässburg (c. a.).

162. Ontholestes Ganglb.

(Leistotrophus Kr.)

tessellatus Geöffr. (nebulosus F.). Michelsberg, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Freeker Gebirge (Serbota), Balánbánya, Karlsburg, Schässburg (c. a.).

murinus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

163. Emus Curtis.

hirtus L. Hátszeg, Hermannstadt, Girelsau, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Klausenburg (c. a.); Bistritz (Müller).

164. Creophilus Manni.

maxillosus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. **ciliaris** Steph. Hammersdorf (Bielz).

Quedlini.

165. Quedius Stephens.

(Edipus.)

micros Grav. Schässburg (Breite, in einer alten Eiche, c. a.); Hátszeg, Kronstadt (Deubel).

Die Zahl der hintern Punkte des Scheitels scheint veränderlich und stimmt bei keinem meiner beiden Exemplare mit der Beschreibung überein. Bei dem einen Exemplar befindet sich zwischen dem hintern Augenrande und der Einschnürung des Halses fast in der Mitte nur ein grösserer Punkt, unmittelbar vor der Einschnürung ein fast ebenso grösser zweiter Punkt; bei dem andern Exemplar befinden sich zwischen dem hinteren Augenrand und der Einschnürung die beiden normalen Punkte, aber unmittelbar vor der Einschnürung ebenfalls zwei fast gleich grosse Punkte nebeneinander.

longicornis Kr. n. sp. Schässburg (c. a.; 1 ♂).

Quedius (Edipus) *longicornis* Kr. Länge 12 Millimeter.

Dunkelbraun, der Kopf pechschwarz, die Flügeldecken, die hinteren Ränder der Abdominalsegmente und die Hinterleibsspitze hell gelb-braun, die Beine und die beiden Wurzelglieder der Fühler röthlichbraun. Kopf quer-rundlich, vom Hals durch eine scharfe, vertiefte Linie abgeschnürt, die Augen fast nur von halber Schlafenlänge, fein chagriniert, matt, außerdem fein etwas undicht, auf der Stirnmitte erloschen und entfernter punktiert. Der hintere Supraorbitalpunkt befindet sich in der Mitte zwischen dem vorderen und der Einschnürung, der kleinere Scheitelpunkt nahe der Einschnürung, etwas nach innen gerückt, neben denselben und auf den Schläfen zahlreiche gröbere Punkte, der grosse Schläfenpunkt etwas vor der Mitte der Schläfen. Die Oberlippe ist tief ausgerandet, wie die Mundteile ausser den braunen Mandibelnen hell röthlich-gelb. Das dritte Fühlerglied ist um die Hälfte länger als das zweite, die fünf vorletzten nach gewisser Richtung schwach quer. Der Hals-schild breiter als der Kopf, etwas breiter als lang, fein chagriniert, matt, die Hinterecken vollkommen verrunzt, neben denselben tief eingedrückt, ausser den normalen drei Rückenpunkten befinden sich jederseits auf der Scheibe in einer zur dorsalen Punktreihe fast parallelen, aber etwas nach aussen gebogenen Reihe drei Diskalpunkte, von denen der dritte wesentlich weiter nach hinten gerückt ist als der hintere Dorsalpunkt, hiebei ist der vor dieser Reihe befindliche Marginalpunkt, welcher denselben Abstand vom Vorderrande besitzt, wie der in der Dorsalreihe mitgezählte Marginalpunkt, nicht mitgezählt. Ausserdem befindet sich noch ein Diskalpunkt im ersten Drittel in einiger Entfernung vom Seitenende. Das dunkelbraune Schildchen ist glatt, die Flügeldecken so lang aber kaum so breit als der Hals-schild, glänzend, nicht chagriniert, wenig dicht, kräftig punktiert und fein grau behaart, die Härchen etwas aufgerichtet, aber nach hinten geneigt. Der Hinterleib nach hinten nur schwach und allmählich verengt, glänzend, ebenso kräftig und nicht dichter als die Flügeldecken punktiert und fein grau niederliegend behaart. Das sechste Bauchsegment an der Spitze tief ausgerandet, die Vordertarsen mässig erweitert.

Dr. Bernhauer, dem ich die Art vorlegte, determiniert dieselbe als *Qu. longicornis* Kr. mit dem Bemerk, dass die Beschreibung des *Qu. longicornis* bei Ganglbauer nicht ganz stimme. Weil nun weder Kraatz (Insekten Deutschlands. I. Abb. II. Bd. p. 494) etwas von einer anserhalb der Rückenreiche befindlichen Punktreihe das Mindeste erwähnt, noch Ganglbauer (Käfer von Mitteleuropa, II. Bd.), der ausdrücklich bemerk't, dass ausser den drei Rückenpunkten keine andere Punkte auf dem Hals-schild vorhanden seien, so lasse ich obige Beschreibung stehen. Durch Vergleich eines später von Herrn Bickhardt in Frankfurt a. M. eingesendeten Exemplares des *Qu. longicornis* aus West-Deutschland habe ich mich von der Richtigkeit der Bernhauerschen Determination überzeugt.

(Microsaurns.)

brevis Er. Schässburg (Oktober, in einer alten Eiche bei *Lasius brunneus*; c. a.).

lateralis Grav. Kronstadt (? Deubel); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (Fuchsloch unter Laub, 2 Exemplare, c. a.).

breviornis Thomson. Schässburg (in alten von *Lasius brunneus* bewohnten Eichen, 4 Exemplare; c. a.); Kronstadt (Méhely).

ochripennis Men. Hermannstadt (aus Pilzen, Ormay); Schässburg, Baassen, Reps, Kronstadt, Hammersdorf, Rodnagelgebirge (c. a.).

fulgidus F. Zibinsgebirge, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt, Zernest (Deubel).

cruentus Oliv. Gross-Scheuern, Mediasch, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Baassen, Schässburg, Reps (c. a.); Kronstadt, Alsó-Rákos (Deubel); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); S.-Regen (unter Weidenrinde, Müller).

var. virens Rottenbg. Bozauer Pass (Bielz); Baassen, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Kerzer Gebirge (Ormay).

ventralis Arag. Schässburg (Breite, in alten von *Lasius brunneus* bewohnten Eichen, 3 Exemplare, c. a.).

mesomelinus Marsh. Kronstadt (Bielz); Puj Hászeg), Kriwadia (bei Hászeg, Höhle), Zalatna (Höhle bei Prászaka), Karlsburg (Höhle im Ompolyitzatal), Retjezat, Büdös, Schässburg (c. a.); Schanta (Ormay).

maurus Sahlb. Ober-Kerz (Glashütte), Rotenturm, Schässburg (in einer alten Eiche, c. a.).

xanthopus Er. Kronstadt, Tartlau (Bielz); Büdös, Schässburg (in alten von *Lasius brunneus* bewohnten Eichen), Bistra (c. a.).

scitus Grav. Schässburg (in einer alten von *Lasius brunneus* bewohnten Eiche, 1 Exemplar, c. a.); Kronstadt, Vargyastal (Deubel).

infuscatus Er. Zibinsgebirge, Sächs.-Regen (Bielz). (Quedionuchus.)

cinctus Payk. Zibinsgebirge, Kronstadt, Teszla, Dongókő, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Gyögy (Ormay); Malomvitz, Klausenburg, Schässburg (c. a.).

punctatellus Heer. (pediculus Fauv.). Kerzer Gebirge (Bielz); Schul-Gebirge, Hászeg (c. a.); Rodnagelgebirge (Deubel).

laevigatus Gyll. Götzemberg, Kerzer Geb., Bucsecs, S.-Regen, Borgoer Pass (Temeu, Bielz); Retjezat, Bistra, Zalatna, Schuler-Gebirge (c. a.); Schanta, Porumbacher Gebirge (Ormay); Zernest (Deubel); Rodnagelgebirge (Ganglbauer).

a. resplendens Thoms. Bistra, Büdös (c. a.). (Quedius s. str.)

fuliginosus Grav. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

tristis Grav. Kronstadt (Bielz).

molochinus Grav. Zibinsgebirge (Bielz). Schässburg (Scherkes, Waldrand unter Laub, c. a.); Hászeg, Kronstadt (Deubel). (Sauridus.)

ochropterus Er. Zibins - Jäser, Götzemberg, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Retjezat,

- Frecker Gebirge (Serbeta), Bucsecs, Borszék (c. a.); Paringul, Kelemen-gelirge (Deubel); Schanta, Zoogeb., Kerzer Gelirge (Ormay); Rodnagebirge (Ganglbauer).
- a. *Kiesenwetteri* Ganglb. Paringul, Kerzer Gebirge (Bulea), Rodnagebirge (c. a.); Schulergebirge, Bucsecs (Deubel).
- var. *obscuripennis* Bernh. Csukás, Schuler-Gelirge, Balánbánya, Malomvitz, Bucsecs, Rodnagebirge (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).
- dubius* Heer. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).
- picipes* Mannh. Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).
- transsylvaniaicus* Weise. Frecker Gebirge (Serbeta), Rodnagebirge (c. a.); Kerzer Gebirge (Bulea, Deubel).
- umbrinus* Er. Götzenberg, Kronstadt, S.-Regen, Borgeor Pass (Bielz); Malomvitz, Balánbánya, Borszék, Előpatak, Schässburg (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).
- fumatus* Steph. Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Hermannstadt, Szováta (c. a.).
- limbatus* Heer. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Gyögy (Ormay).
- humeralis* Steph. Michelsberg (Bielz); Hermannstadt, Gyögy (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- obliteratus* Erichs. Zibins-Gebirge (Bielz); Hermannstadt, Heltau (Ormay); Hammersdorf, Toroczkó, Büdös, Szováta, Hátszeg, Kronstadt, Ratosnya, Schässburg (c. a.).
- maurerufus* Grav. Zibinsgebirge, Bucsecs, S.-Regen (Bielz); Borszék, Balánbánya, Schuler-Gebirge (c. a.).
- Quedius riparius Kella., welchen Bielz aus Oláhfalu anführt, ist durch einen Irrtum meinerseits in das Verzeichnis gelangt, daher zu streichen.
- plancus* Er. Zibinsgebirge, Sächs.-Regen (Bielz); Zoogebirge (Porkovicza, Ormay).
- scintillans* Grav. Zibinsgebirge (Bielz); Balánbánya (c. a.).
- (*Raphirus*)
- pyrenaeus* Bris. Kronstadt (Bielz); Csukás, Balánbánya, Büdös, Bistra (c. a.); Kerzer Gebirge (Ormay).
- auricomus* Kiesenw. (decoratus Petri). Frecker Gebirge (Serbeta), Paringul (c. a.).
- Dr. Bernhaer hat meinen Qu. decoratus als Qu. auricomus Kiesenw. bestimmt, der bisher nur aus Kärnten und dem westlichen Europa bekannt war.
- cincticollis* Kr. Surul (Bielz); Porumbacher Gebirge (Ormay); Bucsecs, Balánbánya, Schuler-Gebirge, Retjezat (c. a.).
- alpestris* Heer. Kronstadt, Dongókő (Bielz); Kerzer Gelirge (Bulea), Zood (Ormay);

- Paringul, Szurdukpass, Bucsecs, Rodnagelirge, Frecker Gebirge (Serbeta, c. a.).
- rufipes* Grav. Zibins-Gebirge, Tesla, Dongókő (Bielz); Arpascher Gebirge, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).
- paradisanus* Heer. (monticola Er.). Frecker Gelirge, Kronstadt (Bielz); Retjezat, Paringul, Malomvitz, Bistra, Büdös, Rodnagebirge, Borszék, Bucsecs, Balánbánya (c. a.).
- collaris* Er. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Borszék, Frecker Gebirge (Serbeta, c. a.); Heltau (Ormay); Rodnagebirge (Ganglbauer).
- acuminatus* Hochh. Hermannstadt, Kerzer Gelirge (Ormay).
- picipennis* Heer. (attenuatus Gyll.). Schielatal, Zibinsgebirge, Unter-Kerz (Bielz); Balánbánya, Schässburg, Oláhfalu (c. a.); Rotenturm (Ormay).
- Scribae* Ganglb. Zalatna, Schässburg (Türkenhill), Rodnagebirge (c. a.).
- beops* Grav. Hermannstadt, Kerzer Geb., Kronstadt, Tesla, Bozauer Pass (Krazna, Bielz); Schanta, Gyögy (Ormay); Karlburg, Unter-Kerz, Alsó-Rákos, Baassen, Schässburg, Zalatna, Balánbánya, Hátszeg (c. a.); Detunata (Mallász).
- var. *fallaciosus* Kr. Rodna-Gebirge (Ganglbauer, c. a.).
- fulvicollis* Steph. Kerzer Gebirge (Bulea), Schuler-Gebirge, Malomvitz, Paringul, Retjezat, Bucsecs, Borszék, Rodnagel. (c. a.).
- ### 166. *Velleius Mannh.*
- dilatatus* F. Klausenburg, Gyalu, S.-Regen, Schässburg (Bielz); Kronstadt (Hangestein, im Mulin einer von Hornissen bewohnten Eiche, Deubel).
- ### 167. *Heterothops Stephens.*
- praevia* Er. Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).
- dissimilis* Grav. Hermannstadt (Ormay); Rotenturm, Kronstadt (Zinne, c. a.); Rodnagebirge (Ganglbauer).
- ### 168. *Astrapaeus Gravenh.*
- ulmi* Rossi. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).
- ### 169. *Euryporus Erichs.*
- picipes* Payk. Klausenburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Nagyenyed, Büdös (c. a.); Bucsecs (Valea Jeppi, Deubel).
- ### 170. *Aeylophorus Nordm.*
- glaberrimus* Herbst. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (Atelshill, c. a.).

171. *Tanygnathus* Erichs.

terminalis Er. Unter-Kerz (Ufer des Klosterweiher, c. a.).

Tachyporinae.

Bolitobiini.

172. *Mycetoporus* Mannh.

(Ischnosoma.)

longicornis Mäkl. Schässburg (Siechhofberg, Gelber Berg, Witeberg, unter Laub, c. a.); Kronstadt (Deubel).

splendidus Grav. Kronstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Unter-Kerz (c. a.).

(*Mycetoporus* s. str.)

orophilus Bernh. Rodnagebirge (Kuhhorn, Deubel, c. a.).

piceolus Rey. Rodnagebirge (Deubel).

Mulsanti Ganglb. Schuler-Gebirge (c. a.); Bucsecs, Nagyhagymás, Rodnagebirge (Deubel).

Baudueri Rey. Baassen, Schässburg (c. a.); Rodnagebirge (subalpin, Deubel).

a. *puncticollis* n. v. Hátszeg (c. a.).

Mycetoporus Baudueri a. *puncticollis*. Das von mir bei Hátszeg gesammelte Stück weicht vom normalen Myc. Baudueri nur durch den Besitz von je einem Diskalkpunkte auf dem Halsschild ab. Dieser Punkt befindet sich hinter dem innern Vorderrandspunkte etwas vor der Mitte des Halsschildes.

brunneus Marsh. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Alsó-Rákos (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

longulus Mannh. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

bimaculatus Lac. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

punctipennis Scriba. Siebenbürgen (Ganglbauer, Käfer von Mitteleuropa, II. 371).

forticornis Fauv. Alsó-Rákos, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Hátszeg (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

ambiguus Luze. Schässburg, Rotenturm (c. a.).

clavicornis Steph. Rotenturm, Schässburg (c. a.); Hátszeg, Bucsecs, Kronstadt, Rodnagebirge (Deubel).

solidicornis Steph. Hátszeg (Deubel, c. a.).

angularis Rey. Hátszeg (Deubel), Rodnagebirge (alpin, Deubel, c. a.?).

niger Fairm. Schulergebirge (c. a.); Bucsecs (Deubel).

splendens Marsh. Balánbánya, Hátszeg, Rotenturm, Schässburg (c. a., aus Laub gesiebt); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

Märkeli Kr. Rosenau, Zernest (Deubel). *Wingelmülleri* Luze. Siebenbürgen (Katalog. col. Europa).

rufescens Steph. Kronstadt (Bielz); Rosenau (Deubel).

laevicollis Epp. Bucsecs (Deubel); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

punctus Gyll. Kronstadt (Bielz); Gyögy (Ormay); Rotenturm, Schässburg, Szováta (c. a.); Hátszeg, Nagyhagymás, Rodnagebirge (Deubel).

173. *Bryoporus* Kraatz.

rugipennis Pand. Kerzer Gebirge (Bulea), Rodnagebirge, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

Bryoporus rugipennis a. *nigripennis*. Bei einigen Exemplaren ist nicht nur die Scheibe des Halsschildes, sondern auch die Flügeldecken dunkelbraun; ich schlage für diese Aberration den Namen *nigripennis* vor.

var. *nigripennis* n. a. Kerzer Gebirge, Rodnagelirge (c. a.).

rufus Er. Bucsecs, Csukás, Balánbánya, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Schulergebirge, Nagyhagymás, Ilátszeg (Deubel).

cernuus Grav. Déva (Bielz); Alsó-Rákos, Schässburg (Kälbertritt unter Laub, c. a.); Hátszeg (Deubel); Königstein (Méhely); Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

var. *merdarius* Oliv. Schässburg (c. a.); Kronstadt, Rodnagebirge (Deubel).

174. *Bolytobius* Mannh.

(Carphacis.)

striatus Oliv. Hermannstadt, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel); Fogarascher Gebirge (Müller).

(Lordithon.)

bicolor Grav. Csukás (Anfang Juli auf Baumpilzen in Mehrzahl, c. a., Deubel).

trimaculatus Payk. Hátszeg, Dusch, Kerzer Gebirge Kronstadt? (Bielz); Csukás (c. a.).

var. *Kraatzi* Pand. Siebenbürgen (Bielz).

trinolatus Er. Hátszeg, Zibinsgebirge, Fogarasch, Oláhfalu, Schässburg (Bielz); Kronstadt, Rodna (Deubel).

var. *discophorus* Rey. Schässburg (Fuchslöch, aus Baumschwämmen, c. a.).

exolutus Er. Schieltal, Hátszeg, Kerzer Gebirge (Bielz); Karlsburg, Schässburg, Oláhfalu, Csukás, Rodnagebirge (c. a.); Kronstadt, Tusnád (Deubel).

thoracicus F. (pygmaeus F.). Hátszeg, Schieltal, Hermannstadt, Kerzer Geb., S.-Regen, Götzberg (Bielz); Oláhfalu, Rodnagebirge (c. a.).

var. *biguttatus* Steph. (intrusus Hampe). Hermannstadt, Kronstadt, Oláhfalu (Bielz); Bistra, Zalatna, Schässburg, Rodnagebirge (c. a.).

(*Bolytobius* s. str.)

tumalatus L. Auf Schwämme durch das ganze Gebiet verbreitet.

Bei einem Exemplar meiner Sammlung von der Bistra ist die Spitze der vier Fühlerwurzelglieder schwärzlich und die Tibien und Tarsen gebräunt.

pulchellus Mannh. Hermannstadt (Ormay).
speciosus Er. Gross-Schenk, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Retjezat, Csukás, Rodnagelirge (c. a.); Negoi, Bucsecs, Gonoza-Bach (bei der Gonoza-Höhle, Deubel).

175. *Bryocharis Lacord.*

analis Payk. Zibinsgebirge (Bielz); Hâtszeg (Deubel).

var. **merdaria** Gyll. Rodnagelirge, Kronstadt (Deubel); Detunata (Mallász).

inclinans Grav. Kronstadt (Bielz); Bucsecs (subalpin, Deubel).

formosa Grav. Zibinsgebirge, Gross-Schenk (Bielz); Schässburg (Fuchsloch unter Laub in Hecken, c. a.); Hammersdorf (Deubel).

176. *Conosoma Kraatz.* (Conurus Steph.)

litoreum L. Hermannstadt, Hosszuſalu, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt, Rodnagelirge (Deubel).

pubescens Grav. Durch das ganze Gebiet unter Moos, Blättern, in moderndem, mulmigem Holz.

immaculatum Steph. Zibinsgebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Előpatak, St. Annensee, Schässburg (c. a.).

pedicularius Grav. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet unter Laub und verwesenden Pflanzen.

bipunctatum Grav. Előpatak (in einem mulmigen Weidenstamm in Mehrzahl, c. a.); Rosenau (Deubel).

bipustulatum Grav. Ober-Sebes (Bielz); Schässburg (im Moos alter Eichen, c. a.); Talmesch, Rotenturm, Kerzer Gebirge (Ormay); Rosenau (Deubel).

177. *Lamprinus Heer.*

erythropterus Panz. Schässburg (Reissel, 25. Juli in Mehrzahl, c. a.).

178. *Lamprinodes Luze.*

saginatus Grav. Reps (Bielz).

179. *Tachyporus Gravenh.*

Diese Arten leben unter Laub und verwesenden Pflanzen- und Tierstoffen, zuweilen trifft man sie auch auf Blüten.

nilidulus F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

macropodus Steph. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Előpatak, Karlsburg, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. **Abner** Sauley. Karlsburg (c. a.).

pusillus Grav. Hermannstadt, Reps, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Unter-Kerz, Előpatak, Oláhfalu (c. a.); Kronstadt, Nagyhagymás (Deubel).

transversalis Grav. Girelsau (Bielz).

ruficollis Grav. Schielat, Hermannstadt, Fogarasch, Reps, S.-Regen (Bielz); Hâtszeg, Schässburg (c. a.).

atriceps S'eph. Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Előpatak, Schässburg (c. a.); Hâtszeg, Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

lersus Er. Reps, Schässburg (c. a.); Erösd (Altfluss, Deubel).

chrysomelinus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. **basalis** Epp. Kronstadt (Deuhel).

hypnorum F. Wie der vorige verbreitet.

selutus Er. Hâtszeg, Hermannstadt, Gross-

Schenk, Előpatak, S.-Regen (Bielz); Rotenturm (Ormay); Kronstadt (Deuhel); Hâtszeg, Schässburg, Karlsburg (c. a.); Detunata (Mallász).

formosus Matth. Karlsburg, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Dees (Méhely).

abdominalis F. Hermannstadt, Gross-Schenk, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Petrozsény, Karlsburg, Előpatak, Reps (c. a.); Kronstadt (Deuhel).

obtusus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

180. *Tachynus Gravenh.*

flavipes F. Zibinsgeb., Kronstadt, Schässburg, Oláhfalu, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

proximus Kr. Bodzaer Gebirge (subalpin, Deubel); Retjezat, Rodnagelirge (c. a.).

humeralis Grav. Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Bucsecs, Rodnagelirge (Deuhel).

subterraneus L. Präsche (Bielz); Bodzaer Geb., Kronstadt (Deuhel).

bipustulatus F. Neudorf b. II. (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt, Alsó-Rákos (Deuhel).

pallipes Grav. Schielthal, Fogarasch, S.-Regen (Bielz); Götzemberg (Ormay); Borszék, Csukás, Oláhfalu, Paringul, Rodnagelirge (c. a.).

timetarius Grav. Götzemberg, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszuſalu, Tartlau, S.-Regen (Bielz); Hâtszeg, Schuler-Gebirge (c. a.); Michelsberg (Ormay).

rufipes Degter. Götzemberg, Kerzer Geb., Kronstadt, Hosszuſalu, Tartlau, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Paringul, Oláhfalu, Rodnagelirge (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Detunata (Mallász).

taticollis Grav. Kronstadt (Rielz); Schanta (Ormay); Hermannstadt, Balánhánya, Schässburg (c. a.); Detunata (Mallász).

marginellus F. Götzemberg, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannst. (Ormay); Rodnagelirge (Deuhel); Szováta (c. a.).

collaris Grav. Gross-Scheuern, Götzenberg, S.-Regen (Bielz); Paringul, Malomvitz, Rotenturm, Balánbánya, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt, Rodnagebirge (Deubel).

rufipennis Gyll. Zibinsgebirge (Bielz). (Drymoporus.)
elongatus Gyll. Zibinsgebirge (Bielz); Bucecs (c. a.); Kronstadt, Rodnageb. (Deubel).

181. *Coproporus Kraatz.*

cotchicus Kr. Rosenau (Deubel).

182. *Leucoparyphus Kraatz.*

silphoides L. Hátszeg, Gross - Scheuern, Neudorf b. H., Götzenberg, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Schässburg, Déva (c. a.); Kronstadt, Rodnagebirge (Deubel).

Hypocryptini.

183. *Hypocryptus Mannh.*

longicornis Payk. Zibinsgebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Büdös, Schässburg (aus Laub gesiebt, c. a.).

laeviusculus Mannh. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg (c. a.).

discoideus Er. Hermannstadt (Bielz); Baassen (c. a.); Rodnagelbirge (Deubel).

seminulum. Zibinsgeb., Schässburg (Bielz); Unter - Kerz (Altufer, c. a.); Kronstadt (Deubel).

Habrocerini.

184. *Habrocerus Erichs.*

capillaricornis Grav. Durch das ganze Gebiet in Buchenwäldern unter Laub.

Trychophyini.

185. *Trichophya Mannerh.*

pilicornis Gyll. Schässburg (Atelsbill, im Walde unter Blättern und am Kokeifluss unter Geniste, 13. Mai und 17. November, c. a.).

Aleocharinae.

Dinopsini.

186. *Dinopsis Matthews.*

erosa Steph. Zibins - Gebirge, Kronstadt (Bielz).

Myllaenini.

187. *Myllaena Erichs.*

dubia Gravenh. Kronstadt? (Deubel).

intermedia Er. Szurduk-Pass, Csukás, Unter-Kerz, Schässburg (an feuchten Orten aus Moos und Pflanzenbüscheln gesiebt, c. a.); Kronstadt (Deubel).

brevicornis Matth. Götzenberg, Präsbe, (Bielz); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

minuta Grav. Zibinsgebirge, Sächs.-Regen. Mezőség (Záh, Bielz); Schässburg, Borszék (c. a.).

infuscata Kr. Kronstadt (Bielz); Schässburg, Rotenturm (wie *M. intermedia* gesammelt, c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

Pronomaeini.

188. *Pronomaea Erichs.*

rostrata Er. Ober-Kerz (Glasbütte), Unter-Kerz, Déva, Karlsburg, Schässburg, Baassen, Szováta (c. a.).

Hygronomini.

189. *Hygronomma Erichs.*

dimidiata Grav. Dobra (Bielz); Előpatak (auf Schilfrohr, c. a.).

Oligotini.

190. *Oligota Mannh.*

(Holobus.)

flavicornis Lac. Präsbe (Bielz); Baassen, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

apicata Er. Kronstadt (Denbel); Schässburg (Langheltgraben, aus dem Moose eines Ahornstamms gesiebt, c. a.).

(Oligota s. str.)

granaria Er. Schässburg (Wahrscheinlich in einer alten Eiche bei Lasius brunneus, c. a.).

pustilla Grav. Hermannstadt (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Marosujvár (c. a., am 3. April auch auf Kohlstrünken gesammelt); Kronstadt (Ameisenhaufen, Deubel).

Bolitocharini.

191. *Brachida Rey.*

exigua Heer. Rotenturm, Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Hátszeg, Kronstadt (Deubel).

192. *Encephalus Westwood.*

complicans Westw. Hermannstadt (auf Schwämmen, (Ormay); Schässburg (Türkenhill, aus Büscheln von Sumpfpflanzen gesiebt); Rodnageb., Schuler Gebirge (Deubel)).

193. Gyrophaena Mannerh.

Die Arten leben auf Pilzen.

Gyrophaena clavigera Scriba ist *Atheta clavigera* Scriba, wird also in der Gattung *Atheta* (*Rheopalocera*) aufgeführt. *Gyroph. pulchella* Heer, welche Bielz von Olábfalu anführt, ist zu streichen, da sie durch einee Irrtum meinerseits aufgenommen wurde.

(*Gyrophaena* s. str.)

affinis Sahlb. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Tordae Schlucht, Schässburg, Előpatak, Borszék (c. a.).

nitidula Gyll. Präsbe (Bielz); Zalatna (Ompolyitzatal), Csukás (c. a.); Paringul (Deubel).

nana Payk. Präsbe, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Unter-Kerz, Schässburg (c. a.).

genitilis Er. Girelsau, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, S.-Begen (Bielz); Zalatna (Ompolyitzatal). Csukás, Büdös, Rodnagelbirge (c. a.).

bihamata Thoms. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Gyögy (Ormay); Schässburg, Zalatna (Ompolyitzatal, c. a.).

fasciata Marsb. Bodzaer Gebirge, Schuler-Gelirge, Kronstadt (Deubel).

laevipennis Kr. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

lucidula Er. Präsbe (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Poweri Crotch. Schässburg (c. a.)

minima Er. Kerzer Gebirge (Bielz); Csukás (c. a.); Kronstadt (Deubel).

manea Er. Borszék (Bielz); Déva, Előpatak, Schässburg (c. a.); Tusnád (Deubel).

(*Phaenogryra*)

strictula Er. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Schässburg, Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Rosenau (Deubel).

polita Grav. Kerzer Gebirge, Fogarasch (Bielz); Csukás (c. a.); Kronstadt, Rodnagelbirge (Deubel).

boleti L. Kerzer Gebirge (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Schulergebirge, Balánbánya, Schässburg (c. a.); Bucsecs (Deubel); Piatra mare (Méhely).

(*Agaricochara*)

laevicollis Kr. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

194. Placusa Erichs.

Die Arten leben unter Baumrinden.

(*Placusa* s. str.)

complanata Er. (*humilis* Er.). Kronstadt (Bielz); Schulergebirge (Deubel).

pumilio Grav. Schässburg (c. a.); Ober-Komana (Méhely).

afrata Sahlb. Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

tachyporoides Waltl (*infima* Er.). Hermannstadt (unter Nadelholz-Rinde, Ormay); Bistra, Borszék, Schässburg (c. a.); Rodnagelbirge (Deubel). (Calpusa.)

adscita Er. Hermannstadt (Nadelholzrinde, Ormay).

195. Cyphea Fauvel.

curtula Er. Kerzer Gebirge (Bielz); Rosenu (Deubel).

196. Thectura Thomson.

cuspidata Er. Hermannstadt (Bielz); Marosujvár, Schässburg (Oktober 1910 in grosser Zahl unter der Rinde verpilzter Weidenstümpfe am Kokelusfer, c. a.); Kronstadt (Deubel).

197. Homalota Mannh.

plana Gyll. Marosujvár (unter Schwarzpappel-Rinde), Bistra, Klausenburg (c. a.); Rodnagelbirge (Deubel).

198. Silusa Erichs.

(*Stenusia*.)

rubra Er. Schässburg Fuchsloch, auf Pilzen, c. a.).

(*Silusa* s. str.)

rubiginosa Er. Mezőség (Záh, Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Szurdok-Pass (c. a.).

199. Leptusa Kraatz.

(*Leptusa* s. str.)

futiginosa Aubé. Schässburg, Bistra (c. a.); Ilátszeg (Deubel).

angusta Aubé (*analis* Gyll.). Michelsberg, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Präsbe, Kerzer Geb. (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Előpatak, Csukás, Unter-Kerz, Schulergebirge, Bucsecs, Büdös, Annensee, Borszék, Rodnagel-, Paringul (c. a.).

haemorrhoidalis Ilér. Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz); Bistra, Rodnagelbirge (c. a.); Bucsecs (Deubel).

(*Pachygluta*)

ruficollis Er. Frecker Gebirge (Serbota, t ♀, c. a.).

(*Pasilia*.)

carpathica Weise. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Schanta, Präsbe (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Balánbánya (Egyeskö), Schulergebirge, Rodnagelbirge (c. a.); Bodzaer Gebirge (Deubel).

(Pisalia.)

eximia Kr. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Rodnagebirge (Bielz); Heltau, Schanta, Prásbe, Gyógy (Ormay); Frecker Geb. (Serbota), Büdös, Reps, Bucsecs, Borszék (c. a.).

alpicola Brancs. Kerzer Gebirge (Bielz); Porumbacher Gebirge (Ormay); Rodnagebirge, Borszék, Schuler-Gebirge (c. a.); Csukás, Nagyhagymás (Deubel).

puellaris Hampe. Bucsecs, Königstein (Deubel); Rodnagebirge (c. a.).

flavicornis Brancs. Rodnagebirge (c. a.).

piecata Rey.

var. **Koronensis** Ganglb. Rodnagebirge (Koronjus), aber auch an andern Stellen, Ganglbauer, Deubel, c. a.).

200. *Euryusa Erichs.*

Die Arten leben bei Ameisen (*Lasius brunneus*) namentlich in alten Eichen.

eastanoptera Kr. Csukás (c. a.).

optabilis Heer. Hátszeg, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

sinuata Er. Michelsberg, Kronstadt (Bielz); Alsó-Rákos, Előpatak, Baassen, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

brachelytra Kiesenw. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Szováta, Alsó-Rákos, Ratosnya, Rotenturm, Bistra, Prászaka (Zalatna), Hátszeg, Schässburg, Szováta (c. a.); Hermannstadt, Gyógy (Ormay).

201. *Tachyusida Rey.*

gracilis Er. Schässburg (Alte Eichen bei *Lasius brunneus*, c. a.).

202. *Phymatura Sahlberg.*

brevicollis Kr. Bistra (6 Exemplare, ♂♂ und ♀♀, c. a.).

Ich habe die Mundteile dieser Art mikroskopisch untersucht und gefunden, dass dieselben einige Abweichungen von denen der Gattung *Bolitochara* zeigen, welche wenigstens Ganglbauer in seinen „Käfern von Mitteleuropa“ II. Band, p. 266 nicht erwähnt, indem er bloss auf die nahe Verwandtschaft mit *Bolitochara* hinweist, ohne unter den unterscheidenden Merkmalen die Unterschiede im Bau der Mundteile zu erwähnen. Die Mandibeln sind nicht einfach, sondern zeigen hinter der Spitze, wenigstens bei der linken Mandibel, ein deutliches kleines Zähnchen. Das stiftförmige vierte Kieftasterglied ist nicht halb so lang als das dritte, sondern hat $\frac{3}{4}$ der Länge desselben. Die Zunge erreicht die Spitze des zweiten Lippentastergliedes, die Paraglossen reichen bis zur Hälfte des zweiten Lippentastergliedes. Die Lippentasterglieder nehmen an Dicke allmählich etwas ab, die beiden ersten sind länger als dick und nahezu gleichlang, das dritte ist länger als das zweite und gegen die Spitze schwach verdickt.

Die geschlechtliche Auszeichnung besteht nicht nur in einem Körnchen vor dem Hinterrande des 7. Dorsalsegmentes, sondern auch das achte Dorsalsegment ist ausgezeichnet, indem der Hinterrand desselben in der Mitte schmal und wenig tief ausgerandet ist, und neben der

Ausrandung jederseits drei stumpfe kleine, aber deutliche Zähne stehen. Ich glaube kaum, dass wir es hier mit einer neuen Art zu tun haben, wohl aber dass diese Auszeichnung den früheren Beobachtern entgangen ist, weil das echte Dorsalsegment in der Regel fast vollständig unter das siebente zurückgezogen ist.

203. *Bolitochara Mannh.*

Die Arten leben auf Pilzen.

Reyi Sharp. Malomvitz (Lunka negru, c. a.).

lucida Grav. Hátszeger Gebirge, Kronstadt (Bielz); Csukás, Előpatak, Büdös, Schässburg (c. a.); Kerzer Gebirge (Ormay).

Mulsanti Sharp. Büdös, Schässburg (Siechhofwald, c. a.).

lunulata Payk. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

bella Märk. Kronstadt (Bielz); Hátszeg, Karlsburg, Retjezal, Rotenturm, Schässburg, Unter-Kerz, Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Hermannstadt (Ormay).

obliqua Er. Retjezal, Götzenberg, Prásbe, Kerzer Geb., Kronstadt, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Csukás, Büdös, Schässburg (c. a.).

varia Er. Kronstadt (Zinne, Deubel).

204. *Autalia Mannerh.*

Die Arten leben auf Pilzen, auch in trockenem Rinderdünger, unter Laub.

impressa Oliv. Klausenburg (Bielz); Schässburg (in Pilzen, c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt, Tusnád (Deubel).

puncticollis Sharp. Kronstadt (Zinne, Deubel).

rivularis Grav. Harbachufer, Gross-Scheuern, Kronstadt, Maros-Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a., unter Laub).

Myrnedoniinl.

205. *Falagria Mannh.*

Die Arten leben wie die vorigen.
(*Falagria* s. str.)

sulcata Payk. Hátszeg, Hermannstadt, S.-Regen, Marosgebirge (Bielz); Schässburg, Naszód (c. a.); Kronstadt (Deubel).

splendens Kr. Schässburg (1 Exemplar, c. a.).

sulcatula Grav. Hátszeg, Hermannstadt, Unter-Kerz, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
(*Anaulacaspis*.)

thoracica Curt. Schielthal, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt, Marosgeb. (Bielz); Unter-Kerz, Topánfalva (Erzgebirge), Rotenturm (c. a.); Gyógy (Ormay); Nagyhagymás (Deubel).

nigra Grav. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Hátszeg, Kronstadt (Deubel).

(Cardiota.)

obscura Grav. Hâtszeg, Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Baassen (c. a.).

206. *Borboropora Kraatz.* (*Pseudoscopaeus* Weise.)

Reitteri Weise. Kerzer Gebirge (Glashütte).

207. *Tachyusa Erichs.*

Die Arten leben an den Ufern der Gewässer.
(Ischnopoda.)

umbratica Er. Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg, Karlsburg, Baassen, Szováta, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

exarata Er. Schässburg (Kokelufer, c. a.); Kronstadt (Deubel).

(Cathusia.)

scitula Er. Karlsburg, Schässburg (c. a.).
(*Tachyusa* s. str.)

objecta Rey. Karlsburg, Schässburg, Unter-Kerz (c. a.).

coarctata Er. Hâtszeg, Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm, Unter-Kerz, Schässburg, Karlsburg (c. a.); Bistritz, Kronstadt (Deubel).

nitella Fauv. (*concinna* Kraatz nec Heer, Ganglb.). Baassen (c. a.).

constricta Er. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.); Dees, Kronstadt (Deubel).

(Caliusa.)

balteata Er. Hâtszeg (Bielz); Kronstadt (Deubel).

208. *Gnypeta Thomson.*

carbonaria Mannb. Kronstadt (Deubel).

ripicola Kiesenw. Schässburg (Kokelufer, c. a.).

velata Er. Honigberg (Altufer, Deubel).

209. *Aleuonota Thomson.*

(Aleuonota s. str.)

atricapilla Rey. (*rufotestacea* Kr.). Kronstadt (Bielz).

gracilenta Er. Rodnagebirge (c. a.).

(Apimela.)

macella Er. Honigberg (Altufer, Deubel).

210. *Atheta Thomson.* (*Homalota* Er.)

(Hydromectina.)

subtilissima Kr. Honigberg (Altufer, Deubel).

(Hydromecta.)

fluvialis Kr. Unter-Kerz (c. a.).

(Diacra.)

luteipes Er. Götzenberg, Präsbe (Bielz); Rotenturm (c. a.).

(Glossola Fowler-Alconota Rey.)

gregaria Er. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay, Deubel).

(Alconota Thoms.)

currax Kr. Puj (Hâtszeg, c. a.); Rodnagelände, Bucsecs (Valcea Jeppi, Deubel).
cambrica Woll. Bistra (c. a.); Kronstadt (Deubel).

aegyptiaca Motsch. Ober-Tömösch (Deubel).

Im Catalogus Col. Europae, Heyden etc. 12. 195 ist diese Art als fragliches Synonym zu A. cambrica Woll. gestellt.

sulcifrons Steph. Kronstadt (Bielz); Nagybágymás (Deubel).

insecta Thoms. Unter-Kerz, Schässburg (Kokelufer, c. a.); Rodnagelände, Vargyasufer (Deubel).

(Metaxa.)

terminalis Grav.

var. grisca Thoms. Schässburg (c. a.).
melanocephala Thoms. Hermannstadt, Baumgarten b. H. (Ormay); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

elongatula Grav. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Rodnagelände (c. a.); Kronstadt (Deubel).

morio Heer. Kronstadt (Deubel).

hygrotopora Kr. Kronstadt (Bielz); Alsó-Rákos, Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Vargyastal, Zernest (Deubel).

gemina Er. Kronstadt (Gespreng, Deubel).
islandica Kr. Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagelände (c. a.).

(Hygroecia.)

fallaciosa Sharp. Kronstadt, Schulergebirge (Bielz); Rodnagelände (determin. Eppelsheim, Deubel).

(Parameotica.)

laticeps Thoms. Schässburg, Rodnagelände (c. a.).

(Dralica.)

vilis Er. Götzenberg, Präsbe (Bielz).

(Oreostiba.)

bosnica Ganglb. Bucsecs (Deubel, c. a., determin. Ganglbauer); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

Bielz kannte Atheta bosnica Ganglb. nicht, welche bei uns die Atheta tibialis Heer zu vertreten scheint; daher ist A. tibialis Heer vorläufig zu streichen.

(Taxicera.)

deplanata Grav. Marosujvár (c. a.).

(Dinarea.)

angustata Gyll. Kronstadt, Altufer (Deubel).
aequata Er. Kronstadt, Hosszuvalu (Bielz); Schässburg, Marosujvár, Unter-Kerz (unter Baumrinde, c. a.); Tusnád (Deubel).

linearis Grav. Götzenberg, Präsbe, Kronstadt, Hosszuvalu (Bielz); Schässburg (unter Baumrinde, c. a.); Zernest (Deubel).

(Pachnida.)

nigella Er. Kronstadt (Gespreng, Deubel).

(Álicanta.)

incana Er. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

(Plataraea.)

melanocephala Heer. Schässburg (c. a.); Rodnagebirge (alpin, Deubel).*brunnea* F. Gross - Schenk, Kronstadt, Hosszufalu, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Rodnagebirge (c. a.).

(Ptychandra.)

hepatica Er. Bistra, Rotenturm (c. a., 2 ♂♂).

(Bessobia.)

occulta Er. Kronstadt (Méhely, an einer Hausmauer); Hermannstadt, Schässburg (Kokelufer, c. a.). *Thoms. Frecker Gebirge (Sorbota, c. a.).**excellens* Kr. Schässburg, Rodnagebirge (♂ c. a.).

(Anopleta.)

corvina Thoms. (excavata Er.). Götzenberg, Präsbe (Bielz); Rodnagelirge (c. a.); Bucsecs (Deubel).*arcana* Er. Schulergebirge, Bucsecs (Deubel).

(Traumoezia.)

picipes Thomson. Surul, Kronstadt (Bielz); Marosujvár, Schässburg (c. a.); Rodnagelirge, Bucsecs (Deubel).*angusticollis* Thoms. (ravilla Kr.). Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm (c. a.).

(Philygra.)

palustris Kiesenw. Rotenturm, Präsbe (Ormay); Kronstadt (Zinne, Deubel); Malomvitz (c. a.).*procera* Kr. St. Annensee, Schässburg (Siechlhofberg, c. a.).

(Microdota.)

aegra Heer. Rodnagelirge (c. a.).*excisa* Epp. Rotenturm (♂, c. a.).*mortuorum* Thoms. Rotenturm (c. a.).*amicula* Steph. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (auf Kohlstrünken, 30. April, c. a.).*subtilis* Scriba. Schässburg (Fuchsloch am ausfliessenden Saft einer Buche, März, c. a.); Vargyastal (Deubel).*spatula* Fauv. Rodnagelirge (c. a.).*paleola* Er. Schässburg (Fuchsloch auf einem Pilz, c. a.); Gyögy (auf Pilzen, Ormay).

(Rhopa'ocera.)

clavigera Scriba (Atelhill, Kokelufer in Genniste, 7. November, c. a.).

(Alaochia.)

scapularis Sahlb. Kerzer Gebirge (Bielz).

(Atheta s. str.)

subterranea Rey. Bucsecs (c. a.).*nigricornis* Thoms. Rodnagelirge (Koronjis, c. a.).

Atbeta excavata Gyil., welche Bielz anführt, dürfte A. excavata Er. = A. corvina Thoms. sein, da erstere nur aus Schweden und England bekannt ist.

divisa Märk. Schuiergebirge (c. a.); Honigberg (Altufer, Deubel).*basicornis* Rey. Schässburg (Breite, in einer alten Eiche, 7. Oktober, c. a.).*autumnalis* Er. Karlsburg (Juli, c. a.).*oblita* Er. Schässburg (Gross - Alischer Kupen, 4. Mai, c. a.); Kronstadt (Deubel).*coriaria* Kr. Rodnagelirge (Deubel).*gagatina* Baudi. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Heltan, Gyögy (Ormay); Rotenturm, Hászeg, Schässburg (an ansfliessendem Buchensaft, c. a.); Tusnád (Deubel).*myrmecobia* Kr. Rodnagelirge (c. a.).*sodalis* Er. Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Schanta (Ormay); Schässburg (c. a.); Tusnád (Deubel).*pallidicornis* Thoms. Kerzer Gebirge (Bielz); Hászeg, Gebirge, Ompolyitza (Karlsburg), Karlsburg, Csukás (c. a.); Kronstadt, Zernest (Deubel).*nigritula* Grav. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Heltan, Kerzer Gebirge, Gyögy (Ormay); Nagyenyed, Schässburg (altes Eichenholz, c. a.); Altufer, Hászeg (Deubel).*liturata* Steph. Bucsecs (Malajest, Méhely); Ompolyitza (Karlsburg). Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).*boletiphila* Thoms. Karlsburg, Bistra, Rotenturm, Schässburg (c. a.).*spelaea* Er. (Ompolyitza Tal bei Karlsburg in einer von Federmäusen bewohnten Höhle im Dünger derselben, c. a.).
crassicornis F. (sericans Grav.). Kronstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt, Götzenberg, Kerzer Gebirge, Kleinpold (Ormay); Ober-Kerz (Glashütte), Zalatna, Rodnagelirge (c. a.); Bodzaer Gebirge (Deubel).♀ var. *fulvipennis* Muls. Rotenturm (c. a.).*pilicornis* Thomson. Rodnagelirge (Deubel); Schässburg, Bistra, Rotenturm (c. a.).*xanthopus* Thoms. Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Kronstadt (Deubel).*trinotata* Kr. Kronstadt (Bielz); Ober-Komana (Méhely); Hászeg, Gebirge (c. a.).*euryptera* Steph. Hermannstadt (Ormay, am ausfliessenden Eichensaft); Altufer (Deubel); Schässburg (auf Krautstrünken, 3. April, c. a.).*valida* Kr. Rodnagelirge (c. a.); Bucsecs (Deubel).*aquatica* Thoms. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay).*Pertyi* Heer. Kronstadt, Ilosszufalu (Bielz). Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser Art in Kronstadt.*castanoptera* Mannh. Zibinsgebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Kerzer Gebirge Gyögy (Ormay); Unter-Kerz, Baassen, Schässburg, Schulergebirge (c. a.); Tusnád (Deubel).

aquatilis Thomson. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).
 (Liogtuta.)
hypnorum Kiesenw. Kronstadt (Deubel).
pagana Er. Bucsecs (Deubel).
granigera Kiesenw. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm, Bistra, Schässburg, Borszék, Ratosnya (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).
 ♀ var. **subalpina** Rey. Bistra, Csukás (c. a.).
microptera Thoms. Rodnagebirge (Deubel).
longiscula Grav. (vicina Steph.). Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hâtszeg, Baassen, Bistra (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).
nitidula Kr. Kronstadt (Bielz); Zoodgebirge (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Alsó-Rákos (c. a.).
oblonga Er. (oblongiscula Sharp.). Schanta (Ormay); Paringul, Frecker Gebirge (Serbota), Alsó-Bákos, Balánhánya, Schässburg (c. a.); Hâtszeg, Rodnagibirge (Deubel).
 (Thinobaena.)
vestita Grav. Rosenau (Deubel).
 (Dimetrotia.)
contristata Kr. Bucsecs (Deubel).
atramentaria Gyllh. Schulergebirge (c. a.).
picipennis Mannh. (subrugosa Rey nec Kiesenw.). Fogarascher Gebirge, Zernest (Deubel); Bistra (c. a.).
putrida Kr. Rotenturm (c. a.); Buleasec, Bucsecs, Schulergebirge (Deubel).
cinnamoptera Thoms. Marosujvár, Tordae Schlucht, Bucsecs, Rodnagebirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).
marcida Er. Rosenau (Deubel); Schässburg (c. a.).
laevana Rey. Karlsburg, Zalatna, Schässburg (auf Pilzen, c. a.).
 (Badura.)
parvula Mannh. Rodnagebirge, Schässburg (c. a.); Schuler-Gebirge, Nagyhagy-más (Deubel).
 (Datomicra.)
cribrata Kr. Rodnagebirge (c. a.).
sordidula Er. Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz).
celata Er. Kronstadt (Bielz); Rodnagebirge (c. a.).
zosterae Thoms. Kronstadt (Bielz); Borszék, Schässburg (29. Juli, Fuehsloch, c. a.).
 (Pyenota.)
paradoxa Rey. (Skalitzky Bernh.). Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).
 (Chaetida.)
longicornis Grav. Gross-Scheuern (Bielz); Bükszad, Rodnagebirge (c. a.); Schuler-Gebirge, Kronstadt (Deubel).
 (Coprothassa.)
consanguinea Epp. Kronstadt (Bielz); Schanta (Ormay).
melanaria Mannh. Baassen (c. a.).

sordida Marsh. Götzemberg, Präsbe, Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Rodnagebirge, Karlsburg, Baassen, Rotenturm (c. a.). (Acrotona.)
pygmaea Grav. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Bistra (c. a.).
aterrima Grav. Götzemberg, Präsbe (Bielz); Schanta (Ormay); Rodnagelirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).
parva Sahlb. Bucsecs, Kronstadt, Zernest (Deubel).
parens Rey. Hâtszeg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
orphana Er. Rodnagelirge, Nagyhagymás, Kronstadt (Deubel).
fungi Grav. Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Redna-Gebirge, Ratosnya, Előpatak, Schässburg (c. a.); Schuler-Gebirge (Deubel).
 var. **orbata** Er. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Unter-Kerz (Kloster-teich), Rodnagebirge (c. a.); Kronstadt, Altufer (Deubel).
clientula Er. (pulchra Kr.). Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Borszék (c. a.). Deubel bezweifelt das Vorkommen der A.
clientula Er. in Kronstadt, ebenso das der A. sordidula Er.
fuscipes Heer. Hermannstadt (Ormay); Karlsburg (c. a.).
laticollis Steph. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.).
subsinuata Er. Karlsburg (am ausfliessenden Saft einer Ulme), Schässburg (c. a.). (Anischa.)
analis Grav. Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Zalatna, Rodnagebirge, Borszék, Schässburg (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).
soror Kr. (Götzenberg, Präsbe (Bielz); Rodnagelirge, Paringul, Schässburg (c. a.).
cavifrons Sharp. Karlsburg, Schässburg (c. a.). (Amidohria.)
talpa Heer. Schässburg, Büdös (c. a.); Kronstadt (Ameisennester, Deubel).
validiuscula Kr. Kronstadt (Bielz). (Meotica.)
exitis Er. Karlsburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
indocilis Heer. Schässburg (Witeberg, an den Wurzeln von Pflanzen, c. a., det. Ganglbauer)

211. *Sipalia* Rey.

infirma Weise (Leptusa infirma W.). Kerzer Gebirge, Frecker Gebirge (Serbota, aus Grasbüscheln gesiebt, c. a.); Nagyhagymás (Deubel); Rodnagelirge (Ganglbauer).

curtipennis Aub. Kronstadt (Zinne), Alt-ufer (Deubel).
Deubeli Bernh. Alsó-Rákos (Deubel, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

Bielz kennt weder *S. curtipennis* Aub. noch *S. Deubeli*, von denen erstere oft für *S. arida* Epp. gehalten wurde, die bei uns wohl nicht vorkommt, jedenfalls aber erst nachzuweisen sein wird.

armata Epp. Hlászeg, Baassen, Schässburg (Kokelufer in Geniste, c. a.); Rodnagebirge, Kronstadt (Deubel).

circellaris Grav. Neudorf b. II., Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Borszék, Előpatak, Schässburg (c. a.); Nagyhangmás (Deubel).

caesula Er. Balánbánya (c. a.).

alpicola Mill. (*Atheta alpicola* Mill.) Rodnagbirge, Zernester Gebirge, Kerzer Ge- birge (Bulea, c. a.).

carpathica Mill. Bucsecs (c. a.); Rodnagbirge (Deubel).

212. *Notothecta* Thoms.

flavipes Grav. Schässburg (Breite, 11. April 1909, c. a.); Kronstadt (Deubel).

confusa Märk. Schässburg (Breite, 11. April 1900, c. a.).

anceps. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

213. *Dadobia* Thoms.

immersa Er. Rotenturm, Schässburg, Büdös, Borszék (c. a. unter der Rinde verschiedener Bäume); Kronstadt (Noa, Deubel).

214. *Tomoglossa* Kraatz.

luteicornis Kr.? Schässburg (Türkenhill, Oktober, c. a.).

215. *Callicernus* Gravenh.

rigidicornis Er. Ober-Kerz (Glashütte), To-roczkó (Erzgebirge, Eichenstumpf, Juli 1903, c. a.).

216. *Thamlaraea* Thoms.

cinnamomea Grav. Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Honigberg (Altufer), Alsó-Rákos (Deubel).

hospita Märk. Kerzer Gebirge (Bielz); Hlászeg (c. a.); Honigberg (Altufer, Deubel).

217. *Astilbus* Stephens.

canaliculatus F. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

218. *Zyras* Stephens.

Die Arten leben in der Nähe oder in Ameisen-nestern. (Zyras s. str.)

collaris Payk. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Unter-Kerz, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

fulgidus Grav. S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hlászeg (Deubel, c. a.); Schässburg (c. a.).

Haworthi Steph. Gross-Scheuern, Klausenburg (Bielz); Gyögy (Ormay); Szováta, Rotenturm, Ratosnya, Hammersdorf, Schässburg (bei Myrmica laevinodis, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel). (Pella.)

funestus Grav. Hermannstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Gyögy (Ormay); Schässburg (bei Lasius fuliginosus, c. a.); Kronstadt, Hlászeg (Deubel).

cognatus Märk. Gross-Scheuern, Holzmünen, Mezőség (Záh, Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schässburg (bei Lasius fuliginosus, c. a.); Honigberg (Deubel).

humeralis Grav. Hermannstadt, Harbach-Tal, Hosszufalu (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt (Deubel); Schässburg (c. a.); Klausenburg (Müller).

similis Märk. Hermannstadt (Ormay); Schässburg (bei Lasius fuliginosus, c. a.).

limbatus Payk. Schässburg (bei Ponera contracta, c. a.); Honigberg (Deubel). (Myrmecia Er.)

lugens Grav. Mezőség (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (bei Lasius brunneus, c. a.); Kronstadt (Deubel); Klausenburg (Müller).

laticollis Märk. Schässburg (bei Lasius fuliginosus, ziemlich häufig, c. a.); Kronstadt (Deubel).

Hampei Kr. Hermannstadt (j. W., Bielz). Da Bielz den M. *laticollis* Märk. nicht anführt, liegt es nahe, anzunehmen, dass hier eine Verwechslung vorliegt, da M. *Hampei* nur aus Kroatien nachgewiesen ist. (Myrmecia.)

plicatus Er. Michelsberg, Mediasch (Bielz).

219. *Lomechusa* Gravenh.

strumosa Grav. Präsbe (Bielz).

220. *Atemeles* Stephens.

emarginatus Payk. Hlászeg (Bielz); Schässburg (bei Myrmica rubra, c. a.); Ratosnya (Müller).

paradoxus Grav. Götzenberg, Präsbe (Bielz); Schässburg (Breite, April, in Haufen der Formica rufa, c. a.); Kronstadt (Deubel).

Aleocharini.

221. *Phloeodroma Kraatz.**concolor* Kr. Schässburg (c. a.).222. *Phloeopora Erichs.**testacea* Mannh. (*reptans* Er.). Porumbach, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).*angustiformis* Baudi. Ilátszeg, Kronstadt (Zinne, Deubel).*teres* Grav. (*corticalis* Er.). Götzenberg, Präsbe, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (unter Eichenrinde und in altem Eichenholz, c. a.).*corticalis* Grav. (*major* Kr., *latens* Er.). Kronstadt (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Klausenburg (Sigmund-Park unter Baumrinde, c. a.); Ilátszeg (Deubel).223. *Ilyobates Kraatz.*

Die Arten leben in der Nähe oder in Ameisenkolonien.

nigricollis Payk. Götzenberg, Kronstadt (Bielz); Gyögy (Ormay); Schässburg (c. a.).

Meinen sämtlichen I. nigricollis fehlt die Aushöhlung des letzten Fühlergliedes, welche bei I. Mech Baudi deutlich zu beobachten ist. Schliesslich besitzt das ♂ ähnlich wie die Männchen des I. Mech, in der Mitte der Basis der vier ersten Dorsalsegmente ein etwas feineres Fältchen. Da aber die Tiere im übrigen mit der Beschreibung des I. nigricollis übereinzustimmen scheinen, getraue ich mich nicht, dieselben als neue Art anzusprechen.

var. *Deubeli* Bernh. Ober-Kerz (Glashütte), Iléviz (c. a.); Bucsecs, Iloníberg (Deubel).

Mech Baudi. Ilátszeg, Schässburg, Előpatak, Borszék (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

224. *Calodera Mannh.**nigrita* Mannh. Borgoer Pass (Bielz); Iloníberg (Altufser, Deubel).*aethiops* Grav. Iloníberg (Altufser, Deubel).*uliginosa* Er. Kerzer Gebirge (Bielz).225. *Chilopora Kraatz.**longitarsis* Er. Schässburg (Schleifengraben), Krivadia (Ilátszeg, in einer Höhle, c. a.); Kronstadt, Bucsecs (Valea Jeppi, Deubel).*rubicunda* Er. Schässburg (Kokelufer, c. a.).226. *Amarochara Thomson.*

(Amarochara s. str.)

umbrosa Er. Zibinsgebirge (Bielz); Kronstadt (Deubel).

(Mniobates.)

forticornis Lac. Götzenberg, Präsbe (Bielz); Schässburg (c. a.).227. *Ocalea Erichs.**badia* Er. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Michelsberg (Ormay); Rodnagebirge (Deubel); Baassen, Büdös, Schässburg, Rotenturm, Malomvitz (c. a.).var. *puncticollis* Rey. Kronstadt (Bielz).var. *robusta* Bernh. Büdös, Csukás (c. a.); Bucsecs, Kronstadt (Deubel).*picata* Steph. Hermannstadt, Heltau (Ormay); Bucsecs (subalpin, Deubel).228. *Deubelia Bernhauer.**pieina* Aubé. Kronstadt (Gespreng, aus Rasen von Sumpfpflanzen gesiebt, Deubel; c. a.).229. *Ocyusa Kraatz.*

(Ocyusa s. str.)

maura Er. Kronstadt (Gespreng, Deubel). (Mniuss.)*incrassata* Rey. Schässburg (Scherkes, aus Laub gesiebt, 10. März, c. a.); Bucsecs, Schulergebirge, Nagyhagymás (Deubel).230. *Oxypoda Mannh.*

Die Arten leben auf Pilzen, am ausfliessenden Baumssäfte, unter Laub etc.

(Oxypoda s. str.)

spectabilis Märk. (*ruficornis* Gyll.). Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg (Citendell, auf verpilztem Eichenstumpf, 12. Oktober, c. a.); Zernest (Deubel).*lividipennis* Mannh. (*luteipennis* Er.). Hermannstadt (Ormay); Baassen, Rotenturm, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).*opaca* Grav. Zibins-Gebirge, Gross-Schenk (Bielz); Hermannstadt, Gyögy, Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay); Balánbánya, Bistra, Baassen, Schässburg (unter faulenden Pflanzenstoffen, häufig, c. a.).*vittata* Märk. Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, (Ormay); Schässburg (an Eichenstämmen, c. a.).*longipes* Rey. Kronstadt, Zernest, Schulergebirge (Deubel).

(Podoxya.)

nimbicola Fauv. Siebenbürgen (Catalogus Col. Europ. etc., 1906, col. 212); Rotenturm (c. a.).*vicina* Kr. (*humidula* Er.). Schässburg (Kokel, Geniste, c. a.).*induta* Rey. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).*Skalitzkyi* Bernh. Schulergebirge, Nussbach (Deubel); Rodnagebirge (c. a.).*umbrosa* Gyllh. Kronstadt (Bielz); Bistra, Rodnagebirge, Borszék, Baassen (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).*sericea* Heer. Schässburg (c. a.).

- Doderoi** Bernh. Kronstadt, Rosenau (Deubel).
exoleta Er. Rodnagebirge (Deubel, c. a.); Rotenlurm (c. a.).
exigua Er. Schässburg (Kokelufer, c. a.); Törzburg (Deubel).
(Deropoda.)
rufula Rey. Hermannstadt (Bielz).
rugulosa Kr. Rotenturm (c. a.).
(Baeoglena.)
praecox Er. Unter-Kerz (c. a.); Honigberg (Altufer, Deubel).
(Mycetodrepa.)
alternans Grav. Rotenturm, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg, Borszék, Csukás c. a.); Schulergebirge, Bucsecs (Deubel).
formosa Kr. Schässburg, Bistra, Borszék (c. a.); Schulergebirge (Deubel).
(Sphenomma.)
togata Er. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Borszék, Balánbánya (Egyeskö, aus dem Moos und den Algenbüscheln einer Quelle in Anzahl, c. a.).
montana Kr. Porumbacher Geb. (Ormay); Bucsecs, Kerzer Geb. (Bulea), Rodnagebirge (aus Grasbüscheln gesiebt, c. a.).
rufa Kr. (praecellens Epp.). Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Puj (Hátszeg, c. a.); Erösd (Altufer, Deubel).
(Demosoma.)
bicolor Rey. Bucsecs (subalpin), Schulergebirge, Zernest (Deubel); Malomvitz (c. a.).
haemorrhoa Mannh. Schässburg (aus dem Holze alter, kranker Eichen, c. a.); Rodnagelbirge (Deubel).
rugicollis Kr. Kronstadt (Ameisenhaufen, Deubel).
formicetcola Märk. Kronstadt? (Deubel).
amoena Fairm. Kronstadt (Bielz); Büdös (c. a.).
filiiformis Redt. Karlsburg, Büdös, Schässburg (Kokelufer), Rodnagelbirge (c. a.); Kronstadt (Gespreg, Deubel).
(Bessopora.)
soror Thoms. Paringul, Tordaer Schlucht, Rodnagelbirge (c. a.); Nagyhagymás, Bucsecs (Deubel).
Deubelli Bernh. Bucsecs, Paringul, Frecker Gebirge (Serbota), Rotenturm (c. a.); Rodnagelbirge (Deubel).
annularis Mannh. Kronstadt (Bielz); Götzemberg (Ormay); Zalatna, Schässburg, Balánbánya, Büdös, Borszék (c. a.); Schulergebirge, Bucsecs, Rodnagelbirge (Deubel).
brachyptera Steph. Rodnagelbirge (c. a.).

231. *Platyola Rej.*

fusicornis Rey. Marosujvár (Mai, c. a.).

- 232. *Stichoglossa Fairm.***
(Stichoglossa s. str.)
semirufa Er. Hermannstadt (Ormay); Baassen (c. a.).
(Dexiogya.)
corticina Er. Hermannstadt (Bielz); Malomvitz, Schässburg (c. a.); Honigberg (Altufer, Deubel).
(Ischnoglossa.)
prolixa Grav. Bucsecs, Bistra (c. a.); Königstein, Nagyhagymás (Deubel).

233. *Thiasophila Kraatz.*
angulata Er. Schässburg, Prászaka (Zalatna, in den Nestern der Formica rufa, c. a.); Kronstadt, Alsó-Rákos (Deubel).

234. *Euryminnsa Ganglb.*
crassa Epp. Schässburg, Marosujvár, Unter-Kerz (c. a.).

235. *Cratararea Thoms.*
(Microglossa Kr. ex parte.)
suturalis Mannh. Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt, Zernest (Deubel).

236. *Microglossa Kraatz.*
pulla Gyllh. Schässburg (in allen kranken Eichen), Előpatak (c. a.); Kronstadt (Deuhel).
gentilis Märk. Reps, Schässburg (bei Lasius brunneus in alten Eichen, c. a.); Kronstadt (Denbel).
marginalis Grav. Honigberg (Altufer, Deubel).

237. *Homoeusa Kr.*
acuminata Märk. Kronstadt (Bielz); Gyógy (Ormay); Hátszeg, Schässburg, (in alten Eichen bei Lasius brunneus, oft in Gesellschaft der Euryusa - Arten, c. a.).

238. *Dinarda Mannerh.*
dentata Grav. Klausenburg, Schässburg in den Nestern der Formica rufa, c. a.); Kronstadt (Deubel).
var. Märkeli Kiesenw. Schässburg (mit der Stammform, c. a.); Kronstadt (Deubel).

239. *Aleochara Gravenhorst.*
Die Arten finden sich unter fanlenden Pflanzen- und Tierstoffen, einige in den Nestern von Ameisen.
(Aleochara s. str.)
curtula Goeze (fuscipes Grav.). Ilátszeg, Gross-Scheuern, Mezőség, Gycke (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermann-

- stadt, Hammersdorf (Ormay); Kronstadt (Deubel).
- classicornis* Lac. (*lateralis* Heer.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
- laticornis* Kr. Hátszeg (Deubel).
- lata* Grav. Rotenturm (c. a.).
- brevipennis* Grav. Kronstadt (Deubel). var. *curta* Sahll. (*fumata* Er.). Schässburg, Puj (Hátszeg, c. a.). (*Baryodma*.)
- intricata* Mannh. (*bipunctata* Er.). Gross-Scheuern, Ober-Sebes, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Rotenturm (c. a.); Hermannstadt, Baumgarten (Ormay); Rodnagabe., Kronstadt (Zinne, Deubel).
- morloni* Grav. Hermannstadt (Bielz); Rodnagabirge (Alpin, Deubel).
- tristis* Grav. Hátszeg, Hammersdorf, Holzmengen (Bielz); Baassen, Déva (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- moesta* Grav. Neudorf b. H., S.-Regen (Bielz); Ompolyicatal (bei Karlsburg, in einer Höhle auf den Exkrementen von Fledermäusen in grosser Zahl, c. a.); Kronstadt (Deubel). (*Homoeochara*.)
- sparsa* Heer. (*succicola* Thoms.). Kronstadt (Bielz); Marosuvárvár, Schässburg (Kokelusfer), Rotenturm (c. a.); Kerzer Gebirge (Ormay). (*Polychara*.)
- lanuginosa* Grav. Kronstadt, Schulergelände (Bielz); Topánfalva (Erzgebirge, c. a.); Hermannstadt (Ormay).
- villosa* Mannh. Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Méhely); Schässburg (c. a.).
- rufitarsis* Heer. Hátszeg (Deubel); Petrosény, Schässburg (c. a.).
- sanguinea* L. Kerzer Gebirge (Ormay); Schässburg (c. a.).
- fumata* Grav. (*nycetophaga* Kr.). Kerzer Gebirge (Bielz); Csukás, Schässburg, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- moerens* Gyll. Kronstadt (Deubel).
- haemotodes* Kr. Kerzer Gebirge (Bielz). Das Vorkommen der A. *haemotodes* Kr. bei uns scheint weiteren Nachweises zu bedürfen, da die Art dem südlichsten Europa angehört.
- laevigata* Gyll. (*bisignata* Er.). Salzburg, Neudorf b. H. (Bielz); Déva, Schässburg, Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel). (*Ceranota*.)
- erythroptera* Grav. Bucsecs, Kronstadt (Deubel); Schässburg (Klossel, Eichenmulm, 9. April, c. a.). (*Coprochara*.)
- bilineata* Gyll. Oláhfalu (Bielz); Rodnagabirge (c. a.); Bucsecs (Deubel); Hermannstadt (Ormay).
- bipustulata* L. (*nitida* Grav.). Salzburg, Neudorf b. H., S.-Regen (Bielz); Schässburg, Bistra, Frecker Geb. (Sorbota), Rodnagabirge (c. a.); Schulergelände (Deubel).

VIII. Pselaphidae.

Faronini.

240. *Faronus Aubé.*

Lafertei Aub. Csukás (am Bachufer im 2 Exemplaren aus Laub gesiebt), Bucsecs (Deubel).

Raffrayi Lokay. Rodnagabirge (im September 1910 von Dr. Lokay gesiebt, Acta Soc. ent. Bohemiae, VII, 1910, p. 91, fig.)

Euplectini.

241. *Saulcyella Reitter.*

Schmidtii Märk. Schässburg Fuchsloch, im Mai in einem von Lasius brunneus bewohnten Nussbaum, Breite, September und Oktober in Mehrzahl, im April in einem Exemplar in Eichen, welche von Lasius brunneus bewohnt waren, c. a.).

242. *Trimium Aubé.*

latipennis Tourn. (det. Reitter). Schässburg (Breite, Oktober in alten, von Lasius brunneus bewohnten Eichen, c. a.).

Merklii Reitter (det. Reitter). Schässburg (25. Juli, Reissel, im Mulf und Holz einer Linde, c. a.).

brevicorne Reichenb. Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Elöpatak, Rotenturm, Karlsburg, Schässburg (c. a.).

carpathicum Saulcy. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Hátszeg, Schässburg unter Laub und in Baummulm, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

243. *Euplectus Leach.*

(*Plectophloeus*.)

Euplectus cavifrons n. sp. Länge 1'4 mm. Schässburg (c. a.). *Euplectus nubigenus* affinis, rufotestaceus, nitidus, subtilissime pubescens; capite transverso, temporibus rotundatis, impunctato, nitido, positi utrinque fovea rotundo impresso, antice transverse profunde sulcato, margine anteriore modice elevato, crassato, medio marginis postice late sinuato, utrinque subfoveoleato. Antennae validae, articulis duobus basalibus incrassatis, 3 subquadrato, ultimus valde transversis. Prothorax laevis, subcordatus, medio foveolis dubia latis, rotundis obsitus. Elytra latitudini posticatae aequilonga, lateribus parum rotundato-ampliata, stria humerali ante medium evanescente. Abdomen tergitis anteriorius hau linearum, subtilissime dense coriaceum, modice nitidum.

Unter den Arten des Subgenus *Plectophloeus* besitzt keine andere eine ähnliche Stirnskulptur. In Gestalt und Färbung steht sie dem *Euplectus nubigenus* nahe, ist aber etwas kleiner als die kleinsten Stücke derselben und während bei *E. nubigena* die beiden vorderen Stirngrübchen durch eine seichte Vertiefung verbunden sind, haben wir bei dieser Art eine stark vertiefte Querfurche, deren wulstiger Vorderrand auf der hinteren Seite in der Mitte

breit und seicht, aber deutlich ausgerandet ist, und in den äussersten Ecken der Furche befindet sich beiderseits je ein wenig auffälliges seichtes Grübchen. Die beiden hintern Stirngrübchen sind rundlich und isoliert und stehen weder mit der vorderen Furche noch untereinander in Verbindung. Die Fühler sind kräftig und kaum so lang als Kopf und Halsschild zusammengenommen, das vorletzte, stark quere Fühlerglied ist fast ebenso dick als der Knopf. Die beiden mittleren Grübchen des fast herzförmigen Halsschildes sind isoliert, das vordere seichter, rundlich, den Vorderrand nicht erreichend, das hintere etwas tiefer und etwas quer, das Seitengrübchen seicht und mit dem hintern Mittelgrübchen nur undeutlich verbunden.

nubigena Reitter. Kronstadt (Bielz); Csukás, Schässburg (c. a.).

venustus Csiki. Annal. mus. hung. VIII. 1910, Rotenturm (ungar. Nat.-Museum, col. Diener).

ornatifrons Reitter. Siebenbürgen, nahe der rumänischen Grenze (Wiener e. Ztg. XXIX. 151—163. 1910).

Tischeri Aub. (Tischeri Ileer.). Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Rodnagelgebirge (Ganglbauer, unter Buchenlaub.)

carpathicus Reitter (det. Reitter). Frecker Gebirge (Serbota), Hátszeg, Rotenturm, Schässburg, Rodnagelgebirge (c. a.); Rodnagelgebirge (Ganglbauer, unter Buchenlaub.).

(Euplectus i. sp.)

brunneus Grimmer. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Bucsecs (Deubel); Csukás, Frecker Gebirge (Serbota), Schässburg (c. a., det. Reitter); Rodnagelgebirge (Ganglbauer, unter Buchenlaub.).

Duponti Aubé. Kronstadt? (Deubel); Rodnagelgebirge (Ganglbauer, unter Buchenlaub.).

bescidicus Reitter (det. Reitter). Csukás (c. a.).

piceus Motsch. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Karlsburg, Rotenturm, Schässburg, Borszék (c. a.).

nanus Reichenb. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Szováta, Unter-Kerz, Schässburg, Marosujvár (c. a., det. Reitter); Rotenturm (Ormay).

sanguineus Denny. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

signatus Reichenb. Kronstadt (Bielz); Schässburg (unter Laub, c. a.).

Felschei Reitter (det. Reitter). Schässburg (alte Eiche bei Lasius brunneus, c. a.).

punctatus Muls. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Alsó-Rákos (in einem Lindenlotz bei Ameisen, c. a.).

falsus Bed. (intermedius Reitter). Schässburg, Csukás (c. a., det. Reitter).

Karsteni Reichenb. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuerl, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (in alten Eichen bei Lasius brunneus), Baassen, Marosujvár, Alsó-Rákos (c. a.).

244. *Bibloplectus* Reitter.

ambiguus Reichenb. Hermannstadt (Bielz); Kronstadt, Rodnagelgebirge (Deubel).

245. *Bibloporus* Thoms.

bicolor Denny. Holzmengen, Kerzer Gebirge (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Kronstadt, Zalatna, Büdös, Borszék, Schässburg (im Mulm alter Eichen und Buchen, c. a.).

Trichonychini.

246. *Trichonyx* Baudi.

sulcicollis Reichenb. Hermannstadt (Bielz); Marosujvár (unter der Rinde einer vertrockneten Espe, welche von Ponera contracta und einer Myrmica-Art bewohnt war), Schässburg (in einer von Lasius brunneus bewohnten Weissbuche, c. a.).

247. *Amauronyx* Reitter.

Märkeli Aub. Hermannstadt, Holzmengen (Bielz).

Batrissini.

248. *Batrillus* Laporte.

ormayi Reitter. Michelsberg (Burg), Rotenturm (Bielz); Schässburg, Szurduk-Pass (in Maulwurfshaufen und unter Steinen bei der gelben Ameise, im Herbste und im Frühjahr, c. a.).

Die Beschreibung des Batr. Ormayi Reitter bedarf insoweit einer Ergänzung, als weder Reitter noch Ganglbauer in ihren Beschreibungen des feinen, scharfen Dornes Erwähnung tun, welcher beim Männchen an der Unterseite der Mittelschenkel deutlich wahrnehmbar ist, und zwar nicht nur bei den aus der Gegend von Schässburg stammenden Exemplaren, sondern auch bei denen vom Rotenturm- und Szurduk-Pass.

formicarius Aub. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Baassen, Alsó-Rákos, Hátszeg, Schässburg (in alten Eichen bei Lasius brunneus, seltener in Ameisenhaufen der Formica rufa in Eichenwäldern, auch auf der Weissbuche, c. a.); Bistritz (Müller).

249. *Batrishes* Reitter.

moreanus Reitter (det. Reitter). Schässburg (in alten Eichen bei Lasius brunneus, einmal in einer alten Weissbuche), Baassen, Rosenau (c. a.).

Ich habe unsere Art und vier Weibchen vom Csorbasee in Ungarn mit zwei deutschen Stücken, mir von Reitter freundlichst überendet, das ♀ aus Baiern stammend und von Flach gesammelt, verglichen und gefunden, dass B. moreanus sich tatsächlich von B. Delaportei

durch kräftigere Fühler und obsoletes Rückenfältchen auf den Flügeldecken unterscheidet. Der Unterschied im Fühlerbau tritt namentlich beim Weibchen hervor: während bei Delaportei alle Fühlerglieder bis zum achten wenigstens so lang als breit, das vierte und fünfte sogar länger sind, sind die Fühlerglieder des weiblichen moreanus von vier an umso deutlicher quer, je näher sie der Spitze sind, das neunte Glied ist kaum merklich breiter als das acht, die dreigliedrige Keule daher kaum abgesetzt; an der Spitze der männlichen Mittelschienen befindet sich ein deutlicher feiner Sporn. B. moreanus scheint den B. Delaportei im östlichen Europa zu vertreten.

venustus Reichenb. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Götzemberg, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Hâtszeg, Baassen (Eichen bei Lasius brunneus, c. a.); Kronstadt (Deubel).

adnexus Hampe. Csukás, Schässburg (wie der vorige, aber selten); Kronstadt, Tusnád (Deubel).

excultus Hampe. Hermannstadt (Bielz).
oculatus Aub. Hermannstadt (Bielz).

Bryaxini.

250. *Brachygluta* Thomson.

xanthoptera Reichenb. Kerzer Gebirge, Tartlau (Bielz); Nagyenyel, Unter-Kerz (c. a.).

tessulata Reichenb. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Heltau, Rotenturm (Ormay); Baassen, Unter-Kerz, Schässburg (c. a., wohl im ganzen Gebiet verbreitet, unter Laub und Gras), Kronstadt (Deubel).

tristis Hampe. Hermannstadt (Bielz); Szováta (auf Salzboden), Schässburg (c. a.); Rodnagelbirge (Deubel).

Helferi Schmidt. Déva (Bielz); Dees-Akna (c. a.).

haematica Reichenb. Durch das ganze Berg- und Hügelland am Ufer süsser Gewässer.

♂ var. *trigonoprocta* Ganglb. Zusammen mit der Stammform.

♂ var. *sinuata* Aub. Mit der Stammform.

251. *Reichenbachia* Leach.

juncorum Leach. Bistritz (Bielz); Rotenturm (Ormay); Schässburg (c. a.).

impressa Panz. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel, c. a.).

autennata Aub. Schässburg (Türkenhill, im Röhricht einer sumpfigen Stelle in grösserer Anzahl, 24. Oktober, ♂ und ♀, c. a.).

252. *Bryaxis* Saulcy. (Ryaxis Saulcy.)

longicornis Larch. (sanguinea auct.). Hermannstadt, Michelsberg, Götzemberg, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.).

Bythinini.

253. *Bythinus* Leach.

(Arcopagus.)

crassicornis Motsch. Götzemberg, Kronstadt (Bielz); Topánfalva (Erzgebirge), Unterkerz, Csukás, Hâtszeg, Alsó-Rákos, Ratosnya, Büdös, Rotenturm, Schässburg (unter Laub, wohl durch das ganze Gebiet verbreitet); Bucsecs (Deubel); Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Ormay).

bajulus Hampe. Kronstadt, Bucsecs (Bielz); Hâtszeg, Alsó-Rákos, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm, Heltau, Gyögy (Ormay).

♂ var. *ormayi* Ganglb. Terőczkó, Hâtszeg, Karlsburg, Rotenturm, Schässburg (c. a.).

Reitteri Saulcy. Kerzer Gebirge (Bielz); Götzemberg (Ormay); Rotenturm (c. a.); Bucsecs, Kelemegebirge, Rodnagelbirge (Deubel).

var. *sculptilisrons* Reitter. Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Paringul, Frecker Gebirge (Serbota), Unter-Kerz, Borszék, Terőczkó (c. a.); Gyögy (Ormay).

carpathicus Saulcy. Bucsecs (Alpin, Deubel).

Deubel führt wohl den B. carpathicus für den Bucsecs an, aber als fraglich; seiner Ansicht nach dürfte auch dieser Bythinus der B. transsylvaniae sein.

transsylvaniae Ganglb. Bucsecs (c. a.).

musorum Kiesew. Kronstadt (Bielz).

femoratus Aub. Kronstadt, Rotenturm (c. a., 3 ♂♂); Hâtszeg (Deubel).

Weisei Saulcy. Kerzer Gebirge (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Rodnagelbirge (Deubel).

bulbifer Reichenb. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Heltau (Ormay); Unter-Kerz (c. a.).

Curtisi Leo. Hermannstadt (Bielz); Baumgarten, Heltau, Michelsberg, Kerzer Gebirge (Ormay); Unter-Kerz, Büdös, Baassen, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Rodnagelbirge (Deubel).

var. *hungaricus* Reitter. Gyögy (Ormay); Schässburg, Baassen, Rotenturm (c. a.).

nodicornis Aub. Kronstadt (Bielz); Talmesch, Rotenturm, Kerzer Gebirge, Gyögy (Ormay); Hâtszeg, Kerzer Geb. (Bulea), Frecker Gebirge (Serbota), Schässburg (c. a.).

Deubeli Ganglb. Rodnagelbirge (Ganglbauer, c. a., Deubel); Büdös (c. a.); Bucsecs, Nagyhagymás (Deubel).

ruthenus Saulcy. Negoi (subalpin, Deubel).

acutangulus Reitter. Kronstadt, Bucsecs, Hâtszeg (Deubel).

securiger Reichenb. Hermannstadt (Bielz); Kerzer Gebirge, Gyögy (Ormay); Schässburg, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

macropalpus Aub. (*distinctus* Chaud.). Hermannstadt (Ormay); Schässburg (Türkenhill, an sumpfiger Stelle, Oktober, c. a.); Kronstadt (Deubel); S.-Regen (Müller).

Hopfgarteni Reitter. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser Art in Kronstadt.

unicornis Reitter. Bucsecs, Rosenauer Gebirge, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Burrelli Denny. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Schanta (Ormay); Schässburg (c. a.).

nigripennis Aub. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Talmesch, Rotenturm, Kerzer Gebirge (Ormay); Rodnagebirge, Schässburg (c. a.).

Stussineri Reitter. Nagyhagymás (Deubel).

validus Aub. Kronstadt (Bielz); Gyógy (Ormay); Rotenturm, Schässburg (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

puncticollis Denny. Hermannstadt, Unter-Kerz, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Gyógy (Ormay); Rotenturm, Büdös, Topánfalva (Erzgebirge), Schässburg (c. a.).

254. *Tychus* Leach.

niger Payk. Hátszeg, Gross-Scheuern, Kerz, Fogarasch (Bielz); Hermannstadt, Michelsberg (Ormay); Rotenturm, Karlsburg, Kronstadt (Kapellenberg), Schässburg (c. a.); Nagyhagymás, Bucsecs (Deubel).

var. **dichrous** Schmidt. Schässburg (c. a.).

Pselaphini.

255. *Pselaphus* Herbst.

Die Arten werden aus Laub und verwesenden Pflanzenstoffen gesiebt.

Helsei Herbst. Hátszeg, Gross-Scheuern, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Baassen, Borszék, Rotenturm (c. a.); Kerzer Gebirge, Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel); Bistritz, Klausenburg (Müller).

mehadiensis Friv. Rotenturm (aus Laub gesiebt, c. a., Deubel).

Ctenistini.

256. *Ctenistes* Reichenbach.

Die Art lebt wie die Pselaphiden.

palpalis Reichenb. Hátszeg, Dobra, Déva, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Fogarasch, Birthálm (Bielz); Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Kronstadt (Deubel); Bistritz (Müller).

Tyrini.

257. *Tyrus* Aubé.

mucronatus Panz. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Götzenberg, Präsbe (Ormay); Szurduk-Pass, Előpatak, Büdös, Schässburg, Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel).

IX. Clavigeridae.

258. *Claviger* Preysler.

testaceus Preyssl. Hátszeg, Gross-Scheuern, Michelsberg (Burg, Bielz); Rotenturm (in den Nestern der Lasius flavus, unter Steinen zusammen mit Batrysus Ormay); Szurduk-Pass (c. a.).

longicornis Müll. Götzenberg (Bielz); Schässburg (Fuchsloch, in einem Baumstrunk bei Myrmica rubra, c. a.); S.-Regen (Müller).

X. Scydmaenidae.

Cephenini.

259. *Euthiconus* Reitter.

parallelocollis Saucy. Kerzer Gebirge (Bielz); Gyógy (Ormay).

260. *Euthlia* Stephens.

plicata Gyllenh. Kronstadt (Zinne, Bielz); Wolkendorf b. Kr. (Deubel).

Schaumi Kiesenw. Hátszeg (Longitudo 1'3 mm, 1 ♀, c. a.).

Merkli Simon. Siebenbürgen (Hátszeg?, Catalogus Col. von Heyden etc. 1906, Col. 231).

Deubeli Ganglb. Kronstadt (Ganglbauer, Käfer von Mitteleuropa, III. Bd. 22).

scydmaenoides Steph. Hátszeg, Hermannstadt (Bielz); Kronstadt (Deubel).

261. *Cepennium* Müller.

(Megalodorus.)

majus Reitter. Kerzer Gebirge (Bielz); Borszék (c. a.).

banaticum Ganglb. Kerzer Gebirge (Glas-Hütte, Büdös, Topánfalva (Erzgebirge), Hermannstadt (c. a.); Bodzauer Gebirge, Nagyhagymás (Egyeskő), Schulergebirge (Deubel)).

Reitteri Brisout (laticolle Reitter). Schiatal, Hermannstadt, Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz); Nagyhagymás (Deubel).

difficile Reitter. Kronstadt (Deubel).

carnicum Reitter (hungaricum Reitter). Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Schanta, Kerzer Gebirge (Ormay); Zalatna, To-

pánfalva (Erzgebirge), Büdös, Alsó-Rákos, Schuler-Gebirge, Schässburg, Rodnaberg (c. a.); Bodzaer Gebirge, (Deubel).

thoracicum Müll. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz).

carpathicum Sauley. Kronstadt (Zinne, Deubel).

minutissimum Aubé. Hermannstadt, Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt (Bielz).

regale Holdhaus. (Annales mus. nat. hung. 1908, VI, 578). Rotenturm (Lautertal und Riu vadului, auch im Altal aus Laub gesiebt, c. a., Deubel).

262. Microtherium Petri.

Annales mus. nat. hung. 1908, VI, 570.

Herr Kustos Csiki hat (Magyarország bogárfaunájánhoz II. köt. 8) den Gattungsnamen Microtherium (Scydmaeniden) in Etelea umgewandelt, weil schon eine Säugetiergattung, Microtherium Meyer 1865, den Namen führt. Schon Kiesenwetter nimmt (Naturgeschichte der Insekten Deutschlands, Annöhüden, p. 199, Ann.) anlässlich der Umtaufung der Gattung Aspidiphorus in Coniporus durch Thomson Stellung gegen dieselbe, indem er die Berechtigung der Umtaufung anzweifelt, nachdem die in Betracht kommenden Genera verschiedenen Ordnungen der Arthropoden (Insecta — Crustacea) angehören. Umso weniger erscheint mir in diesem Falle die Umtaufung berechtigt, nachdem die beiden in Betracht kommenden Genera verschiedenen Tierkreisen angehören (Vertebrata — Arthropoda), und ich behalte daher den ursprünglichen Namen bei, da eine Kollision der Namen ausgeschlossen erscheint.

tenue Petri. Rotenturm (Lauferburg, unter tiefen Blätterlagen Anfang Juni von mir gesammelt, c. a., 1 Exemplar).

Stenichnini.

263. Neuraphes Thomson.

angulatus Müll. Hermannstadt (Bielz); Rotenturm, Schässburg (Siechenhofberg, Südabhang, unter Laub, c. a.).

elongatus Müll. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Malomvitz, Topánfalva (Erzgebirge), Büdös, Schässburg, Rotenturm (c. a.); Porumbacher Geb., Prásbe, Gyögy (Ormay); Kronstadt (Zinne), Rodnaberg (Deubel). (Paraphes.)

coronatus Sahlb. Freeker Gebirge (Serbota), Bucsecs (c. a., aus Laub und Grasbüscheln und gesiebt); Schulergebirge (Deubel).

Deubeli Ganglb. Negoi (Umgebung der Schutzhütte gesiebt, Deubel). (Scydmorephes.)

leptocerus Reitter. Hászeg (c. a.).

Dleneri Csiki. Anal. mus. hung. VIII. 1910, Rotenturm (c. a., ung. Nat. Mus., col. Diener).

gelicus Sauley. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Rotenturm, Gyögy (Ormay); Hászeg (c. a.).

subparallelus Sauley. Kronstadt, Alsó-Rákos (Teppe, Deubel); Schässburg (c. a.).

latitans Sauley. Kronstadt (Bielz); Gyögy Bad, Ormay); Schässburg (c. a.).

Deubel bezweifelt das Vorkommen des Neuraphes latitans in Kronstadt, was vielleicht nicht gerechtfertigt ist, da Reitter als Fundort die „transsylvanischen Alpen“ angibt.

nigrescens Reitter. Schässburg (c. a., vidit Reitter).

264. Stenichnus Thomson.

(Scydmaenus auct.)

(Cyrtoseydmus.)

Godarti Latr. Hermannstadt (Bielz); Schässburg, Szurdok-l'ass, Alsó-Rákos (in alten Eichen bei Lasius brunneus), Rotenturm (c. a.); Hászeg, Kronstadt (Deubel).

scutellaris Müll. Hászeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Rotenturm, Schässburg (Witchberg, aus Laub gesiebt, c. a.); Hászeg, Kronstadt, Rodnaberg (Deubel).

collaris Müll. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Borszék, Schässburg (in alten Eichen bei Lasius brunneus, c. a.); Rodnaberg, Nagyhagymás (Deubel).

pusillus Müll. Schässburg (Breite, in alten Eichen bei Lasius brunneus, c. a.); Kronstadt (Ameisenhaufen, Deubel). (Stenichnus s. str.)

exitis Er. Kerzer Gebirge (Bulea), Schässburg (Breite in alten Eichen bei Lasius brunneus, c. a.); Alsó-Rákos, Kronstadt (Deubel).

265. Eucouinus Thomson.

(Napochus.)

claviger Müll. Hermannstadt, Schässburg (Klossel unter Eichenrinde bei Ameisen, c. a.).

Maecklini Mannh. Götzemberg (Bielz). (Spaniocoonus.)

Wetterhali Gyllh. Hászeg, Hermannstadt, Unter-Kerz (Bielz); Karlsburg, Schässburg (unter Laub und Gras im Frühjahr besonders häufig); Rotenturm (Ormay); S.-Regen, Bistriz (Müller).

nanus Schlaum. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (Fuchsloch, Breite, in alten Eichen bei Lasius brunneus, c. a.). (Euconnus i. sp.)

Motschulskyi Strm. Durch das ganze Gebiet verbreitet in Wäldern unter Laub, Rinde, oft in Gesellschaft von Lasius brunneus).

var. **rufescens** Ganglb. (Kiesenwetteri Reitter). Zusammen mit der Stammform.

denticornis Müll. Hászeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Kerzer Gebirge (Bielz);

Gyögy (Ormay); Karlsburg, Rotenturm, Schässburg (c. a.); Rodnagelgebirge, Kronstadt, Alsó-Rákos (Deubel).
rufilipennis Müll. Kronstadt (Gespreng, an den Wurzeln der Sumpfpflanzen, Deubel).
hirticollis Ill. Hermanns'alt, Unter-Kerz, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg (Fuchsloch aus Laub, Kokelufer aus Geniste gesiebt, c. a.). (Tetramelus.)

transylvanicus Sauley. Durch das ganze Gebiet in Wäldern unter Laub, Rinde, in alten von Ameisen bewohnten Bäumen.

oblongus Sturm. Gross-Scheuern, Neudorf b. H. (Bielz).

Ich habe diese Art nie gesammelt und glaube kaum, dass sie bei uns vorkommt; jedenfalls muss sie neuerdings nachgewiesen werden.

pubicollis Müll. Hátszeg, Hermannstadt (Bielz).

Dasselbe gilt von E. pubicollis Müll., der bei uns durch den E. transylvanicus vertreten zu sein scheint.

styriacus Grim. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Präsbe, Porumbacher Gebirge (Ormay); Balánbánya (Egyeskő), Borszék, Ratosnya, Schulergebirge (c. a.); Rodnagelgebirge, Nagyhagymás (Deubel).

Seydmaenini.

266. Seydmaenus Latreille.

(Seydmaenus s. str.)

tarsatus Müll. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg (in Gärten unter faulenden vegetabilischen Stoffen oft in grosser Zahl, namentlich im ersten Frühjahr, c. a.); Kronstadt (Deubel); Klausenburg (Müller). (Cholerus.)

rufus Müll. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg (im Holze und unter der Rinde alter Eichen und anderer Bäume in Kolonien der Lasius brunneus, c. a.); Kronstadt (Deubel).

Perrisi Reitter. Schässburg (in alten Eichen, wie der vorige, oft mit ihm zusammen, c. a.); Kronstadt (Deubel).

Hellwigi Herbst. Hermannstadt, Holzmen gen, Mediaseh, S.-Regen (Bielz); Rotenturm (Ormay); Előpatak, Schässburg, Alsó-Rákos (wie die beiden vorigen, c. a.); Kronstadt (Deubel).

Cldicini.

267. Leptomastax Pirazzolii.

mehadiensis Friv. Rotenturm (Lautertal und im Tale des Riu vadului in 2 Exemplaren aus Laub gesiebt, einmal Anfang Juni, das zweitemal April, c. a. Deubel).

XI. Silphidae.

Leptoderinae.

Pholeuonini.

268. Pholeuon Hampe.

(Parapholeuon.)

hungaricum Csiki. Lucia-Höhle bei Szabadol (Unterweissenburger Komitat, Ung. Nat. Museum).

Oryotini.

269. Drimeotus Müll.

ormayi Reitter. Bedelő-Höhle bei Szent-György im Erzgebirge (c. a.). Die Tiere krochen auf feuchten Tropfsteinen und Höhlenwänden herum.

Bathyscelini.

270. Bathyscea Schioedte.

Merkli Friv. Malomvitz (Lunka negru unter einem tief eingebetteten Steine, Deubel).

Cholevinae.

271. Choleva Latreille.

spadicea Sturm. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (Fuchsloch aus Laub gesiebt, c. a.).

oblonga Latr. (intermedia Kr.). Hermannstadt (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Marosujvár (Ormay); Schulergelände, Zernest (Deubel).

Sturmii Bris. Rotenturm (c. a.).

elongata Payk. (angustata Sturm). Hermannstadt, Neudorf b. H. (Bielz).

cisteloides Fröhl. Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (c. a.); Bistritz (Müller).

oresistropha Ganglb. Rodnagelgebirge (von Ganglbauer und Deubel auf der höchsten Spitze des Kuhhorn aus abgehackten, dann längere Zeit liegen gelassenen Grasbüscheln gesiebt, c. a.).

272. Nargus Thomson.

velox Spenze. Michelsberg (Bielz); Schässburg (Türkenhill an einem verpilzten Weidenstumpf, Oktober, c. a.); Klausenburg (Müller).

badius Sturm. Zibinsgebirge (Bielz).

Wilkini Spenze. Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm, Csukás, Schässburg (aus Laub gesiebt, c. a.); Hátszeg, Kronstadt (Zinne, Deubel).

brunneus Sturm. Schässburg (aus Laub gesiebt im Klossel, Fuchsloch und Scherkes, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

anisotomoides Spence. Schässburg (Fuchsloch, aus Laub gesiebt, c. a.).

273. *Catopomorphus Aubé.*

(*Attaphilus*,)

arenarius Hampe. Hammersdorf (Bielz). (Soll bei Aphaenogaster structor Latr. leben und zur heissen Mittagszeit um die von ihm bewohnten Erdlöcher schwärmen).

274. *Catops Payk.*

(*Sciodrepa*,)

umbrinus Er. Hermannstadt, Grossscheuern (Bielz); Schässburg (Kälbertritt an einer Hecke aus Laub gesiebt, c. a.); Kronstadt (Deubel).

Walsoni Spence. Hermannstadt, Grossscheuern, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Michelsberg, Kerzer Gebirge (Ormay); Ompolyizatal (Karlsburg), Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(*Lasiocatops*,)

alpinus Gyll. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Malomvitz, Rotenturm (bei einem Hundekadaver, c. a.); Schulergebirge, Zernest (Deubel); Kelemengebirge (Müller).

Reps und Schässburg als Fundorte sind zu streichen.

(*Catops s. str.*)

picipes F. Götzemberg (Bielz); Rotenturm, Csukás, Schässburg (c. a.); Rosenau (Deubel).

fuscus Panz. Hermannstadt, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.).

nigricans Spence. Schässburg (unter Laub), Rotenturm (bei einem Hundekadaver, c. a.); Bucsecs (Valea Jeppi, Deubel).

fuliginosus Er. Schässburg, Rotenturm, Szováta (c. a.); Negoi, Rölnagebirge, Hátszeg (Deubel).

grandicollis Er. Rotenturm, Schässburg (Kälbertritt in Flecken aus Laub gesiebt, c. a.); Bereczk (Ojtos - Pass Melyh).

nigrita Er. (? *affinis* Steph.). Grossscheuern, Kronstadt (Bielz); Malomvitz, Schulergebirge, Csukás, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Michelsberg, Rotenturm (Ormay); Hátszeg (Deubel).

coracinus Kellner. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (Reissel aus Laub gesiebt), Rotenturm, Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel).

morio F. Csukás (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

neglectus Kr. Hátszeg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

chrysomeloides Panz. Kronstadt (Zinne), Honigberg (Deubel).

longulus Kelln. Schulergebirge (an feuchter Stelle unter Gras, c. a.).

tristis Panz. Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Zinne), Nagyhagymás, Schulergebirge (Deubel). var. *ventricosus* Weise. Kerzer Geb. (Bielz); Hermannstadt, Gyögy (Ormay); Kronstadt (c. a.).

275. *Anemadus Reitter.*

strigosus Kr. Hermannstadt, Grossscheuern (Bielz); Baassen (c. a.).

276. *Nemadus Thoms.*

colonoides Kr. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

277. *Ptomaphagus Illig.*

varicornis Rosenh. Hermannstadt (an ausgelegtem Fleischköder gefangen, Ormay); Schässburg, Büdös (aus verpilztem Laube gesiebt, c. a.); Vargyastal, Schulergebirge (Deubel).

subvillosum Goeze (sericeus Panz.). Grossscheuern, Kronstadt, S.-Regen (Bielz). Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.).

sericatus Chaud. Hermannstadt, Schässburg, Baassen (c. a.), aus Laub gesiebt); Kronstadt (Deubel).

278. *Colon Herbst.*

(*Mylocerus*,)

latum Kr. Hermannstadt (Bielz); Rotenturm (Ormay); Borszék, Büdös, Csukás, Schässburg (Witeberg, Fuchsloch aus Laub, Kokelufer aus angeschwemmtem, schimmeligem Detritus gesiebt, c. a.); Bucsecs, Dees, Rodnagelbirge, Nagyhagymás (Deubel).

affine Sturm. Hermannstadt (Bielz); Hammersdorf (c. a.); Kronstadt (Zinne), Bucsecs (subalpin, Deubel).

fuscoleorne Kr. Ratosnya, Schässburg (Fuchsloch, auf einer Wiese am Waldrande gegen Abend gestreift, 30. Juli c. a.); Kronstadt (Schneckenberg, Deubel).

dentipes Sahlb. Königstein (Crepatura, Deubel); Borszék (c. a.). Das Borszéker Exemplar meiner Sammlung ist ganz hellrötlich-gelb mit etwas dunklerem Kopf.

brunneum Latr. Hermannstadt (Bielz); Schulergebirge (Deubel).

denticulatum Kr. Schässburg (Kokelufer unter dem Witeberg, 2 ♂♂ aus Laub gesiebt, 6. August 1910, c. a.).

(*Colon i. sp.*)

fuscum Er. (seripes Ganglb.). Grossscheuern (Bielz); Kronstadt (Zinne), Schulergebirge, Nagyhagymás (Deubel); Borszék (c. a.).

Wir besitzen nur C. fuscum Er., der früher als Synonym zu C. sorripes Sahlb. gehörte. Letzterer ist gegenwärtig Synonym des C. viennense Hbst.

Silphinae.

279. *Necrophorus Fabr.*

germanicus L. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Karlsburg (c. a.); Szamosuvárvár (Ormay).

var. **speciosus** Schulze. Kronstadt (Deubel).
humator Goeze. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

interruptus Steph. Hâtszeg, Hermannstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Kronstadt, Balánbánya (c. a.); Zoodtal (Ormay).

investigator Zett. Präsbe, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).

vespilloides Herbst. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

vespillo L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

vestigator Herschel. Mediasch, Mezőség (Záh), Bielz).

280. *Necrodes Leach.*

litoralis L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Előpatak (c. a.).

281. *Tanatophilus Samouelle.*

sinuatus F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

rugosus L. Ebenso verbreitet wie der vorige.

282. *Oeceptoma Samouelle.*

thoracicum L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

283. *Bittophaga Reitter.*

alpicola Küst. Zibins-Gebirge, Kristest, Sterpu (Dealu negru), Surul, Fogarascher Gebirge, Frecker Geb., Kerzer Gebirge, Bucsecs (Bielz); Retjezat, Parangul, Rodnaberg (c. a.).
(Aclypea.)

undata Müll. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

284. *Xilodrepa Thoms.*

4-punctata Schreber. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet auf Gebüsch, zuweilen unter Laub.

285. *Silpha Linné.*

carinata Herbst. Durch das ganze Gebiet verbreitet, besonders in Gebirgswäldern.

oblonga Küst. Hâtszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mediasch (?), Sächs.-Regen, Klausenburg (Bielz); Hammersdorf, Salzburg (Ormay); Retjezat, Toroczkó, Rodnaberg (c. a.).

obscura L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

orientalis Brull. Bistra, Toroczkó (Erzgebirge), Dees, Bucsecs (c. a.).
granulata Thunbg. (tristis Ill.). Schulergebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

tirolensis Laich.

var. **nigrita** Creutz. Fogarasch, Kronstadt, Tartlau (Bielz).

286. *Ablattaria Reitter.*

laevigata F. Kronstadt, Mediasch, Vásárhely, Klausenburg (Bielz); Hermannstadt, Szamosuvárvár, Tinód (Unterwissenburger Komitat, Ormay); Karlsburg, Baassen (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

287. *Phosphuga Leach.*

atrata L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, auch in den Gebirgswäldern.

a. **brunnea** Herbst. Kronstadt, Tusnád, Rodnaberg, wohl überall, wo die Stammform sich findet.

Agyrtini.

288. *Necrophilus Latr.*

subterraneus Dahl. Präsbe (Bielz); Frecker Gebirge (Ormay); Rodnaberg, Kerzer Gebirge (Bulea, am häufigsten in den Gehäusen von Helix arbustorum und aethiops, c. a.); Bucsecs, Schulergebirge (Deubel).

289. *Agyrtes Fröhl.*

bicolor Lap. Rotenturm (unter Moos an einem Baumstamm, Deubel).

XII. Lioididae.

Lioidnl.

290. *Triarthron Schmidt.*

Maerkeli Schmidt. Kronstadt (Zinne, Deubel).

291. *Hydnobius Schmidt.*

multistriatus Gyll. Rodnaberg, Oberkerz (Glashütte, c. a.); Kronstadt (Schneckenberg, nicht selten, Deubel).

punctatus Sturm. Schässburg (c. a., Türkennhill, an sumpfiger Stelle); Kronstadt (Deubel).

var. **punctatissimus** Steph. Schulergebirge (Deubel).

punctulatus Hampe. Siebenbürgen (Catalogus Coleopt. Europae Heyden 1906. c. 251).

292. *Liodes Latreille.*

- cinnamomea* Panz. Zibinsgebirge, Marosgebirge (Bielz); Schässburg (Fuchsloch aus Laub gesiebt, 13. Juli, c. a.).
- illesiaca* Kr. Rodnagelbirge (c. a.); Schulergebirge (Deubel); Zibinsgeb. (Müller).
- macropus* Rye Kronstadt (Deubel).
- picea* Illig. Rodnagelbirge (c. a.); Bucsecs (Deubel).
- brunnea* Sturm. Schässburg (Schleifengraben, 30. Juli, c. a.); Schulergelbirge (Deubel).
- dubia* Kugel. Kerzergelbirge (Bielz); Schässburg (Witeberg, aus Laub gesiebt, 2. Juli, c. a.); Nagyhagymás, Bucsecs, Schulergelbirge (Deubel).
- a. *blobo* Schmidt. Schässburg (c. a.).
- var. *obesa* Schmidt. Zibinsgebirge (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).
- flavescens* Schmidt. Kronstadt (Zinne). Schulergelbirge (Deubel).
- curta* Fairm. Stolzenburg (Ormay).
- calcarata* Er. Präsb. (Bielz); Borszék, Schässburg (Kokelufer, Weidengebüsch unter Laub, 21. Mai, c. a.); Kronstadt (Deubel).
- var. *picta* Reiche. Kronstadt (Zinne, Deubel).
- ovalis* Schmidt. Balánbánya, Retjezat, Schässburg (15. Juni, c. a.); Zernest (Deubel).
- rugosa* Steph. Kronstadt (Zinne, Deubel).
- Skalitzkyi* Ganglb. Bucsecs, Königstein (Creptatura, Deubel). (Pteromerula.)
- rotundata* Er. Retjezat (c. a.). (Oosphaerula.)
- badia* Sturm. Kerzer Gebirge, Sächs.-Regen (Bielz); Rotenturm (aus Blättern gesiebt, c. a.).
- carpathica* Ganglb. Rodnagelbirge (aus abgehackten und längere Zeit liegen gelassenen Grasbüscheln gesiebt, Ganglbauer, Deubel).
- parvula* Sabl. Schässburg Schleifengraben, aus Laub gesiebt, 30. Juli), Borszék, Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Kronstadt (Deubel).
- navicornis* Bris. Schässburg (Türkenhill, an sumpfiger Stelle, 24. Oktober, c. a.). (Orcosphaerula.)
- nilida* Reitter. Rodnagelbirge alpin, Deubel).

293. *Agaricophagus Schmidt.*

- cephalotes* Schmidt. Kronstadt (Hangstein, Deubel).

294. *Colenis Erichs.*

- immunda* Sturm. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet unter Laub.

295. *Cyrtusa Erichs.*

- Fussi* Seidl. Hermannstadt (Seidlitz); Kronstadt Florisas, Deubel).
- minuta* Ahrens. Marosujvár (Mai, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
- pauxilla* Schmidt. Kronstadt (Zinne, Deubel); Schässburg (29. Juli, Fuchsloch, aus Laub und Moos gesiebt, c. a.).

*Agathidium.*296. *Anisotoma Illig.*

- humeralis* F. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Schanta (Ormay); Schässburg (Breite, Eichenschwämme, c. a.).
- var. *elavipes* Herbst. Rotenturm (c. a.).
- var. *globosa* Payk. Zalatna (c. a.); Hát-szeg, Kronstadt (Zinne, Deubel).
- axillaris* Gyll. Götzenberg, Bükszad, S.-Regen (Bielz); Bistra, Előpatak, Nussbach (c. a.); Kronstadt, Nagyhagymás (Deubel).
- glabra* Kugel. Zibinsgebirge, Kronstadt, Kerzer Gebirge, Hargita (Bielz); Bistra, Előpatak, Ober-Kerz, Schässburg, Rüksszál (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).
- orbicularis* Herbst. Marpod, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Unterkerz, Hát-szeg, Szováta, Büdös, Schässburg (c. a.); Porumbacher Gebirge (Ormay).
- casleana* Herbst. Kerzer Geb., Kronstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Nagyhagymás, Bucsecs (Deubel).
- serricornis* Gyll. Schässburg Breite, alte Eiche, Mai, c. a.).

297. *Amphicyllis Erichs.*

- globus* F. Branischwald b. H., Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Heltau, Gyögy (Ormay); Schässburg, Rotenturm, Büdös, Ratosnya, Rodnagelbirge (c. a.); Nagyhagymás, Hát-szeg (Deubel).
- var. *ferrugineus* Sturm. Kerzer Geb., Gyögy (Ormay); Schässburg, Ober-Kerz (Glas-hütte), Ratosnya, Büdös (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- globifermis* Sabl. Hermannstadt (Ormay); Büdös (c. a.); Hát-szeg (Deubel).

298. *Cystoplastus Reitter.*

- seriepunctatus* Bres. Kronstadt? (Deubel).

299. *Agathidium Illig.*

Die Arten leben an abgestorbenen, verpilzten Baumstämmen und in verpilztem Laub. (Cyphoceble.)

- nigripenne* F. Götzenberg, Kerzer Gebirge (Bielz); Malomvitz (Lunka negru), Schässburg (Atelshill auf Eiche, welche von Lasius brunneus bewohnt war, c. a.); Königstein, Schuler-Gebirge, Bucsecs, Nagyhagymás, Rodnagelbirge (Deubel).

atrum Payk. Holzmengen, Kronstadt, Turtlau, Schässburg, Oláhfalu, Borszék (Bielz); Rotenturm, Csukás, Büdös, Ratosnya, Bükszad, Szováta, Baassen (c. a.); Hátsges (Deubel); Hermannstadt, Heltau (Ormay).

seminulum L. S.-Regen, Borszék (Bielz); Rotenturm, Malomvitz, Bülös, Szováta, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

laevigatum Er. Reps (Bielz); Schässburg, Büdös, Ratosnya (c. a.); Nagyhagymás, Vargyastal, Bucsecs (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

badium Er. Kerzer Gebirge, Sächs.-Regen (Bielz); Bistra, Präszaka (Zalatna), Büdös, Alsó-Rákos, Schässburg, Szováta, Rodnagelbirge, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Schuler-Gebirge, Bucsecs (Deubel); Präsbe, Schanta (Ormay).

(Neoceble.)

banaticum Reitter. Rodnagelbirge, Büdös, Balánbánya, Rotenturm, Bistra (c. a.).

nudum Hampe. Kronstadt, Zernest (Deubel).

marginatum Strm. Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

varians Beck. (*pallidum* Gyll.). Kerzer Gebirge, Präsbe (Ormay); Präszaka (Zalatna), Büdös, Schässburg (c. a.); Alsó-Rákos (Deubel).

rotundatum Gyll. Präsbe, Kerzer Gebirge (Bielz); Balánbánya, Bistra (c. a.); Bucsecs, Schulergelbirge (Deubel).

bescidicium Reitter. Frecker Gebirge (Serbota, c. a., 1 Exemplar, das sich tatsächlich nur durch die helle, rötlich-gelbe Färbung von A. rotundatum Gyll. zu unterscheiden scheint; die Absonderung des Clypeus ist auch wahrnehmbar, zwar fein, aber ebenso sichtbar, wie bei manchen Exemplaren des A. rotundatum).

mandibulare Strm. Schielthal, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Csukás, Rotenturm, Büdös, Schässburg (c. a.); Bucsecs (subalpin, Deubel).

confusum Bris. Büdös, Schuler-Gebirge (c. a.).

polonicum Wank. (*piceum* Bielz teste Seidlitz). Hátsges (Bielz).

Nach Seidlitz (F. trans. 316) soll das von Bielz angeführte A. *piceum* Er. gleich A. *polonicum* Wank. sein. Nachdem jedoch A. *polonicum* Wank. nach dem Kataloge (*Catalogus col. Europae etc.* 1906, c. 254) gleich A. *piceum* Thoms. nec Erichs. ist, so wäre A. *piceum* Er. aus unserer Fauna zu streichen. Uebrigens ist im Kataloge anstatt A. *piceum* Thoms. zu setzen A. *polonicum* Wank. da der Name *piceum* bereits von Erichson vergeben ist.

plagiatum Gyll. Präsbe, Kerzer Gebirge (Bielz); Csukás (c. a.); Bodzaer Gebirge, Rodnagelbirge (Deubel).

(Saccoceble.)

nigrinum Sturm. Schässburg (1 Exemplar, c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

Deubel teilt mir mit, dass sein von Nagyhagymás stammendes Exemplar von Dr. Krauss mit Bestimmtheit als A. *nigrinum* Strm., von Dr. Holdhaus jedoch als A. *rhinozeros* Sharp. determiniert worden sei.

discoideum Er. Michelsberg, Kerzer Geb. (Bielz); Csukás (c. a.); Bucsecs (subalpin, Deubel).

XIII. Clambidae.

300. Calyptomerus Redtenb.

alpestris Redtenb. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (Breite, April, c. a.); Bucsecs, Schuler-Gebirge, Rodnagelbirge (Deubel).

dubius Marsh. Hátsges (1 Ex., c. a.).

301. Clambus Fischer.

Die Arten werden aus verwesenden Pflanzenstoffen; Laub gesiebt.

minutus Strm. Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Vargyastal, Rodnagelbirge (Deubel).

punctulum Beck. Schässburg (Kokelufer, Hattertgraben), Rodnagelbirge (c. a.); Hátsges (Deubel).

armadillo Deg. (*atomarius* Sturm). Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (Atelhill, Kokelufer), Rotenturm (c. a.).

pubescens Redtenb. Rotenturm (Altufer, Bielz); Schässburg (20. Februar in grösserer Anzahl aus verwesenden Pflanzenstoffen im Hausgarten gesiebt, c. a.).

XIV. Leptinidae.

302. Leptinus Müll.

testaceus Müll. Klausenburg, Schässburg (am Fnsse alter Eichen, wahrscheinlich in den Gängen der Haselmaus); Königstein (Ru-Schlucht, unter einem Stein, unter welchem sich ein Mausnest befand, Deubel).

XV. Corylophidae.

303. Sacium Leconte.

pusillum Gyllh. Kerzer Gebirge (Bielz).

brunneum Bris. Kerzer Gebirge (Bielz); Hátsges, Rotenturm, Schässburg (unter verwesenden Pflanzenstoffen, c. a.).

304. Arthrolips Wollaston.

obscurus Salib. Előpatak, Rotenturm (Ormay, im Mulf eines Buchenstumpfes); Előpatak (1 ♀, bei welchem die zwei letzten und die Hälfte des drittletzten Abdominalsegmentes vorragen unter den Flügeldecken, wodurch das Tier an gewisse Nitulinen erinnert).
piceus Comolli. Siebenbürgen (nach Seidlitz von Reitter aus Laub gesiebt).

305. Sericoderus Steph.

lateralis Gyll. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Kronstadt, Tartlau (Deubel); Schässburg, Rotenturm (c. a.).
Revelli Reitter. Schässburg, Rotenturm, Hätzeg (c. a.).

306. Corylophus Stephens.

cassiodoides Marsh. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg (Kokelufer im angeschwemnten Geniste, c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

307. Orthopernus Stephens.

punctatus Wankow. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne), Alsó-Rákos (Deubel).
punctulatus Reitter. Kerzer Gebirge (Bielz); Büdös, Hätzeg, Schässburg (Atelshill, Kokelufer in angeschwemntem Geniste, c. a.); Honigberg (Altufser, Deubel).
brunnipes Gyll. Hermannstadt (Bielz); Alsó-Rákos, Schässburg (in morschen Lindenholz, Fuchsloch und Breite in Eichenmulm, 15. April, c. a.).
atomus Gyll. Baassen, Schässburg (Atelshill, Kokelufer, 13. Mai, c. a.); Honigberg (Altufser, Deubel).
anxius Rey. Hermannstadt (Bielz).

XVI. Sphaeriidae.

308. Sphaerlas Waltl.

acaroides Waltl. Schässburg (Atelshill, Kokelufer im Geniste, 3. November), Unter-Kerz (Klosterteich, ein Pärchen aus Grashüscheln in Copula gesiebt, 10. August, c. a.).

XVII. Trichopterygidae.

Diese kleinen Käfer leben in verwesenden Tier- und Pflanzenstoffen, schwärmen aber bei Sonnenuntergang und können auch im Fluge gefangen werden.

Ptenidini.

309. Nossidium Erichs.

pitosellum Marsh. Hermannstadt, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Schässburg (aus Eichenmulm gesiebt, c. a.); Kronstadt (Deubel).

310. Ptenidium Erichs.

(Gressnerium.)
Gressneri Er. Kerzer Gebirge (Bielz).
 (Matthewsium.)
turgidum Thoms. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Rodnagelbirge, Schässburg (Nester der Formica rufa, c. a.).
myrmecophilum Motsch. Toroczkó (Erzgebirge), Baassen, Schässburg (in morschem, von Lasius brunneus bewohntem Lindenholz, c. a.); Kronstadt (Deubel).
pusillum Gyll. (evanescens Marsh.). Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Gross-Scheuern, S.-Regen (Bielz); Marosuvár, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Rodnagelbirge (Deubel).
Reitteri Flach. Schässburg (Kokelufer, aus Geniste gesiebt, 3. November, c. a.).
nitidum Heer. Schässburg (c. a.); Tartlau (Deubel).

Ptilini.

311. Euryptilium Matthews.

marginatum Aub. Unter-Kerz (c. a.).

312. Ptiliolum Flach.

Kunzei Heer. Fogarasch, Kronstadt (Bielz).
fuscum Er. Schässburg (Bielz).

313. Ptilium Erichs.

(Millidium.)
minutissimum Web. Hermannstadt (Bielz).

Ptinellini.

314. Ptinella Motsch.

(Neuglenes Thoms.)

aptera Guer. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz).
tenella Er. Schässburg (Breite, aus dem morschen Holze und der Rinde eines Eichenstumpfes gesiebt, c. a.).
 var. **bi impressa** Reitter. Schässburg (zusammen mit der Stammform, c. a.).

315. Pteryx Matthews (Aderces Thoms.)

suturalis Heer. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Frecker Gebirge (Sorbota), Baassen, Karlsburg, Hätzeg, Schässburg (Kokelufer aus Geniste im November, Witeberg im März, Siechhofberg im Mai aus Laub gesiebt, c. a.).

Trichopterygini.

316. Nephanes Thomson.

Titan Newm. Büdös, Csukás, Unter-Kerz, Schässburg (Oktober, aus morschem Holze alter Eichen gesiebt, c. a.).

317. Trichopteryx Kirby.

(Ctenopteryx.)

- grandicollis** Mannh. Schässburg (Fuchsloch, 18. Mai, c. a.).
Montandoni Allib. Hermannstadt (Bielz); Rodnagebirge (c. a.).
(Trichopteryx i. sp.)
thoracica Waltl. Unter-Kerz, Rodnagebirge (c. a.).
atomaria Dey. Hermannstadt, Kronstadt, Oláhfalu, S.-Regen (Bielz); Schanta, Kerzer Gelirge (Ormay); Schässburg, Bistra, Rotenturm (c. a.).
intermedia Gillm. Rodnagebirge, Schulergebirge, Schässburg (Sieghofberg, 18. Februar aus Laub gesiebt, c. a.).
fascicularis Herbst. Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).
suffocata Hallid. Rodnagebirge (c. a.).
brevipennis Er. (longicornis Matth., pumila Er.). Harbachufer, S.-Regen, Kronstadt, Tartlau (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Michelsberg (Ormay); Schässburg (Kokelufer, aus Geniste gesiebt, 3. November, c. a.).
sericans Heer. Schässburg (Atelshill aus Laub, Garten, aus verwesenden Pflanzen in grosser Anzahl gesiebt, c. a.).
dispar Matth. Kronstadt (Gespreng, Deubel).

XVIII. Scaphidiidae.

Die Arten leben vorwiegend auf Baumpilzen.

Scaphidiini.

318. Scaphium Kirby.

- immaculatum** Oliv. Präsbe (Bielz); Kerzer Gebirge (Ormay).

319. Scaphidium.

- 4-maculatum** Oliv. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

Scaphisomini.

320. Scaphisoma Leach.

- agaricinum** L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

- subalpinum** Reitter. Kronstadt (Bielz); Zalatna, Schässburg (c. a.); Kerzer Gelirge, Zoodgeb. (Ormay); Kelemen Gebirge (Müller).

- assimile** Er. Retjczat, Kerzer Geb. (Bielz); Unter-Kerz, Schässburg (c. a.).

- boleti** Panz. Kronstadt (Bielz); Büdös (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Vargyastal (Deubel); S.-Regen (Müller).

(Caryoscapha.)

- limbatum** Er. Hâtszeg, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Ober-Kerz (Glassbüttel), Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Schanta (Ormay).

XIX. Histeridae.

Holopletini.

321. Holopleta Payk.

- plana** Sulz. Zibins-Gebirge, Kronstadt (Bielz); Marosujvár (unter der Rinde einer abgesforbenen Espe in grosser Anzahl, Mai, c. a.); Bodola (unter Pappelrinde, Deubel).

322. Platysoma Leach.

- frontale** Payk. Hâtszeg, Gross-Scheuern, Fogarascher Gelirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Borszék, S.-Regen, Borgoer Pass (Bielz); Schässburg (in morschem Eichenholz, Bükszad (c. a.).
compressum Herbst. Durch das ganze Gebiet verbreitet, unter Baumrinden.

323. Cylistosoma Levis.

- oblongum** F. Talmatschel (Bielz).
angustatum Hoffm. Borszék, Borgoer Pass (Bielz).

324. Hister Linné.

Die Arten leben auf verwesenden tierischen und pflanzlichen Stoffen, einige in Ameisennestern. (Heterognathus.)

- inaequalis** Oliv. Hermannstadt, Kronstadt?, S.-Regen (Bielz); Előpatak (Ormay); Szunyokszék, Karlsburg (c. a.).
 Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser Art in Kronstadt.

- 4-maculatus** L. Hâtszeg, Déva, Gross-Scheuern, Kronstadt, Hosszufalu, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Nagyenyed, Nagylak, Tinód, Magyar-forró (Unterwissenburger Komitat, Ormay); Marosujvár (c. a.).

- helluo** Truqui. Zood (Bielz); Hâtszeg (Deubel).

- unicolor** L. Hermannstadt, Neudorf bei H., Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Szunyokszék (c. a.); Kerzer Gebirge (Ormay).

- cadaverinus** Hoffm. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

- striola** Sahlb. (succicola Thoms.). Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (Noa), Bereczk (Méhely).

- terricola** Germ. Hermannstadt, Dees (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

- stercorarius** Hoffm. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

- bipustulatus** Schrank. (fimetarius Herbst). Hammersdorf, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel).

- purpurascens** Herbst. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

- ruticornis** Grimm. Bályányos bei Torja (Méhely); Kronstadt (Deubel).

marginalis Er. Hâtszeg, Gross - Scheuern (Bielz).

neglectus Germ. Hâtszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Meiasch, Schässburg (Bielz); Karlsburg, Klausenburg (c. a.).

ventralis Marsh. Hâtszeg (Bielz); Rosenuau (Deubel).

carbonarius Hoffm. Hâtszeg, Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Bükszál (Bielz), Klausenburg, Karlsburg, Schässburg (c. a.); Nagyenyel, Szamosujvár (Ormay).

quadrinotatus Scriba. Hâtszeg, Neudorf b. H., Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Klausenburg, Schässburg, Nicler-Eidisch (c. a.).

sinuatus Illig. Dusch (Zibinsgebirge), Hermannstadt, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Szamosujvár (Ormay).

sepulchralis Er. Stolzenburg (Zakelsberg, Ormay); Schässburg (c. a.).

funestus Er. Hermannstadt, Stolzenburg (Zakelsberg, Ormay); Krizba (Burzenland Mélhely).

bisexstriatus F. Unter-Kerz, Sächs.-Regen (Bielz); Kronstadt (c. a.); Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay) (Atholus.)

12 - striatus Schrank. Hermannstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

var. **14-striatus** Gyll. Schässburg (c. a.).

bimaculatus L. Hâtszeg, Marktschelken, Tartlau, Schässburg, S.-Regen, Dees, Mezőség (Záh, Bielz); Kronstadt (Deubel).

corvinus Germ. Hâtszeg, Hermannstadt, Gross - Scheuern, Kastenholz, Marpod, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Karlsburg, Klausenburg (c. a.).

325. Epierus Erichs.

Lebt unter Baumrinde.

italicus Payk. Rotenturm (Ormay)

326. Dendrophilus Leach.

punctatus Herbst. Hermannstadt, Schässburg (Bielz); Hâtszeg, Marosujvár (in alten Eichen bei Ameisen, c. a.); Kronstadt (Deubel); Brad (Ormay).

pygmaeus L. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg, Alsó - Rákos, Szurduk-Pass (c. a., in den Nester der Formica rufa); Kronstadt (Deubel).

327. Paromalus Erichs.

Die Arten leben unter Baumrinden.

complanatus Panz. Hâtszeg (Bielz).

parallelepipedus Herbst. Gross - Scheuern, Talmesch, S.-Regen, Borgoer Pass (Bielz); Kronstadt (c. a.); Nagyhagy-más (Deubel); Kerzer Geb. (Ormay).

Havicornis Ilbst. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, namentlich unter Eichenrinde.

Hetaerini.

328. Hetaerius Erichs.

terrugineus Ol. Hâtszeg (Bielz); Schässburg (aus dem Neste der Formica rufa gesiebt, c. a.); Honigberg (Deubel); Ratosnya (bei Ameisen, Müller).

Saprinini.

329. Gnathoncus Duval.

rotundatus Kugel. Hâtszeg, Hermannstadt, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Bielz); Kronstadt (Deubel).

punctatus Thoms. Klausenburg (c. a.).

330. Saprinus Erichs.

semipunctatus F. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz).

concininus Motsch. Hermannstadt (Ormay, an Fleischköder).

semistriatus Scriba (mitidus F.). Durch das

ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

politus Brahm (specularis Latr.). Hâtszeg (Bielz).

aeneus F. Hâtszeg, Talmesch, S.-Regen (Bielz); Marosujvár, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

var. **immundus** Gyll. Hermannstadt, Fogarasch (Bielz); Kronstadt (Deubel).

sparsutus Salsky. Schässburg (c. a.).

rufipes Payk. Hermannstadt (Bielz).

conjungens Payk. Hâtszeg, Hermannstadt, Poplaka, Reps, Marienburg b. Kr., Kroustadt, Mediasch (Bielz); Karlsburg (c. a.).

rugiceps Duft. (quadristriatus Hoffm.). Szakálat (Altufer, Bielz); Schässburg (c. a.).

rugifrons Payk. Talmesch (Bielz); Rotenturm (c. a.).

Abrnelni.

331. Teretrius Erichs.

picipes F. Dobra, Gross-Scheuern (Bielz); Malomvitz (c. a.); Dees, Alsó-Rákos (unter Weidenrinde, Deubel); Sächs.-Regen (Müller).

332. Plegaderus Erichs.

Die Arten leben unter Baumrinden.

vulneratus Panz. Törzburger Pass, Börger Pass (Bielz); Borszék (Bielz, c. a., unter Fichtenrinde), Schulergelände (Deubel).

caesus Herbst. Dobra, Hermannstadt, Kastenholz (Bielz); Baassen, Szováta, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

dissectus Er. Hâtszeg, Fogarasch (Bielz); Schässburg (Eiche, Breite), Alsó-Rákos (c. a.); Kronstadt (Deubel).

333. *Onthophilus* Leach.

striatus Forster. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz).

334. *Abraeus* Leach.

Die Arten leben unter Baumrinden und in altem morschem Holz.

globulus Creutz. Kerzer Gebirge, Marktschelken, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel).

Zopphae. Siebenbürgen.

parvulus Aub. Schässburg (in alten Eichen, c. a.).

granulum Er. (punctatissimum Reitter). Kerzer Gebirge (Bielz); Rosenauer Gebirge, Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Hászeg, Kronstadt (Deubel).

globosus Hoffm. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Rotenturm, Szováta (c. a.).

335. *Acritus* Leconte.

Die Arten leben wie die der vorigen Gattung.

minutus Herbst. Hászeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kastenholz, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Elő-patak (c. a.); Kronstadt (Deubel).

homoeopaliticus Woll. (rhenanus Fuss.). Kerzer Gebirge (Bielz).

nigricornis Hoffm. (seminulum Küst.). Hászeg, Hermannstadt, Kerzer Gebirge Kronstadt (Deubel); Schässburg (Garten, 1. März, in vorjährigen Krautstrünken, c. a.).

var. *microscopicus* Reitter. Kerzer Geb. (Bielz).

Palpicornia.

XX. *Hydrophilidae*. Helophorinae.

336. *Helephorus* Fabr.

(Empleurus.)

nubilus F. Hászeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Holzmengen, Girelsau, Mediasch, Reps, S.-Regen, Dees (Bielz); Karlsburg, Frecker Gebirge (Serbota), Unter-Kerz, Baassen, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(Trichelophorus.)

micans Falz. Déva, Deesakna (c. a.).

(Megalelophorus.)

aquaticus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. *aequalis* Thoms. Schässburg, Kronstadt (c. a.).

(Atractelophorus.)

avernicus Muls. Kerzer Gebirge (Lakuz, Bielz).

Wahrscheinlich ist *H. avernicus* Muls. des Bielz'schen Verzeichnisses nichts anderes als *A. brevitalris* Kuw., da ich letzteren auf dem Frecker

Gebirge und auch im Kerzer Gebirge in grösserer Anzahl sammelte, während Bielz denselben nicht anführt, wohl weil er den Käfer noch nicht kannte. Wahrscheinlich kommt *H. avernicus* Muls. bei uns nicht vor.

brevitarsis Kuw. (Deubeli Krauss.). Paringul (Vurfu Mandru), Frecker Geb. (Serbota), Kerzer Gebirge (Vunetoare, aus Grasbüscheln gesiebt), Rodnagbirge (c. a.); Hászeg Geb. (Deubel). *glacialis* Villa. Zihinsjäser, Präsbe (Bielz); Negoi (Ormay); Hászeg Geb. (alpin, Deubel); Pietrosul (Müller).

confrater Kuw. Transsylvanische Alpen (südliche Gebirgskette, Ganglbauer); Nagyhagymás (Deubel); Präsbe (Deubel, c. a.).

brevipalpis Bed. Héviz, Topánfalva (Erzgebirge), Baassen, Schässburg, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. *montenegrinus* Kuw. Baassen, Alsó-Rákos (c. a.); Kronstadt (Altfluss, Gespreng, Deubel).

(Helophorus s. str.)

affinis Marsh. Héviz, Baassen (c. a.).

griscus Herbst. Hászeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Alsó-Rákos (c. a.).

granularis L. Hermannstadt, Neudorf bei H., Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Sächs.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Schässburg, Halvelagen b. Sch., Topánfalva (Erzgebirge), Klausenburg, Karlsburg, Unter-Kerz (c. a.).

viridicollis Steph. (aeneipennis Thoms.). S.-Regen (Bielz).

Zopphae Ganglb. Mezőség (Ganglbauer).

quadrisignatus Bach. Oláhfalu, Schässburg, Baassen, Unter-Kerz (c. a.).

pumilio Er. Hermannstadt (Bielz); Brenndorf (Altufer beim Priesterhügel, Deubel).

nanus Sturm. Hászeg, Hermannstadt (Bielz).

337. *Hydrochus* Leach.

elongatus Schaller. Hermannstadt, Nussbach, Schässburg (Bielz); Halvelagen b. Sch., Kronstadt (c. a.); Mezőség (Müller).

carinatus Germ. Dobra (Bielz); Kronstadt (c. a.); Várhegy (Deubel).

brevis Herbst. Dobra, Hermannstadt (Bielz); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

angustatus Germ. Dobra (Bielz); Kronstadt (Gespreng), Honigberg (Altufer, Deubel).

338. *Ochthebius* Leach.

(Hemicerus.)

exsculptus Germ. Hászeg (Bielz); Csukás, Szurduk-Pass (c. a.); Vargyas-Fluss (Deubel).

gibbosus Germ. Hászeg (Bielz).

(*Aulacochthebius.*)

exaratus Muls. Klausenburg, Szamosfalva, Bielz).

narrentinus Reitter. Schässburg (Atelishill, Kokelufer an einer sumpfigen Stelle im Geniste, c. a.).

(*Homalochthebius.*)

impressus Marsh. Déva, Sabenieza (S.-Regen), Klausenburg (Szamosfalva), Mezőség (Záh, Bielz); Alsó-Rákos (c. a.); Kronstadt (Gespreng), Honigberg (Altfluss, Deubel).

(*Bethochius.*)

punctatus Steph. Déva, Salzburg b. H., Torda, Szamosfalva (Bielz).

(*Hymenodes.*)

foveolatus Germ. Hátszeg, Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

eaudatus Friv. Baassen, Szováta (im Schlamm der salzigen Quellen zahlreich, c. a.).

(*Ochthebius i. sp.*)

pusillus Steph. Salzburg, Sabenieza (S.-Regen, Bielz); Halvelagen bei Sch., Baassen (in Süßwasserlümppeln oberhalb des Bades, c. a.).

marinus Payk. Déva, Salzburg, Sabenieza (S.-Regen, Bielz).

339. *Hydraena Kugelann.*

(*Hydraena i. sp.*)

riparia Kug. Hermannstadt (Bielz); Retjezat (c. a.); Kronstadt, Krizba (Deubel).

morio Kiesenw. Siebenbürgen (Ganglb.).

nigrila Germ. Bükszad, Alsó-Rákos (c. a.); Krizba, Vargyasfluss (Deubel).

(*Haenya.*)

graeilis Germ. Hermannstadt (Bielz), Borszék, Alsó-Rákos, Csukás (c. a.); Kronstadt, Krizba, Deubel).

(*Hadrenya.*)

atricapilla Waterh. Krizba (Deubel).

pygmaea Waterh. Csukás, Borszék (c. a.).

Spercheinae.

340. *Sperchens Kugelann.*

emarginatus Sehall. Dobra, Salzburg, Hermannstadt, Fogarasch, Nussbach, Bozauer Pass (Bielz); Schässburg, Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

Hydrophilinae.

Berosini.

341. *Berosus Leach.*

(*Enoplurus.*)

spinosus Stev. Déva, Salzburg, Neudorf b. H., Schässburg, Kolos, Sabenieza (S.-Regen, Bielz); Hermannstadt (Ormay); Nieder-Eidisch (c. a.).

(*Berosus i. sp.*)

signaticollis Charp. Déva, Hermannstadt, S.-Regen, Mezőség (Gyek, Bielz); Halvelagen b. Sch. (c. a.); Kronstadt (Deubel).

turidus L. Hátszeg, Hermannstadt, Mezőség (Gyek, Bielz); Szamosujvár (Ormay); Nussbach (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Hydrophilini.

342. *Hydrous Dahl.*

piceus L. Hermannstadt, Kerz, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Gyek, Bielz); Tinód (Unterweissenburger K., Ormay).

aterrimus Esch. Hermannstadt, Neudorf, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg (Bielz); Karlsburg (c. a.); Mező-Bánd (Maros-Torda), Tinód (Ormay).

343. *Hydrophilus Degeer.*

caraboides L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. *smaragdinus* Bach. Déva, Hermannstadt (Bielz); Brenndorf (Priesterhügel u. Altufer, Deubel).

flavipes Stev. Salzburg b. H., Hermannstadt, Girelsau, Fogarasch, Krisba, S.-Regen (Bielz); Miriszlo (Ormay); Schässburg, Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Hydrobilini.

344. *Limoxenus Rey.*

oblongus Herbst. Klausenburg (Bielz); Marosujvár (c. a.); Szamosujvár (Ormay).

345. *Hydroblus Leach.*

fuscipes L. In Tümpeln durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

Es ist wahrscheinlich, dass die Stammform bei uns gar nicht vorkommt, sondern nur die Varietäten.

var. *Rotenbergi* Gehrhardt. Schässburg, Előbatak (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

var. *subrotundatus* Steph. Kronstadt (Gespreng, Deubel).

346. *Anacaena Thomson.*

(*Creniphilus Thomson.*)

globula Payk. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Unter-Kerz, Mezőség (Záh, Bielz); Schässburg (Kokelufer, c. a.); Maaren (Ormay).

limbata Fr. Hátszeg, Reps, Schässburg (Bielz); Hermannstadt, Maaren (Or-

may); Baassen (in Süsswassertümpeln, auch an feuchten Stellen unter Laub, c. a.); Kronstadt (Deubel).

347. Paracymus Thomson.

aeneus Germ. Szamosfalva, Déva (Bielz, c. a.); Gross-Scheuern (Bielz).

348. Philydrus Solier.

Die Arten leben teils im Süss-, teils im Salzwasser. (Enochrus.)

melanocephalus Ol. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., S.-Regen, Sabenica, Mezőség (Záh, Bielz); Stolzenburg (Zakelsberg), Maaren (Ormay). (Methydrus.)

minutus F. (affinis Thunbg.). Halvelagen b. Sch. (c. a.); Hermannstadt, Maaren (Ormay); Kronstadt (Deubel). (Philydrus i. sp.)

frontalis Er. Hermannstadt (Bielz); Kronstadt (c. a.).

fuscipennis Thoms. Kronstadt. Schässburg (c. a.).

4-punctatus Herbst. Halvelagen b. Schässburg, Baassen, Klausenburg, Malomvitz (c. a.); Kronstadt (Deubel).

bicolor F. (grisescens Gyll., maritimus Thoms.). Déva, Torda, Nieder-Eidisch, Baassen (c. a.).

testaceus F. Déva, Salzburg, Gross-Scheuern, Fogarasch, Persány, Gross-Schenk, Sächs.-Regen, Mezőség (Záh, Gyéke), Schässburg (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár, Maaren (Ormay); Kronstadt (Deubel).

349. Helochares Muls.

griseus F. (lividus Steph. nec Forster). Salzburg, Hermannstadt, Fogarasch, Nussbach, Schässburg (Bielz); Maaren, Kákova (Ormay); Alsó-Rákos, Klausenburg, Halvelagen b. Sch. (c. a.); Kronstadt (Deubel).

350. Cymbiodyta Bedel.

marginella F. Déva, Hermannstadt (Bielz); Brenndorf (Tümpel am Altfluss, Deubel).

351. Lacobius Erichs.

minutus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

nigriceps Thoms. Héviz, Kronstadt, Unter-Kerz, Baassen, Torda, Klausenburg, Deesakna (c. a.).

sinuatus Motsch. Unter-Kerz, Schässburg (Kokelufer unter Geniste, c. a.).

seculellaris Motsch. (atratus Rottenb.). Salzburg b. H. (Ormay); Ilvamika (Naszód); Rotenturm, Balánbánya (c. a.); Nagy-hagymás (Öcsém, Deubel).

alutaceus Thoms. Baassen (Salzquelle, c. a.).

var. *laevicollis* Ganglb. Baassen (c. a.).
gracilis Motsch. Schässburg (Kokelufer unter Geniste), Héviz, Unter-Kerz (c. a.).

Chaetarthriini.

352. Chaetarthria Steph.

seminulum Hbst. Hermannstadt (Bielz); Unter-Kerz, Balánbánya, Schässburg, Halvelagen b. Sch., Tordae Schlucht (an sumpfigen Orten unter Moos und Pflanzenmoder, c. a.); Vargyas-Fluss (Deubel).

Llmnebiini.

353. Limnebius Leach.

Die Arten leben in Tümpeln.

(*Limnebius* i. sp.)
iruncatellus Thunbg. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Schässburg, Mezőség (Záh, Bielz); Kákova (Ormay).

papposus Muls. Maaren (Ormay); Honigberg (Altufer), Kronstadt (Giespreng, Deubel).

truncatus Thoms. Schässburg (c. a.).
crinifer Rey. Schässburg, Baassen, Alsó-Rákos (c. a.); Honigberg (Altufer, Deubel).

stagnalis Quilleb. Unter-Kerz, Schässburg (c. a.).

? *nitidus* Marsh. Unter-Kerz (c. a.).

alula Bedel. Kronstadt (Gespreng, Deubel). (*Bolimnius*.)

picinus Marsh. Hermannstadt (Bielz); Halvelagen (c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

Sphaeriidiinae.

354. Coelostoma Brullé

orbiculare F. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Gross-Schenk, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Ilvamika, Naszód, Rodnagelbirge, Retjezat, Déva (an feuchten Orten unter Moos, Laub, Geniste, c. a.); Nagy-enyed, Szamosujvár, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt (Deubel).

355. Sphaeridium Fabr.

Die Arten leben im Dünger.

scarabaeoides L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

var. *lunatum* F. Hermannstadt (Ormay); Baróth (Méhely); Königstein (Crepatura, Deubel).

bipustulatum F. Im ganzen Berg- und Hügelland verbreitet.

var. *marginatum* F. Schässburg, Marosuvjár (c. a.), Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Gesprenz). Krizba, Ober-Komana, Sósmező (Méhely).
var. *substriatum* Falz. (semistriatum Lap.). Oláhfalu (c. a.).

356. *Cercyon Leach.*

Die Arten leben in verwesenden Pflanzen- und Tierstoffen, werden aber oft auch im Fluge gefangen.

(*Cyclostocercyon*.)

ustulatus Preyssl. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Schässburg, Baassen, Oláhfalu (c. a.).

(*Cercyon* i. sp.)

lugutris Oliv. (obsoletus Gyll.). Mühlbach, Hermannstadt, Fogarasch (Bielz). Kerzer Gebirge, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

impressus Sturm. Bistra, Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagebirge (c. a.); Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Ormay); Schulergebirge, Bucecs, Nagyhagymás (Deubel).

haemorrhoidalis F. (flavipes F.). Hermannstadt, Hammersdorf, Neudorf b. II., Götzemberg, Fogarasch, Kronstadt, Oláhfalu, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Szováta, Naszód, Borszék (c. a.); Michelsherg, Kerzer Gebirge, Remete (Nagyenyed), Kakova (Ormay).

var. *erythropterus* Muls. Schässburg, Hermannstadt. Szunyokszék (Kronstadt, c. a.).

melanocephalus L. Hermannstadt, Neudorf b. II., Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch (Bielz); Remete (Nagyenyed), Gyögy (Ormay); Bucecs (Deubel).

marinus Thoms. Präsbe (Bielz).

lateralis Marsh. Tartlau, Schässburg (Bielz); Kerzer Gebirge (Bulea). Előpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel).

unipunctatus L. Hermannstadt, Fogarasch, Előpatak, Schässburg, Csáki-Gorbo (Bielz); Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

quisquilius L. Hermannstadt, Neudorf bei II., Unter-Kerz, Fogarasch (Bielz); Klausenburg (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

terminalis Marsh. Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

pygmaeus Illig. Tartlau, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Krizba (Méhely); Kronstadt, Vargyastal (Deubel); Schässburg (c. a.).

var. *merdarius* Sturm. Schässburg Fuchsloch, in Dung, c. a.).

nigriceps Marsh. Hermannstadt (Bielz); Schässburg, Malomvitz (c. a.).

trispilis Illig. Hermannstadt (Bielz); Hátszeg (Deubel').

granarius Er. Schässburg (c. a.); Rotenturm, Schanta (Ormay); Kronstadt (Gesprenz, Deubel).

(*Paracercyon*.)

flavipes Thunbg. (analis Payk.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Unter-Kerz, Kronstadt, Tartlau, S.-Regen, Mezőség (Záh), Schässburg unter verwesenden Pflanzen in Gärten im Frühjahr häufig, Bielz); Präsbe, Gyögy (Ormay).

357. *Megasternini Muls.*

boletophagum Marsh. Rohagebirge, Oláhfalu, Frecker Gebirge (Serbota), Rotenturm, Retjezat, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).

358. *Cryptopleurum Muls.*

In Dünger und verwesenden Pflanzenstoffen.

minutum F. (atomarium Oliv.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

crenatum Panz. Schässburg (Fuchsloch, c. a.).

Cantharoidea.

XXI. *Cantharidae.*

Homalisini.

359. *Homalisus Geoffroy.*

Auf blühenden Pflanzen; namentlich Schirmblüten, auch in morschem Holze.

sonlisbellaquei Geoffr. (suturalis Oliv.). Hátszeg, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Marosgab. (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Schässburg (c. a.); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Hermannstadt (Albrecht); Bistritz Müller).

Lycini.

360. *Dictyopterus Lalreille.*

Auf blühenden Pflanzen.

Aurora Herbst. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Bucecs (c. a.); Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

rubens Gyll. Gross-Scheuern, Kronstadt (Bielz); Rotenturm (Ormay); Schässburg (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

361. *Pyropterus Muls.*

Auf blühenden Pflanzen.

affinis Payk. Bistra, Rodnagebirge, Schässburg (Fuchsloch, 18. Juni, c. a.); Rodnagebirge (Deubel); Székács (Kovásznaer Gebirge, Méhely).

362. *Platyels Thomson.*

Cosnardi Chevr. Zibinsgebirge (Bielz); Rodna Gebirge (Deubel); Hermannstadt (Müller).

minuta F. Surul, Borszék (Bielz); Bistra (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

363. *Lygistopterus Muls.*

sanguineus L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

Lampyridini.

364. *Lampyris Geoffr.*

noctiluca L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

365. *Phausis Leconte.*

(*Lamprorhiza* Motsch.)

splendidula L. Heltau, Girelsau, Kronstadt (Bielz); Rodnagebirge (Deubel).

Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser Art in Kronstadt, jedoch wohl mit Unrecht.

366. *Phophaenus Laporte.*

Unter Laub und in morschem Holz in Laubwäldern.

hemipterus Goeze. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Vargyastal, Honigberg (Altüfer, Deubel).

367. *Luciola Laporte.*

mingrellica Men. Hâtszeg, Kronstadt (Bielz).

Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser Art in Kronstadt.

Cantharini.

368. *Podabrus Westwood.*

alpinus Payk. Zibins-Gebirge, Kronstadt (Bielz); Balánbánya, Schulergbirge, Frecker Gebirge (Serbota), Retjezat, Schässburg, Borszék (c. a.).

var. **lateralis** Er. Kerzergbirge (Bielz).

var. **rubens** F. Frecker Gebirge (Serbota), Bucsecs (c. a.).

369. *Cautharis Linné.*

(*Ancistronycha*.)

abdominalis F.

var. **cyanipennis** Bach. Kronstadt, Előpatak (Bielz).

violacea Payk. Schulergbirge (Bielz); Balánbánya (Egyeskő, c. a.); Rodnageb., Nagyhagymás (Deubel); Ratosnya, Klausenburg (Müller); Bodzaer Geb. (Méhely).

var. **ligurina** Dictr. Rodnagebirge (O), (Deubel).

Das in der Sammlung Deubels befindliche ♂ weicht von der normalen Form ab durch schwarzen Hinterkopf, dunklen Halsschild mit rötlich durchscheinenden Rändern und mit Ausnahme der Vorderhäften ganz schwarze Beine. An den Fühlern ist nur die Unterseite des ersten Gliedes gelb. Die Krallen aller Beine sind gelb.

Erichsoni Bach. Kerzer Gebirge (Bielz); Retjezat, Rodnagebirge (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

(*Cautharis* i. sp.)

fusca L. Im ganzen Berg- und Hügelland verbreitet.

rustica Fall. Im ganzen Berg- und Hügelland verbreitet.

tristis F. Retjezat, Kerzer Gebirge (Bielz); Surul (Albrecht); Rodnagebirge (Deubel).

obscura L. Hâtszeg, Götzenberg, Talmaischen, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Gyeke (Bielz); Schanta (Ormay); Alsó-Rákos (c. a.); Paringul (Deubel).

puticaria F. Hâtszeg, Zibinsgebirge, Kronstadt, Záh (Mezőség, Bielz); Kalán, Alsó-Rákos (c. a.).

nigriceps Müll. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

pellucida F. Hâtszeg, Neudorf b. H., Fogarasch, Héviz, Kronstadt (Bielz); Götzenberg (Ormay); Vargyastal, Nagyhagymás, Paringul (Deubel); Detunata (Mallász).

livida L. Hâtszeg, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Oláhfalu, Záh, Gyeke (Bielz); Schanta (Ormay); Karlsburg, Borszék (c. a.).

var. **scapularis** Redt. Tartlau (Bielz).

var. **rufipes** Herbst (dispar F.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

longicollis Kiesenw. Kerzer Geb. (Bielz); Kronstadt (c. a.); Rodnagebirge, Vargyastal, Nagyhagymás (Deubel).

quadripunctata Müll. (assimilis Payk.). Präsbe, Hoszufalu (Bielz); Szurduk-Pass, Schässburg, Schulergbirge (c. a.); Vargyastal (Deubel); Remete (Nagyenyed, Ormay).

sudetica Letzn. Fogarascher, Kronstädter Gebirge (Bielz); Schulergbirge, Nussbach, Klausenburg (c. a.).

rufa L. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Héviz, Kronstadt (Bielz); Nagyhagymás (Deubel); Schässburg, Klausenburg (c. a.).

pallida Goeze. Fogarasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

fulvicollis F. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Petrozsény, Malomvitz, Előpatak (c. a.).

bicolor Herbst (thoracica Oliv.). Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Borszék (Bielz); Karlsburg, Unter-Kerz (c. a.).

Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser Art in Kronstadt.

lateralis L. (oralis Germ.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Geb., Schässburg, Gyeke, Záh (Bielz); Baassen, Marosujvár, Karlsburg, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(*Metacantharis*.)

discoidea Ahr. Stolzenburg (Ormay); Kronstadt (Deubel); Borszék (c. a.).

var. litturata Redtenb. Mediasch (Bielz); Fogarascher Gebirge (c. a.); S.-Regen (Müller).

haemorrhoidalis F. Hátszeg, Grossschenern, Kerzer Gebirge, Reps, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Götzemberg, Remete (Nagyenyed, Ormay).

turcica Marsh. Kerzer Gebirge (Bielz).

370. Absidia Mulsant.

pilosa Payk. Dees, Kronstadt (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota). Paringul, Borszék (c. a.); Bucsecs, Nagyhagymás, Schulergebirge (Deubel).

prolixa Märk. Kronstadt, Rodnagebirge, Bucsecs (♂♀, c. a.); Nagyhagymás, Schulergebirge (Deubel).

rufotestacea Letzn. Schuler Gebirge, Szováta (c. a.); Zernest, Rosenau (Deubel).

371. Rhagonycha Eschsch.

translucida Kryn. Rodnagebirge, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

nigripiceps Waltl. Zibinsgebirge, Götzemberg, Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt, Bistra, Retjezat, Schässburg, Borszék, Rodnagebirge (c. a.); Paringul (Deubel).

var. nigricornis n. v. Rodnagebirge (c. a.).
Im Rodnagelirge kommt eine Varietät vor mit ganz schwarzen Fühlern und schwarzen oder braunen Schenkeln, für welche ich den Namen nigricornis verschlage.

fulva Scop. Hátszeg, Déva, Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Dees, Klausenburg (Bielz).

var. usta Germ. Schässburg (Bielz).

opaca Muls. Kronstadt (Bielz).

Die Art gehört dem südwestlichen Europa an, so dass ihr Vorkommen bei uns eines weiteren sicheren Nachweises bedarf.

maculicollis Märk. (Meisteri Grell.). Hátszeg (Bielz); Hermannstadt, Götzemberg, Szamosújvár (Ormay); Paringul, Bucsecs, Csukás, Rodnageb., Bistritz (c. a.).

testacea L. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Schässburg, Szováta, Gyöke, Záh (Bielz).

limbata Thoms. Hermannstadt (c. a.); Kronstadt, Bucsecs (Deubel).

Deubeli n. sp. Schässburg, Kronstadt (c. a., Deubel).

Rhagonycha Deubeli.
Niger vel nigropiceus, mandibulis, elytris, tibis tarsisque rufotestaceis, antennae corporis dimidium superantes, prothorax subquadратus, angulis anterioribus subtrotundatis, posterioribus acutis, subnotatus vel rectangulatis.

Schwarz oder dunkelpfechbraun, Mandibel, Schienen, Tarsen und Flügeldecken hellgelb, zu-

weilen das zweite Fühlerglied an der Wurzel etwas heller. Kopf beim ♂ etwa so breit als der Halsschild, mit ebenso grossen, vorgequollenen Augen wie bei Rh. pallipes, beim ♀ viel schmäler als der Halsschild mit kleineren wenig vorgewölbenden Augen, fein zerstreut, etwas rauh punktiert, zwischen den Augen seicht, zuweilen obsolet eingedrückt. Fühler in beiden Geschlechtern länger als der halbe Körper, das dritte Glied fast doppelt so lang als das zweite und um $\frac{1}{4}$ kürzer als das vierte Halsschild beim ♂ fast so lang als breit, nach vorne etwas verengt, beim ♀ sehr wenig kürzer als breit, fast quadratisch, mit schwach gerundeten Seiten und schwach gerundetem Vorderrand, die Vordercken stumpf, aber deutlich, die Hintercken fast rechtwinklig, ziemlich scharf, Vorder- und Hinterrand deutlich, der Seitenrand kaum aufgebogen, fast verflacht, Scheibe mit den gewöhnlichen Eindrücken glänzend, glatt, höchstens in den Vorderwinkel und an den Seiten undeutlich punktiert. Schildchen dunkel. Flügeldecken vier- bis fünfmal länger als der Halsschild, dicht, etwas runzlig punktiert, mit zwei mehr oder weniger deutlichen, erhabenen Linien auf der innern Scheibenhälfte, dicht gelblichgrau niederliegend behaart. Unterseite ganz schwarz. Der Rh. femoralis Brullé nahestehend, aber grösser, anders gefärbt und punktiert, mit längeren Fühlern und weniger querem glänzendem Halsschild.

femoralis Brull. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Paringul, Bucsecs, Nagyhagymás (Deubel).

var. nigripes Redtenb. Zibinsgebirge, Präsbe, Kronstadt (Bielz); Retjezat, Bucsecs, Rodnagebirge (c. a.); Kerzer Gebirge (Ormay).

var. fuscitibialis Rey. Retjezat, Paringul (c. a.).

lignosa Müll. (pallipes F., pallida F.). Durch das ganze Berg- und Hügelland bis ins Gebirge verbreitet.

straminea Kiesenw. Schanta, Stolzenburg (Ormay).

banatica Roseh. Déva, Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Hammendorf, Baassen, Schässburg (c. a., von Grasrispen gekotscht).

viduata Küst. Hermannstadt (Ormay).

rorida Kiesenwetter. Hermannstadt (Bielz); Hátszeg, Puj (b. Hátszeg), Bucsecs, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel); Klausenburg (Müller).

elongata Fall. Hátszeg, Zibinsgebirge, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Szováta (c. a.).

carpathica Ganglb. (? morio Miller). Rodnagelirge (Ganglbauer).

atra L. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. II., Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Baassen, Borszék (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

var. rhaetica Stierl. Vargyastal (Deubel).

372. Pygidia Muls.

denticollis Schumm. Klausenburg, Bihar gebirge (Bielz); Rodnagelirge (c. a.).

373. *Silis Latreille.*

nitidula F. Mühlbach, Gross-Scheuern, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Reps, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Gyeké, Bielz).

ruficollis F. Gross-Scheuern (Bielz).

Malthinini

Die Arten leben auf verschiedenen Pflanzen, werden mit dem Streifsack von niedern Pflanzen und durch Klopfen von Laub- und Nadelhölzern gesammelt.

374. *Malchinus Kiesenwetter.*

demissus Kiesenw. Hermannstadt (Seidlitz); Baassen, Schässburg (c. a.).

sinuatocollis Kiesenw. Hermannstadt (Seidlitz); Kerzer Gebirge (Bielz).

nigrinus Schanf. Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Hátszeg, Schässburg (c. a.).

375. *Malchimus Latreille.*

biguttulus Payk. Buesecs, Schulergebirge, Borszék (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

flaveolus Payk. Gross-Scheuern (Bielz); Klausenburg, Baassen, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

fasciatus Oliv. Kerzer Gebirge (Bielz); Michelsberg (Ormay); Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel); S.-Regen (Müller).

facialis Thoms. Seidl. Schässburg (Wietberg, 4. Juli, c. a.).

glabellus Kiesenw. Hermannstadt (Bielz); Rotenturm, Schässburg (c. a.).

maritimus Pic. Kronstadt (Honterusplatz, 1 ♂, Deubel).

frontalis Marsh. Hammersdorf, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Hönigberg (Deubel).

376. *Malthodes Kiesenwetter.*

marginatus Latr. Gross-Scheuern, Neudorf (Bielz); Kronstadt, Előpatak, Borszék, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); S.-Regen (Müller).

trifurcatus Kiesenw. Fogarasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

var. **atramentarius** Kiesenw. Kronstadt (♂, Deubel).

guttifer Kiesenw. Bucsecs, Frecker Geb. (Serbota, Nagyhagymás, Kronstadt, Borszék (c. a.)).

spretus Kiesenw.

var. **apiceguttatus** Ganglb. Kronstadt (Deubel).

Liegeli Weise. Kronstadt (Zinne, ♂, Deubel).

brevicollis Payk. (*nigellus* Kiesenw.). Kerzer Gebirge (Bielz); Paringul (c. a.).

minimus L. Klausenburg (Bielz); Hermannstadt, Ompolyiczatal (bei Zalatna), Baassen, Schässburg (c. a.).

fuscus Waltl. (*pellucidus* Kiesenw.). Hermannstadt, Schässburg (c. a.).

debilis Kiesenw. Bozauer Gebirge (Méhely).

var. **transylvanicus** Ganglb. Kronstadt (Zinne, ♂♀, Deubel).

dispar Germ. Gross-Scheuern, Kerzer Geb. (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Bánánbánya, Szováta, Bistra, Retjezat (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

maurus Cast. Hermannstadt (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

var. **misellus** Kiesenw. Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt, Szováta, Borszék, Schässburg (Kokelufer auf Weiden, c. a.); Kronstadt (Deubel); Bistritz (Müller).

fibulatus Kiesenw. Kronstadt (Deubel).

hexacanthus Kiesenw. Retjezat (c. a.).

dimidiaticollis Rosenh. (*pulicarius* Redt.). Hermannstadt, Baassen, Schässburg (♂, c. a.).

spathifer Kiesenw. Kronstadt (♂♀, Deubel).

serbota Petri Frecker Gebirge (Serbota, oberhalb der Baumregion im Grase unter Steinen, ♀, c. a.).

Holdhausi Ganglb. Kronstadt (♂♀, Deubel).

Deubeli Ganglb. Siebenbürgen.

Drillini.

377. *Drillus Olivier.*

concolor Ahr. Grosspold, Gross-Scheuern, Kronstadt (Kapellenb., Bielz); Baassen, Schässburg (c. a.). Die Larven der flügellosen Weibchen leben in verschiedenen Landschnecken, *Helix vindobonensis*, *Helix lutescens*, *vicina*; Entwicklung der Männchen noch unbekannt; Hermannstadt (Albrecht); Bistritz, S.-Regen (Müller).

Malachiini.

378. *Troglops Erichs.*

albicans L. Hermannstadt, Gross-Schenk, Fogarasch, Reps, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Reps, Unter-Kerz, Csukás (c. a.).

379. *Charopus Erichs.*

thoraciclus Moraw. Csukás, Bozauer Gebirge (Deubel).

flavipes Payk. Fogarasch, Klausenburg, Bibar Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Denhel).

- pallipes** Oliv. Hátszeg, Hermannstadt, Holzmengen, Előpatak, S.-Itegen (Bielz).
concolor F. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Girelsau, Fogarasch, Előpatak, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

380. *Hypebaeus Kiesenw.*

(Alloceps.)

- flavipes** F. Mühlbach, Mediasch (Bielz); Hammersdorf, Kronstadt (c. a.); Hátszeg (Deubel).

381. *Ebaeus Erichs.*

- pedicularius** Schrank (praeoccupatus aut.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Schässburg, S.-Regen, Gyéké (Bielz); Stolzenburg, Salzburg (Ormay); Hátszeg (c. a.).

- ater** Kiesenw. Bucsecs (Deubel, subalpin).
appendiculatus Er. Hermannstadt, Neudorf b. H., Holzmengen, S.-Regen (Bielz); Hátszeg (c. a.).

- flavicornis** Er. Hammersdorf, Előpatak (Bielz); Schässburg (c. a.); Törzburg (Deubel).

- mediterraneus** Ab. Kronstadt (Rosenauer Burgberg, Mélhely).

- coerulescens** Er. Gross-Scheuern (Bielz); Hátszeg (c. a.).

(Sphinginus.)

- coarctatus** Er. Kronstadt, Schässburg (Bielz); Zajzon (Deubel).

382. *Attalus Erichs.*

(Abrinus.)

- analis** Panz. Hermannstadt, Marpod, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Stolzenburg, Resinar (Ormay); Hammersdorf, Rotenturm, Hátszeg, Törczkó (Erzgebirge), Tordae Schlucht, Baassen, Borszék (c. a.).

383. *Axiotarsus Motsch*

- ruficollis** Oliv. Hermannstadt, Neudorf bei H. (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

- pulicarius** F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

- marginalis** Lap. Hátszeg, Déva, Hermannstadt, Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz); Baassen, Schässburg, Reps (c. a.).

384. *Malachius Fabr.*

- scutellaris** Er. Hermannstadt, Birthälm, Schässburg, Reps (Bielz); Vargyastal (Deubel).

- rubidus** Er. Talmatschel (Bielz).

- aeneus** L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, auch im Gebirge. Retjezat (c. a.).

- marginellus** Oliv. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet bis in das Gebirge (Rodnaberge, Koronj, c. a.).
dilaticornis Germ. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Alsó-Rákos (Tepehegy, c. a.). In Hammersdorf sammelte ich diese Art auf *Crambe tartarica*.

- bipustulatus** L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

- affinis** Mént. Hátszeg, Oláhfalu (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).

- spinipennis** Germ. Hátszeg, Retjezat, Hermannstadt, Fogarasch (Bielz); Stolzenburg, Rotenturm (Ormay).

- elegans** Oliv. Rotenturm (Bielz); Hammersdorf (Ormay).

- falcifer** Abele. Schässburg (2 ♂, c. a.); Rosenau, Unterlőmös (Mélhely); Kronstadt (Zinne, Deubel).

- geniculatus** Germ. Mühlbach, Fogarasch, Záh (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Stolzenburg (Ormay); Marosujvár, Schässburg (c. a.); Hátszeg (Deubel).

385. *Authocomus Erichs.*

(Celidus.)

- rufus** Herbst. Hammersdorf, Grossscheuern (Bielz); Schässburg (c. a., Oktober im Röhricht einer feuchten Stelle).

(Neotrotus.)

- bipunctatus** Harrer (equestris F.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

(Parembalus.)

- fasciatus** L. Hátszeg, Retjezat, Gross-Scheuern, Gross-Schenk, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Stolzenburg (Ormay); Kronstadt (Deubel).

Dasytinae.

386. *Dasytes Fabr.*

- niger** L. Hátszeg, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen; Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Baassen, Dees (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

- alpigradus** Kiesenw. Petrozsény, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Bucsecs (c. a.); Hátszeg (Deubel).

(Hypodasytes.)

- subalpinus** Baudi. Rosenau (Bucsecs-Gebiet, Deubel).

- obscurus** Gyll. (rugipennis Thoms.). Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Fogarasch, Büdös, Oláhfalu, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); (? rugipennis Thomson), Büdös (Bálványos), Tömöser Pass (Mélhely).

(Metadasytes.)

coeruleus Deg. Ober-Schles., Kerzer Geb., (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Szurdok-Pass, Retezat, Schässburg (Gross-Alischer Kupen, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel); Bistritz (Müller).

(Mesodasytes.)

aerous Kiesenw. Riu Sad, Balánbánya, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Bistritz, S.-Regen (Müller).

plumbeus Müll. Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (c. a.); Salzburg (Ormay).

(Hapalognatha.)

fusculus Illig. Gross-Scheuern, Holzmengen, Zood, Fogarasch, Mediasch, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

subaeneus Schönh. Giresau, Kerzer Geb., Fogarasch, Gyeke (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Kronstadt (Zinne, Deubel).

387. Dolichosoma Stephens.

lineare Rossi. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Mediasch, Balánbánya, Szovála, Schässburg (c. a.); Rodnagelbirge (Valea vinului), Kronstadt, Vargyastal (Deubel).

388. Haplocnemus Stephens.

pini Redt. (impressus aut.). Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

nigricornis F. Hermannstadt (Ormay).

tarsalis Salib. Tordaer Schlucht, Rodnagelbirge (c. a. ♂♀).

389. Trichoceble Thomson.

(Julistus Kiesenw.)

Horalis Oliv. Grosspold, Schässburg, Borszék (Bielz); Rosenau (Deubel); Bistritz (Müller).

fulvohirta Bris. Hátszeg (c. a.); Rosenau? (Deubel).

390. Dasytiscus Kiesenw.

impressicollis Reitter (graminicola Kiesenw.). Gross-Scheuern (Bielz).

391. Danacea Laporte.

Die Arten leben auf verschiedenen niedern Pflanzen.

Reyi Proch. Kronstadt (Deubel).

pallipes Panz. Hátszeg, Gross-Scheuern, Neudorf h. H., Mediasch, Gyergyó (Bad), Stolzenburg, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rotenturm (c. a.).

serbica Kiesenw. Hermannstadt (Bielz); Salzburg, Karlsburg, Schässburg, Borszék (c. a.); Mezőség (Gyéke, Méhely).

morosa Kiesenw. Rosenau (Bucsecs-Gebiet, Deubel).

nigritarsis Küst. Gross-Scheuern, Fogarasch, Reps, Záli (Bielz); Klausenburg, Nagyenyed, Rotenturm, Zalatna, Hátszeg, Puj (b. Hátszeg), Petrozsény (c. a.); Hermannstadt, Stolzenburg (Ormay); Kronstadt (Deubel).

XXII. Cleridae.

Clerini.

392. Denops Steven.

albofasciatus Charp. Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern (Bielz).

var. **longicollis** Stev. Siebenbürgen (Catalog. Col. Europae, Heyden 1906).

393. Tillus Olivier.

Die Arten werden in der Regel an gefällten Holzstämmen oder in altem Holze gesammelt.

elongatus L. Hátszeg, Zood, Kerzer Geb., Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Előpatak, Schässburg, Rodnagelbirge (c. a.); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes Schulbergbirge, Bucsecs, Bodzaer Gebirge (Deubel).

♂ var. **comma** n. v. Zalatna (1 Ex. c. a.).

Tillus elongatus var. **comma** weicht in Grösse, Gestalt und Färbung von normalen Männchen nicht ab, besitzt aber auf dem vierten Zwischenraume der Flügeldecken in der Basalhälfte einen schmalen, lebhaft rot gefärbten, kielförmig erhöhten, kommaförmigen Strich.

unifasciatus F. Hátszeg, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Götzenberg, Zood, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Nagyenyed (c. a.).

pallidipennis Bielz. Gross-Schenk, Szombat, Schässburg, Csíker Geb. (Bielz).

394. Tarsostenus Spinola.

univittatus Rossi. Hammersdorf, Sächs.-Regen (Bielz).

395. Opilo Latreille.

domesticus Sturm. Fogarasch, Kronstadt (? Deubel); Hosszúfalu (Bielz); Schässburg (c. a.).

mollis L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Gross-Schenk, Fogarasch, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Rotenturm, Remete (Nagyenyed, Ormay); Kronstadt (Deubel).

396. *Clerus Fabr.*
(*Cleroides* Schäffer.)

mutillarius F. Hâtszeg, Hermannstadt, Zood, Mediasch, Dees, Klausenburg (Bielz); Schässburg (c. a.); Hâromszék (Deubel).

397. *Thanasimus Latreille.*

rufipes Brahm.

var. **femorallis** Zett. (*pectoralis* Fuss.). Präsbe, Kerzer Gebirge (Bielz).

formicarius L. Hâtszeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Präsbe, Kerzer Gebirge, Gress-Schenk, Kronstadt, Mediasch, Birthälm, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Bistra (Ormay).

398. *Trichodes Herbst.*

apiarius L. Durch das ganze Berg- und Hügelland bis in die Gebirge verbreitet, auf blühenden Pflanzen.

favarius Illig. Csiker Gebirge (Bielz); Vargyastal (Deubel).

irkutensis Laxm. (*bifasciatus* F.). Gyergyó, Rodna (Bielz); Bistra (Ormay); Rodnagebirge (Vale vinului, Deubel).

Enoplini.

399. *Orthopleura Spinola.*
(*Dermestoides* Schäffer.)

sanguinicollis F. Fogarasch, Krenstadt, Mediasch, Klausenburg, Gyalu (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Henigberg, Nussbach (Deubel, an Eichenstämmen).

Corynetini.

400. *Corynetes Herbst.*

coeruleus Degeer. Gross-Scheuern, Botberg b. H., Krenstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

var. **ruficornis** Sturm. Marktschelken, Mediasch, Schässburg, Héviz (Bielz); Marosujvár (c. a.).

401. *Necrobia Latreille.*

violacea L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

rufipes Degeer. Mühlbach, Klausenburg (Bielz).

402. *Opetiopalpus Spinola.*

scutellaris Panz. Gross-Scheuern, Dees (Bielz); Klausenburg (c. a.).

XXIII. Derodontidae.

403. *Derodontus Leconte.*

macularis Fuss. Kerzer Gebirge (Bielz).

404. *Laricobius Rosenhaner.*

Erichsoni Rosenh. Büsecs (Deubel, alpiu, aus Grasbüscheln gesiebt; ich sammle diese Art in Böhmen bei Franzensbad durch Klopfen von Gesträuch).

XXIV. Byturidae.

405. *Byturus Latreille.*

fumatus F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, namentlich auf den Blüten des Löwenzahn.

tomentosus F. Durch das ganze Gebiet verbreitet, namentlich auf Himbeerblüten.

a. **flavescens** Marsh. Mit der Stamiform.

XXV. Ostomidae.

Nemosomini.

406. *Nemosoma Latreille.*

elongatum L. Gross-Scheuern, Birthälm, S.-Regen (Bielz); Nagyhagymás, Krenstadt (Zinne, Deubel).

407. *Tenebrioides Piller.*

mauritanicus L. Durch das ganze Gebiet unter der Rinde von Laub- (auch Obst-)Bäumen.

Leperlini.

408. *Calytis Thomson.*
(*Nosodes* Leconte.)

scabra Thunbg. Borszék (Bielz).

Ostomini.

409. *Ostoma Laicharling.*

(*Zimioma*.)

grossum L. Kerzer Gebirge, Kronstädter Gebirge, Piatra mare, Bükszad, Berzék, Marosgebirge, S.-Regen (Bielz); Bistra, Rodnagebirge (c. a.).

(*Ostoma i. sp.*)

ferrugineum L. In unsern Gebirgen unter Fichtenrinde.

(Gynocharis.)

oblongum L. Hátszeg, Präsbe, Götzenberg, Kerzer Gebirge, Bozauer Pass, Marosgebirge, Dees (Bielz); Marosujvár, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm, Brád, Szamosujvár (Ormay); Csukás (Deubel).

410. *Tymalus Latreille.*

limbatus F. In allen Gebirgswäldern unter Baumrinde (Rotbuche, Fichte).

XXVI. Sphaeritidae.

411. *Sphaerites Duftschmid.*

gabratus F. Präsbe, Kronstadt, Schulergebirge (Bielz); Zernest (Deubel).

XXVII. Nitidulidae.

Cateretini.

412. *Cateretes Herbst.*

(*Cercus Latreille.*)

pedicularius L. Mezőség (Záh, Bielz).
bipustulatus Payk. Schässburg (c. a.); Honigberg (Deubel).
 a. **suturalis** Murray. } mit der
 a. **ochraceus** Murray. } Stammform.
 (Pulion.)

rufilabris Latr. Dobra (Bielz).

413. *Heterhelus Duval.*

scutellaris Heer. (*sambuci* Er.). Kronstadt, Schulergebirge, Borszék (c. a.).
solani Heer. (*rubiginosus* Er.). Kerzer Gebirge, Kronstadt, Marosgebirge (Bielz); Retjezat, Bistra, Borszék, Rodnagebirge (c. a.); Hermannstadt, Resinar, Gyergyó-Tölgyes, Schanta (Ormay); Nagyhagymás (Deubel).

414. *Brachypterus Kugelann.*

glaber Steph. Zibinsgebirge (Bielz).

urticæ F. Zibinsgebirge, Fogarascher Gebirge, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Rodnagebirge, Balánbánya, Schulergebirge, Előpatak, Bükszad, Retjezat (c. a.); Kerzer Gebirge (Ormay); Detunata (Mallász).

415. *Heterostomus Duval.*

pulicarius L. (*gravidus* Illig.). Hátszeg, Hermannstadt, Zood, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau (Bielz).

var. **cinereus** Heer. Zibinsgebirge (Bielz).
 var. **linariae** Steph. Előpatak, Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.).

Carpophilini.

416. *Carpophilus Leach.*

(Economorphus.)
sepxustulatus F. Gross-Scheuern, Holzmengen (Bielz); Schässburg (unter Eichenrinde und am ausfliessenden Saft der Buche, c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Zinne).

Nitidulini.

417. *Ipidia Erichs.*

4-maculata Quens. (4-notata F.). Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Borszék, Gyergyó (Toplitz, Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Nagyhagymás, Kronstadt (Deubel); Szováta (c. a.).

418. *Amphotis Erichs.*

marginata F. Dobra, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg (unter der Rinde und im Holze alter Weissbuchen in den Nestern der *Formica fuliginosa*, c. a.); Honigberg (unter Eichenrinde, Deubel); Szováta (Rotbuchenstumpf, 5. Juni, c. a.).

419. *Sorouia Erichs.*

punctatissima Illig. Hermannstadt, Götzenberg, Kerzer Geb., Fogarasch (Bielz).
grisea L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, im Holze alter Eichen, unter der Rinde und am ausfliessenden Saft der Buchen und anderer Laubbäume).

420. *Epuraea Erichs.*

(Dadopora.)

decemguttata F. Hátszeg, Hermannstadt, Präsbe, Gross-Scheuern, Holznengen, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Alsó-Rákos, Schässburg (in Baumpilzen, besonders der Eiche, c. a.); Detunata (Mallász). (Epuraea i. sp.)

silacea Herbst. Präsbe, Neudorf b. H., Kronstadt (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

var. **fagi** Bris. Bucsees (Malajester Schlucht, Méhely).

depressa Gyll. (*aestiva* Er., *octracea* Er.). Hermannstadt, Neudorf b. H., Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Michelberg, Schanta (Ormay); Unter-Kerz (c. a.).

a. **bisignata** Sturm. Präsbe, Götzenberg, Hammersdorf, Neudorf b. II., Bielz), Heitau, Kerzer Geb. (Ormay); Schässburg, Kronstadt (c. a.).

melina Er. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Kronstadt (c. a.); Schulergeb. (Deubel).

deleta Er. Rodnagelgebirge (c. a.); Zernest (Deubel).

terminalis Mannh. (immunda Er.). Zibinsgebirge (Ormay); Hargitta (Méhely); Schulergebirge, Frecker Gebirge (Serbota), Balánbánya (Egyeskö, c. a.).

a. **nigricans** Schilsky. Schulergebirge (c. a.).

a. **Seidlitzii** Schilsky. Schulergebirge, Balánbánya (Egyeskö, c. a.); Zernest (Deubel).

nana Reitter. Rodnagelgebirge (c. a.); Negoi (subalpin, Deubel).

neglecta Heer. Hátszeg, Hermannstadt, Fogarasch, Freck, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Ober-Kerz (Glashütte), Schässburg (c. a.); Bistra, Gyögy (Ormay); Zernest (Deubel).

rufomarginata Steph. Kerzer Geb. (Bielz).

castanea Duf. Hátszeg (Bielz).

nobilis Reitter. Schässburg (am ausfließenden Saite eines Buchenstumpfes, März, c. a.), 5 Exemplare.

Die Art erinnert in der Färbung an *E. rufomarginata* Steph., für die ich sie anfänglich auch hielt. Da jedoch die ♂'s erweiterte Mittelschienen besitzen, die Punktierung entschieden größer und körniger als bei *E. obsoleta*, die Färbung ähnlich der *E. nobilis* ist, so habe ich die Schässburger Tiere als *E. nobilis* Reitter determiniert. Doch ist es nicht ausgeschlossen, dass wir in unserer *E. nobilis* eine neue Art zu erblicken haben, da der wesentliche Unterschied zwischen ihr und *E. obsoleta* im Fühlerbau besteht, den Reitter nicht erwähnt. Die Fühlergeissel ist viel schlanker und länger, das mittlere Glied der Keule deutlich breiter als die beiden einschlüssenden und gebraunt. Doch ist es immerhin möglich, dass Reitter diese Unterschiede, da ihm nur ein Exemplar vorlag, übersehen hat.

variegata Herbst. Hátszeg, Hermannstadt, Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge (Bielz); Annen - See (Tusnáld). Schässburg, Schulergebirge (c. a.); Rosenau (Bucecs-Gebiet, Deubel).

a. **monochroa** Reitter. Kronstadt (Deubel).

obsoleta F. Hermannstadt, Neudorf b. II., Talmesch, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Oláhfalu (Bielz); Schässburg, Hátszeg (c. a.).

longula Er. Hermannstadt (Bielz); Petroszény, Schässburg (c. a.); Rotenturm (Ormay); Kronstadt (Deubel).

a. **Erichsoni** Reitter. Petroszény (c. a.).

boreella Zetterst. Kerzer Gebirge (Bielz); Schulergebirge, Rodnagelgebirge (c. a.); Schanta (Ormay); Kronstadt, Zernest (Deubel).

angustula Strm. Präsbe (Bielz).

pygmaea Gyll. Zibinsgebirge, Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz); Schulergeb., Frecker

Gebirge (Serbota), Oláhfalu, Rodnagel (c. a.).

pusilla Illig. Hátszeg (Bielz); Schulergeb. (c. a.); Rodnagel, Tusnáld (Deubel). **abielina** J. Sahlb. Schulergebirge, Alsó-Rákos (Deubel).

oblonga Herbst. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Schulergebirge, Nagyhagymás (Deubel).

Fussi Reitter. Frecker Gebirge, Oláhfalu (c. a.); Bucecs, Nagyhagymás (Deubel).

florea Er. Zibinsgebirge, Hermannstadt (Bielz); Schässburg, Puj (bei Hátszeg), Malomiviz (c. a.); Götzenberg, Kleinpold (Ormay); Kronstadt (Deubel).

laeviuscula Gyll. Ober-Kerz (Glashütte, c. a., 1 Ex., vihlt Ganglbauer).

Deubeli Reitter. Schulergebirge (von Deubel gesammelt, c. Reitter?).

421. *Mierurula* Reitter.

(*Micruria* Reitter ol.).

melanocephala Marsh. Zibinsgebirge, Hermannstadt (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Schulergebirge, Bülös (c. a.); Kronstadt, Bucecs (subalpin, Deubel).

422. *Omosiphora* Reitter.

limbata Oliv. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a., im Moos eines vertrockneten Ahorn); Hermannstadt, Resinar (Ormay); Honigberg (Deubel).

423. *Omosita* Erichs.

depressa L. Gross-Scheuern, Neudorf bei II., Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).

colon L. Hermannstadt, Fogarasch, S.-Regen, Dees (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Schässburg (an tierischen Stoffen, verfaultem Obst etc.); Kronstadt (Deubel).

discoidea F. Hermannstadt, Neudorf b. II., Kronstadt, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz). In Schässburg unter Baumrinden gesammelt, c. a.).

424. *Nitidula* Erichs.

bipunctata L. Durch das ganze Berg- und Hügelland an tierischen Stoffen, oft in Vorratskammern.

rufipes L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Bistritz (Bielz); Honigberg, Neustadt bei Kr. (Deubel).

carnaria Schall. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg (an den getrockneten Überresten eines Fuchses, c. a.); Kronstadt (Gesprenge, Deubel).

425. *Pria Stephens.*

dulcamarae Scop. Hátszeg, Hermannstadt (Bielz); Karlsburg, Marienburg b. Sch. (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

426. *Meligethes Stephens.*

Blütenkäfer.

(*Odontogethes*.)

hebes Er. Zibinsgebirge, Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Borszék, Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rodnagebirge (Deubel). (*Meligethes* i. sp.)

rutipes Gyll. Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Zernest (Deubel).

lumbaris Sturm. Hátszeg (Bielz); Előpatak (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

Försteri Reitter. Kronstadt (c. a.).

rubripes Muls. (fulvipes Bris.). Kronstadt (Zinne), Bucsecs (subalpin, Deubel).

coracinus Strm. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Előpatak, Oláhfalu, Mezőség (Gyeye, Záh, Bielz); Bükszál, Schässburg, Hammersdorf, Kronstadt (c. a.); Gyögy (Bad, Ormay).

a. **epuraeoides** Reitter. Előpatak (c. a.).

var. **pumilus** Er. Baróth, Kisszéktó (Méhely); Kronstadt, Előpatak, Schässburg (c. a.).

var. **decorolatus** Först. Baróth, Kronstadt (Zinne, Méhely).

var. **aenescens** Ganglb. Kronstadt (Ganglbauer); Alsó-Rákos, Schässburg, Hátszeg, Előpatak (c. a.); Vargyastal (Deubel).

Ganglbauer (Käfer von Mitteleuropa, III. 504) führt diese Varietät, die sich vielleicht als selbständige Art herausstellen dürfte, ausdrücklich für Kronstadt an. Sie ist im Catalogus col. Europae, Heyden etc. 1906 ausgeblichen. Die Art kommt auch mit dunklen Beinen und Fühlern vor, die Flügeldecken sind bei den Weibchen etwas runzlig punktiert.

subaeneus Sturm. Hátszeg, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Fogarasch, Előpatak, S.-Regen, Oláhfalu (Bielz); Schässburg, Szováta, Alsó-Rákos (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

aeneus F. (brassicæ Reitter). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, besonders auf Löwenzahn).

var. **dauricus** Motsch. Balánbánya (c. a.).

a. **coeruleus** Reitter. Bistritz, Dees (c. a.).

viridescens F. Götzemberg, Talmesch (Bielz); Balánbánya (c. a.); Kronstadt, Zernest (Deubel).

Czwalinae Reitter. Königstein (Crepatura), Bucsecs (Deubel); Zibinskamm (Albrecht).

humerosus Reitter. Rodnagebirge, Nagy-hagymás (Deubel).

sympyti Heer. Hátszeg, Hermannstadt, Mediasch, Reps, Előpatak (Bielz); Schäss-

burg, Ilvamika (Naszód, c. a.); Rosenu (Deubel).

M. corvinus Er. ist aus dem Verzeichnis siebenbürgischer Käfer zu streichen, da er durch einen Irrtum meinerseits aufgenommen wurde.

subrugosus Gyll. Neppendorf, Kerz, Kerzer Gebirge, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Resinar, Schanta (Ormay); Borszék, Alsó-Rákos (Tepe, c. a.); Schulergebirge, Rosenau (Deubel).

var. **subsfrigosus** Er. Előpatak (Bielz).

serripes Gyll. Neppendorf, Sächs.-Regen, Gyeye (Bielz); Gyögy (Ormay); Schässburg (c. a.).

nanus Er. Hermannstadt (Bielz).

obscurus Er. Előpatak, Oláhfalu (Bielz); Hátszeg, Alsó-Rákos, Schässburg (c. a.).

var. **parallelus** Reitter. Rosenauer Geb., Baróth (Méhely); Előpatak (c. a.).

bidens Bris. Kerzer Gebirge (Bielz); Ober-Komana (Mébely); Reps, Schässburg (c. a.).

umbrosus Sturm. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Nagyhagymás, Kronstadt (Zinne, Deubel).

transsylvaniaicus u. sp. Reps, Iléviz, Oláhfalu, Bükszál, Ober-Kerz, Ilvamika (Naszód), Ratosnya, Schässburg (c. a.).

Meligethes transsylvaniaicus n. sp.

Von der breiten Gestalt und der Grösse, Färbung und Punktierung des M. umbrosus Sturm und demselben jedenfalls nahestehend, jedoch durch die Bewaffnung der Vorderschienen und die männlichen Geschlechtsauszeichnungen sicher verschieden. Die Vorderschienen sind bis zum Spitzendrittel erweitert und sehr fein gekerbt, im Spitzendrittel befinden sich zwei grössere Zähnchen, die in der Regel durch ein oder zuweilen noch zwei kleinere getrennt sind. Beim Männchen ist das Metasternum in der Mitte der hintern Hälfte tief dreieckig eingedrückt, am Vorderrande des Eindruckes befindet sich ein breiteres Doppelhöckerchen und an seinem Hinterrande ein einfaches scharfes Körnchen. Das vierte Ventalsegment ist in der Mitte des Hinterrandes schmal geglättet, das fünfte vor dem Hinterrande vertieft, und dieser etwas aufgebogen. Im übrigen scheint die Art vollständig dem M. umbrosus zu gleichen, auch die Schenkellinie der Hinterbeine hat einen ähnlichen Verlauf.

Die bei Bielz für M. umbrosus angeführten Lokalitäten sind zum grössten Teile auf die neue Art zu beziehen. Ich streiche jedoch nur jene Orte, von denen mir M. transsylvaniaicus bekannt geworden ist, die übrigen belasse ich als zweifelhaft bei M. umbrosus, der bei uns wahrscheinlich durch die neue Art ersetzt wird.

afer Bris. Kerzer Gebirge (Bielz).

maurus Sturm. Hátszeg, Götzemberg, Reps (Bielz); Bükszál, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

incanus Strm. Reps, Oláhfalu (Bielz); Borszék (c. a.).

ovalatus Sturm. Hátszeg (c. a.); Rosenau (Deubel).

brachialis Er. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

picipes Sturm. Hermannstadt, Oláhfalu (Bielz); Reps (c. a.); Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).

flavipes Sturm. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.).
var. moestus Er. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz).
memnonius Er. Reps (Bielz); Kronstadt (c. a.).
niger Bris. Szováta (c. a.).
ochropus Sturm. Mediasch (Bielz); Reps (c. a.); Schanta (Ormay); Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).
brunnicornis Strm. Reps (Bielz); Bodzaer Gebirge (Méhely); Kronstadt (Deubel).
angustatus Küst. Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (c. a.).
haemorrhoidalis Först. Oláhfalu, Borszék, Héviz, Unter-Kerz, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
atramentarius Först. Schässburg (c. a.).
diflicilis Heer. Héviz, Oláhfalu (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Hermannstadt, Schulergebirge, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Hátszeg (Deubel).
Kunzei Er. Zibinsgebirge (Bielz); Kronstadt (Noa, Deubel).
morosus Er. Kronstadt Tömöischer Pass (Bielz); Retjezat (c. a.).
Bei dieser Art, ferner bei *M. tristis*, *exilis* und *brevis* wurden einige Fundorte des Bielz'schen Verzeichnisses, die sich nachträglich als irrtümlich herausgestellt haben, fortgelassen.
viduatus Strm. Hermannstadt (Bielz); Kerzer Gebirge, Szamosujvár (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt, Rosenaу, Zernest (Deubel).
pedicularius Gyll. Kerzer Gebirge, Reps (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Héviz, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
sulcatus Bris. Siebenbürgen (Ganglb. K. v. M. 516).
assimilis Strm. Schässburg (c. a.); Baróth, Gyéke, Záh (Méhely); Kronstadt (Deubel).
distinctus Strm. Oláhfalu (Bielz); Alsó-Rákos, Schässburg, Szováta (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
lepidii Mill. Gyéke, Záh (Bielz); Gross-Scheuern (Ormay); Bükszál (c. a.).
Frivaldszky Reitter. Siebenbürgen (Ganglbauer).
irislis Strm. Bükszál (Bielz); Balánbánya, Schässburg, Ratosnya (c. a.).
planisculus Heer. Bükszál, Oláhfalu, Előpatak (Bielz, c. a.); Hátszeg, Ratosnya, Szováta (c. a.).
acieularis Bris. Siebenbürgen (Ganglbauer K. v. M. III. 533).
lugubris Strm. Hermannstadt (Bielz); Teska (Bodzaer Gebirge), Baróth (Méhely); Borszék (c. a.).
var. gagatinus Er. Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (Zinne), Ober-Komana, Baróth (Méhely); Hátszeg (c. a.).
egenus Er. Kerzer Gebirge, Előpatak, Schässburg (Bielz); Kronstadt (Deubel).

exilis Strm. Kerzer Gebirge (Bielz).
fumatus Er. Unter-Kerz, S.-Regen (Bielz).
bidentatus Bris. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
erythropus Gyll. Hermannstadt (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Ober-Komana, Baróth (Méhely); Alsó-Bákos, Bükszál, Előpatak, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne).
(Acanthogethes.)

solidus Kugel. Hermannstadt (Bielz); Gyógy (Ormay).
brevis Strm. Schässburg (Bielz); Kronstadt, Petersberg b. Kr. (Talinenberg, Deubel); Borszék (c. a.).

427. Thalyera Erichs.

tervida Oliv. Hermannstadt (am ausfließenden Saft einer Eiche, Ormay); Schässburg (c. a.); Hátszeg, Kronstadt (Deubel).

428. Pocadius Erichs.

ferrugineus F. Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Mediasch, Reps, S.-Regen (Bielz); Resinar (Ormay); Balánbánya, Ober-Kerz (Glashütte), Klausenburg, Schässburg (c. a., in Eichenschwämmen und in Bovisten); Kronstadt (Deubel).

429. Cyphramus Kugelann.

Die Arten leben auf verschiedenen Pilzen.

4-punctatus Herbst. Präshe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Annen-See (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Schanta, Bistra (Ormay).

luteus F. (alutaceus Reitter). Hátszeg, Götzemberg, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Héviz, Oláhfalu, Borszék, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Schässburg, Rodnagbirge (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Detunata (Mallász).

var. fungicola Heer. Neudorf b. II., Kerzer Geb., Fogarasch, Kronstadt, Oláhfalu, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt Gölzenberg, Schanta, Heltau (Ormay); Schässburg, Rodnagbirge (c. a.).

430. Cylloides Erichs. Strongylus Herbst.

Die Art lebt unter Baumrinde, namentlich aber in Baumpilzen.

ater Herbst. Hermannstadt, Retjezat, Parigul, Gross-Scheuern, Präshe, Fogarascher Gebirge, Kerzer Geb., Gross-Schenk, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Remete (Nagyenyed, Ormay); Malomviz, Alsó-Rákos (c. a.).

Cypocephalini.**431. Cybocephalus Erichs.**

pulchellus Er. Schässburg (30. April, ldecke unter Blättern, c. a.).

politus Germ. Hermannstadt, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz).

Cryptarchini.**432. Cryptarcha Shuckard.**

strigata F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (Eichenschwämme, c. a.); Honigberg (Deubel); Schanta, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

(*Cryptarchula* Ganglb.)

imperialis F. Präsbe, Götzenberg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Holzmengen, Gross-Scheuk, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (an Eichen, c. a.).

433. Glischrochilus Murray. (Ips F.)

Die Arten leben namentlich unter Baumrinden. (Librodor.)

quadriguttatus Oliv. Kerzer Geb., Brenndorf, Marosgebirge, Schässburg (Bielz).

a. **10-guttatus** Oliv. Kronstadt, Keisd b. Schässburg (Deubel); Schässburg (c. a.).

(*Glischrochilus* i. sp.)

quadripustulatus L. Kerzer Geb., Götzenberg, Marosgeb., Präsbe, Ober-Sebes, Fogarasch, Kronstadt, Piatra mare (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Marosgebirge (unter Espenrinde, c. a.); Rodnagelgebirge, Zernest (Deubel).

434. Pityophagus Shuckard.

laevior Abeille.

var. **Deubeli** Ganglb. Siebenbürgen.

Ganglbauer führt (Käfer von Mitteleuropa, III, 556) *P. querqus* Reitter nach 1 C, welches von Deubel gesammelt wurde, für Siebenbürgen an; später hat er dasselbe Exemplar als Varietät des *P. laevior* Ab. erkannt; daher kann *P. querqus* nicht in unser Verzeichnis aufgenommen werden. In wessen Besitz sich das Exemplar befindet, ist mir nicht bekannt.

ferrugineus L. Surul, Kerzer Geb., Kronstadt, Schulergeb., Bihargebirge (Bielz); Malomvitz, Bistra (auf frisch gesägten Fichtenbrettern), Frecker Geb. (Serbota, unter Fichtenrinde), Szurdukpass (an frisch geschälten Fichtenstämmen), Borsék (c. a.).

435. Rhizophagus Herbst.

Die Arten leben unter Baumrinden, an gefälltem Holz, zuweilen in morschem Holz, faulenden Ver-gabiliem etc.

depressus F. Hosszufalu (Bielz); Schuler-gebirge (Deubel).

ferrugineus Payk. Hászeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Götzenberg, Kerzer Ge-birge (Bielz); Rodnagelgebirge, Rosenau (Bucsecsgebiet, Deubel).

perforatus Er. Bodzaer Gebirge (Méhely); Schulergelgebirge, Bucsecs (Deubel).

parallelocollis Gyll. Hászeg (Bielz); Kronstadt (Zinne), Mezsásmond (Méhely); Marosujvár, Schässburg (c. a.); Honig-berg (Deubel).

Brancsiki Reitter. Hermannstadt (junger Wald, 6 Exemplare, c. a.).

Rh. **Brancsiki** Reitter. Länge 3'4—3'9 mm. (♂ ♀)

Statura Rh. parallelocollis, sed praesertim antice latior, testaceus, caput prothoraxque saepè paulo obscuriora. Caput prothorace angustius, post oculos breve, parallelum, retroversus haud angustum, punctatum, nitidum, vertice transversim noainhil impressum; oculi sat convexi, promineat; antennarum articulatum tertium secundo sesquiongius. Prothorax latus, medio nonnihil depresso, latitudine paulo laogior, obo-vatus, lateribus rotundatis, postice paulum modo magis angustatis quam apicem versus, angulis anterioribus rotundatis, medio disci disperse sat valde punctatus. Elytra prothorace nonnihil angustiora, lateribus medio nonnihil rotundato-ampliatis, pone medium rotundato-angustata, striato-punctata, subtilissime coriacea, minus nitida. Corpus subtus medio subtiliter disperse punctulatum.

Mas: abdominis segmento primo medio depresso.

Von Rh. parallelocollis Gyll. unterscheidet sich die neue Art durch etwas gewölbter Gestalt, in beiden Geschlechtern kleineren, weniger dicht punktierten Kopf; der Halsbild ist fast ebenso grob, aber weniger dicht, die Streifen der Flügeldecken auf der Basis etwas stärker punktiert, das dritte Fühlerglied etwas kürzer als bei Rh. parallelocollis, die Vorderecken des Halsschildes vollkommen abgerundet. Von Rh. perforatus Er. unterscheidet sie sich ausser durch die Halsschildform durch stärker vorquellende Augen, nach hinten nicht verengten und nicht eingescürten, vollkommen parallelen Hals, kürzeres drittes Fühlerglied.

Von Rh. nitidulus F. weicht die neue Art ab durch geringere Grösse, flacheren Körper, weniger dicht punktierten Halsschild, in beiden Geschlechtern schmäleren Kopf, stärker gewölbte Augen, stärker punktiert gestreifte Flügeldecken, weniger starke Aussenecke der Vorderschienen etc.; von Rh. bipustulatus F. durch breitere Gestalt, parallele Schläfen, gröbere Halsschild-punktiierung, breiteren Halsschild etc.; von Rh. dispar Payk. durch breitere, flachere Gestalt, in beiden Geschlechtern kleineren Kopf mit kürzeren parallelen Schläfen, etwas weniger gewölbten, breiteren, nach hinten verengten, auf der Scheibe flacheren, gröber und zerstreuter punktierten Halsschild, gröbere Punkstreifen der Flügeldecken, hellere Färbung etc. Unbekannt blieben mir die wohl nahe verwandten Rh. Habbenfeldi Tourn aus Russland und Rumänien und Rh. Brancsiki Reitter aus Bosnien und Herzegovina.

Herr Reitter, dem ich die neue Art zugesendete, war zuerst der Ansicht, es dürfe die neue Art (die ich als Rh. brevicornis beschrieben hatte) Rh. dispar v. Gyllenhali Thoms. sein. Ich kann mich dieser Ansicht aus den oben angeführten Gründen nicht anschliessen. Später hat Reitter (Wiener Z. XXIX, 206, 1910) die neue Art mit Rh. Brancsiki Reitter identifiziert, welche Nequigaoa (L'Abeille XXXI, 1909, 103—119, also nach dem Erscheinen des Catalogus Col. Eur. Heyden etc. 1906) als Synonym des Rh. dispar v. Gyllenhali Thoms. eingezogen hatte, und seine Art nach nochmaliger Untersuchung seines aus der Herzegovina und Bosnien stammenden Materials und der sieben-

bürgischen Stücke als gute Art aufrecht erhalten, worin ich ihm beipflichten muss, wenn unsere sieben. Tiere tatsächlich mit seinen Tieren von obgenannter Herkunft übereinstimmen. Ich habe auf diese Untersuchungen hin meiner Art den Namen Rh. Brancsiki Reitter substituiert und die Beschreibung stehen lassen, weil ohnehin nicht jedem Reitters Beschreibung zur Verfügung stehen wird.

nitidulus F. Fogarasch (Bielz); Frecker Gelirge (Serbota), Borszék, Schulergebirge, Ober-Kerz (Glashütte, e. a.).

dispar Payk. Hermannstadt, Präsbe, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszuvalu (Bielz); Resinar, Götzenberg (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagelirge (c. a.); Detunata (Mallász).

bipustulatus F. Hátszeg, Gross-Scheuern, Götzenberg, Porcesset, Surul, Kerzer Gebirge, Hosszuvalu, Schässburg (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagelirge, Rotenturm, Malomvitz, Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

politus Hellw. Hátszeg, S.-Regen, Dees (Bielz); Rotenlurm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schässburg, Marosujvár (c. a.); Rodnagelirge, Kronstadt (Deubel).

parvulus Payk. Schielthal, Zibinsgebirge (Bielz); Götzenberg, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Zernest (Deubel).

(Anomophagus.)

eribratus Gyll. Zibinsgebirge, Fogarasch (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Bucsees (alpin, in der Nähe von Krummholz aus Grasbüscheln gesiebt, Deubel).

(Cyanostolus.)

aeneus Richter. Hermannstadt (j. W., Bielz).

XXVIII. Cucujidae.

Monotomini.

436. Monotoma Herbst.

(Gyrocecis.)

quadrifoveolata Aub. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz).

conicollis Guer. Kronstadt (Deubel); Klausenburg (bei formica rufa, Müller).

angusticollis Gyll. Schässburg (in den Nestern der formica rufa und pratensis, c. a.); Kronstadt (Deubel).

Monotoma s. str.)

spinicollis Aub. Hátszeg (Bielz).

picipes Herbst. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Arpascher Gebirge, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Schässburg (c. a.); Rodnagelirge, Kronstadt (Deubel).

var. **cavieula** Reitter. Baassen (c. a., auf Salzboden).

quadridentata Thoms. (brevicollis Aub.) Schässburg (c. a., Fuchsloch an Holzspänen); Kronstadt (Deubel).

bicolor Villa (quadricollis Aub.). Hátszeg (Bielz); Alsó-Rákos (c. a.); Várhegy (Deubel).

longicollis Gyll. Hermannstadt (Bielz); Rodnagelirge (alpin, 1 Exemplar aus Grosbüscheln gesiebt, Deubel).

Silvanini.

437. Silvanus Latreille.

(Orizaephilus.)

surinamensis L. Hermannstadt (Bielz); Bistriz (c. a., in einem Hause mit Kornspeichern auf dem Aufboden in ungeheuerer Menge).

(Silvanus i. sp.)

bidentatus F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Schässburg (c. a., unter Eichenrinde).

unidentatus F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, unter Baumrinden. fagi Guer. Schässburg, Fuchsloch, gesiebt, März 1898, c. a.).

438. Chatartus Reiche.

advena Waltl. Várhegy (Deubel).

Psammoecini.

439. Psammoecus Latreille.

bipunctatus F. Kronstadt (Gespreg, von Sumpfpflanzen gekötschert oder gesiebt, Deubel).

var. **Boudieri** Luc. Schässburg (Mündung des Schustergralens in die Kokel aus Blättern gesiebt, c. a.); Kronstadt (mit der Stammform, Deubel).

Uleiotini.

440. Uleiota Latreille.

(Hyliota Reitter, Hyleota Seidl.)

planata L. Durch das ganze Geliet verbreitet, unter Baumrinde.

441. Dendrophagus Sehönherr.

erenatus Payk. Hátszeg (Malomvitz), Kronstadt (Bielz); Bistra (unter Fichtenrinde, selten, c. a.); Schulergebirge (Deubel).

Cueujini.

442. Cueujus Fabr.

cinnaberinus Scop. (sanguinolentus L.). Schässburg (Lattertgraben, April, unter Eichenrinde), Borszék, Rodnagelirge (Bielz); Nussbach (10. Mai), Tusnád (11. September, unter Birken- oder Espenrinde, Deubel); Ratosnya (Müll.).

haematoches Er. Tusnád (Bielz, Deubel, unter Fichtenrinde); Schulergeb. (Juni, Deubel).

443. *Pediaetus Shuckard.*

depressus Herbst. Fogarasch (Bielz); Schässburg (Bielz, im Holze alter Eichen, c. a.); Hászeg (c. a.); Klausenburg (Müller).

dermestoides F. Gross - Scheuern. Neudorf b. H., Holznengen, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hászeg, Schässburg (c. a.); Götzenberg (Ormay); Nussbach (Deubel).

fuscus Er. Hermannstadt (Bielz).

444. *Phloeostichus Redtenbacher.*

denticollis Redt. Kerzer Gebirge (Bielz).

Laemophloclini.

445. *Laemophloeus Stephens.*

(Leptus.)

monilis F. (denticulatus, Preyssl.). Gross-Schenk (Bielz); Kronstadt (Zinne), Szováta, Schässburg (unter Buchenrinde und an trockenen Buchenästen, c. a.).

testaceus F. Hászeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Neudorf b. H., Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Gyögy (Ormay); Schässburg (unter Weiden- und Eichenrinde), Rotenturm (c. a.).

(Cryptolestes.)

bimaculatus Payk. Holzmengen (Bielz).

duplicatus Waltl. Hászeg, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Schässburg (unter Eichenrinde, Bielz); Nussbach, Honigberg (Deubel).

minutus Oliv. (pusillus Schönh.). Hermannstadt (Bielz).

ferrugineus Steph. Kronstadt (Noa, Deubel).

ater Oliv. Gross - Scheuern, Präsbe, S.-Regen (Bielz).

clematisidis Er. Hammersdorf, Gross-Scheuern, Talmesch (Bielz); Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel); S.-Regen (Müller).

corticinus Er. Hermannstadt (Bielz).

Passandriul.

446. *Prostomis Latreille.*

mandibularis F. Hermannstadt, Kastenholz b. H. (Bielz); Schässburg (Langheltgraben, in mulmig zerfallenden Eichenstämmen im Mai in grosser Anzahl sarut den weissen, zarten, flachen Larven, c. a.).

XXIX. Cryptophagidae.

Telmatophilini.

447. *Telmatophilus Heer.*

sparganii Ahrens. Kronstadt (Gespreng, von Schilf gekötschert, Deubel).

caricis Oliv. Hermannstadt (Bielz); Schässburg, Kokelufer gekötschert, Mai, c. a.); Kronstadt, Honigberg (Deubel).

brevicollis Aubé. Hászeg (Bielz).

typhae Fall. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. *pumilus* Reitter. Zusammen mit der Stammform.

Schönerri Gyll. Kronstadt (Gespreng, Deubel).

Cryptophagini.

448. *Paramecosoma Curtis.*

melanocephalum Herbst. Hermannstadt, Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg (Kokelufer im Geniste häufig, c. a.); Kronstadt, Vargyastal (Deubel).

449. *Henoticus Thomson.*

serratus Gyll. Zood, Kerzer Gebirge (Bielz); Rodnagebirge, Nagyhagymás, Kronstadt (Deubel).

450. *Pteringium Reitter.*

crenatum Gyll. Bistra (wahrscheinlich unter Fichturinde, c. a.); Bodzaer Gebirge, Schulergebirge (Deubel).

451. *Micrambe Thomson.*

vini Panz. Hermannstadt, Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg (Fuchsloch unter Weissbucherinde, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

abietis Payk. Zibinsgebirge (Bielz); Boroszék, Balánhánya (Egyeskkő, c. a.).

452. *Cryptophagus Herbst.*

Die Arten führen sehr verschiedene Lebensweise in und auf pflanzlichen und tierischen Stoffen, einige leben in Ameisenkolonien und Wespennestern.

(Micrabinus.)

bimaculatus Panz. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

(*Cryptophagus* i. sp.)

pubescens Strm. (lapponicus Reitter). Hammersdorf (Bielz); Baassen (c. a.); Kronstadt (Gespreng), Wolkendorf bei Kr. (Deubel).

C. lapponicus Gyll. ist eine gute Art und nicht Synonym des C. pubescens; er gehört dem Norden Europas an und kommt bei uns wohl nicht vor.

subdepressus Gyll. Topánfalva (siebenb. Erzgebirge, c. a.).

- scanicus** L. Hermannstadt, Kerzer Geb., S.-Regen (Bielz); Malomvitz, Balánbánya, Schässburg (c. a.); Rodnagelb., Bodzaer Gebirge (Deubel).
a. patruelis Strm. Schässburg (Fuchsloch), Gross-Alischer Kuppen von Geesträuch geklopft, c. a.).
Thomsoni Reitter. Baassen, Schässburg (c. a.); Håtszeg, Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).
cylindrus Kiesenw. Kerzer Gebirge (Bielz); Schulergebirge, Bucsecs (Deubel).
saginatus Strm. Hermannstadt Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg (in alten Eichen bei Lasius brunneus, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
subfumatus Kr. Toroczkó, Schässburg (in Eichenmulm, c. a.).
dentatus Herbst. Kerzer Gebirge, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Ratosnya, Schässburg (in Eichenmulm), Bistra (c. a.); Hermannstadt (auf blühendem Crataegus und an Weinfässern, Ormay); Rodnagelbirge, Kronstadt (Deubel).
pallidus Strm. Kronstadt (Zinne). Büdös, Schässburg (c. a.); Bucsecs-Gebiet (Deubel).
inaequalis Reitter. Büdös (c. a.).
labilis Er. Håtszeg (Bielz); Rodnagelbirge, Schässburg (Fuchsloch, gekötschert, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
scutellatus Newm. Hermannstadt (Bielz); Ober-Komana (Méhely); Håtszeg, Kronstadt (Deubel).
pumilio Ganglb. Schässburg (Fuchsloch, 1 Exemplar gekötschert, c. a.).
dorsalis Sahlborn. Kronstadt (Bielz); Nagybagymás (Deubel).
distinguendus Strm. Gross-Scheuern, Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a., Holzkeller).
fumatus Marsh. Håtszeg, Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.).
querinus Kr. Büdös, Schässburg (c. a.); Rodnagelbirge, Bucsecs (Deubel).
hamatus Ganglb. Schässburg (in einer alten von Lasius brunneus bewohnten Eiche), Baassen (c. a.).
posticus Reitter. Bistra, Csukás (c. a., vidit Reitter).
C. posticus Reitter hat nach meinen Exemplaren die Grösse und Form des C. reflexicollis und die Färbung des C. axillaris Reitter, weicht von beiden ab durch hellere, rötlich-gelbe Färbung und die Lage des Lateralzähnchens dicht hinter der Mitte der Halschildseiten. In der Punktierung der Oberseite stimmt er ebenfalls mit meinem C. axillaris überein, ebenso in der Form des Halschildes und der Flügeldecken. Der Halschild meines C. posticus ist am Hinterende deutlich breiter als lang. Seine gegenwärtige Stellung im Katalog ist nach meinen Exemplaren nicht richtig, er gehört unzweifelhaft, nach dem Vorgange Ganglbauers, zwischen C. axillaris und reflexicollis als ein echter *Mnionomus*. Reitter, dem ich das Exemplar vorlegte, teilte mir mit, dass er die Art nicht besitze, dass jedoch das vorliegende Stück C. posticus sein könne.

- fuscicornis** Strm. Håtszeg, Rotenturm, Schässburg (c. a.).
badius Strm. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Schässburg, Büdös (c. a.).
acutangulus Gyll. Håtszeg, Kerzer Gebirge (Bielz); Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
cellaris Scop. Hermannstadt, Grossscheuern, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Karlsburg (c. a.); Schulergebirge, Alsó-Rákos (Deubel).
affinis Strm. Hermannstadt (Bielz); Kronstadt, Nagybagymás (Deubel).
Skalitzkyi Reitter. Schässburg (2 Exemplare in Lindenmulm, c. a.).
Milleri Reitt. Baláubánya (Egyeskö, c. a.); Rodnagelbirge, Kronstadt (Deubel).
pilosus Gyll. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Håtszeg, Kronstadt (Deubel).
lyeopardi Herbst. Håtszeg (Bielz); Schässburg (Fuchsloch, am Waldrande unter Laub, 28. Juli, c. a.).
setulosus Strm. Rotenturm (c. a.); Hermannstadt (Alter Berg, Ormay); Kronstadt (Deubel).
Schmidtii Strm. Karlsburg, Alsó-Rákos, Schässburg (1 Exemplar im Hausrat, 1 Exemplar im Reissel, c. a.); Kronstadt (Deubel).
(Mnionomus.)
nitidulus Mill. Hermannstadt (Bielz); Baassen, Schässburg (Fuchsloch, von einer Hecke geklopft, Breite aus Eichenholz oder Mulm gesiebt, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel, Méhely).
axillaris Reitter. Kerzer Gebirge (Buleatal). Schässburg, Frecker Geb. (Sorbota, c. a., vidit Reitter); Bucsecs, Schulergebirge (Deubel).
reflexicollis Reitter. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Malomvitz (Lunka negru, c. a.); Rodnagelbirge (Deubel); Götzenberg (Ormay).
Deubeli Ganglb. Bucsecs, Rotenturm, Schässburg, Büdös, Toroezkó, Borszék (c. a.); Nagybagymás, Schulergebirge (Deubel).
C. baldensis Er., den Bielz aus dem Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, aus Fogarasch und Kronstadt anführt, ist jedenfalls aus unserem Käferverzeichnis zu streichen, da diese Art den Pyrenäen und den italienischen Alpen (Monte Baldo) angehört. Bielz kannte die beiden von Ganglbauer erst 1897 beschriebenen neuen Arten C. Deubeli und transsylvaniaicus nicht. Nach Ganglbauer (Käfer von Mitteleuropa III, 695 Anmerkung) scheinen von C. baldensis bis jetzt nur vier Exemplare bekannt zu sein. Die Bielzschen Fundorte des C. baldensis gehören zu Deubeli und dem selteneren transsylvaniaicus.
transsylvaniaicus Ganglb. Schässburg (c. a.); Bucsecs (Deubel)

453. *Spaniophaenus Reitter.*

laticeollis Mill. Surul (Bielz).

454. *Antherophagus Latreille.*

Die Arten dieser Gattung leben auf den Blüten niedriger Pflanzen, ihre Larven in Hummelnestern.
nigricornis F. Schieltal, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Bistra, Borszék (c. a.); Kronstadt (Zinne), Zernest (Deubel).

sitaceus Herbst. Kronstadt (Bielz); Nagyenyed (c. a.); Schulergebirge (Deubel).
pallens Oliv. Zibinsgebirge, Zood, Kronstadt (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel, c. a.); Borszék (c. a.).

Atomariini.

455. *Caenoscelis Thomson.*

ferruginea Sahlb. Präsb., Fogarasch (Bielz); Schässburg (Scherkes, c. a.).
Fleischeri Reitt. Hátzegere Gebirge (subalpin, Deubel).

456. *Grobenia Holdhaus.*

timetaria Herbst. Schässburg (NE-Abhang der Breite, gesiebt, 13. April, c. a.); Schulergebirge, Kronstadt (Deubel).

457. *Atomaria Stephens.*

Die Arten leben unter verwesenden Pflanzenteilen.

(*Atomaria s. str.*)

Wollastonii Sharp. Karlsburg (Bielz).

carpathica Reitter. Csukás (c. a.).

umbrina Gyll. Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel).

acutifrons Ganglb. Schässburg (Schleifengraben, Juli, c. a.).

bella Reitt. Büdös (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

nigriventris Steph. Hermannstadt, Kezer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Hátzeg, Kronstadt (Deubel); Unter-Kerz, Előpatak, Schässburg (c. a.).

linearis Steph. Hermannstadt, Gross-Scheuern, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Bielz).

diluta Er. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (Fuchsloch, Atollhill, an feuchten Stellen unter Laub, c. a.).

alpina Heer. (*elongatula* Er.), Gross-Scheuern (Bielz); Balánhánya (Egyeskő), Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Schulergebirge, Zernest (Deubel).

procerula Er. Kerzer Gebirge (Bielz).

prolixa Er. Schässburg, Büdös (c. a.); Schulergebirge, Kronstadt (Zinne, Deubel).

pulchra Er. Büdös (c. a.); Hátzeg, Kronstadt, Bucsecsgebiet (Deubel).

impressa Er. Schässburg (Türkenhill, Kokelufer oder Röhricht an sumpfiger Stelle, 24. Oktober, c. a.).

fuscicollis Mannh. Hermannstadt, Talmesch, Baumgarten (Ormay); Präzs-

már, Obervenezie (Méhely); Marosuvárvár, Schässburg (c. a.); Rodnaggeb., Kronstadt (Denhel).

mundula Er. Kronstadt (Deubel).

unifasciaetus Er. Rotenturm (Altufer unter Steinen, nicht selten, c. a.).

grandicollis Bris. Rodnagebirge (Deubel).

mesomelaena Herbst. Fogarasch (Bielz); Kronstadt (Deubel).

gutta Steph. Gross-Scheuern (Bielz).

gravidula Er. Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg (Kokelufer im Geniste, c. a.); Honigberg (Altufer, Deubel).

fuscata Schönh. Hermannstadt, Fogarasch, S.-Regen (Bielz); Rotenturm (c. a.); Hátzeg, Kronstadt, Zernest, Rodnagebirge (Denhel).

africapilla Steph. Kronstadt (Zinne), Schulergebirge, Rodnagebirge (Deubel).

Zetterstedti Zett. Baróth (Méhely); Honigberg (Altufer, Deubel).

peltata Kr. Hermannstadt (Ormay); Schässburg (Siechhofberg, c. a.); Honigberg (Altufer, Deubel).

fuscipes Gyll. Hermannstadt (Bielz); Karlsburg, Brassen (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

pusilla Payk. Hermannstadt, Gross-Scheuer, Neudorf b. H., Kastenholz, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Baassen, Alsó-Rákos, Hátzeg (c. a.); Gyógy (Ormay); Rodnagebirge (Deubel).

nigripennis Payk. Reps (Bielz)

Afilla Reitter. Rotenturm (c. a.).

turgida Er. Hátzeg, Vargyastal, Honigberg, Erösd (Altufer), Rodnaggeb. (Deubel).

apicalis Er. Hammersdorf, Grossscheuern, Kronstadt (Bielz); Karlsburg, Schässburg, Marosuvárvár, Rotenturm (c. a.).

ruficornis Marsh. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Gyéke (Bielz); Schässburg, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

analysis Er. (testacea Bielz nec Steph.). Hermannstadt (Bielz); Baumgarten, Talmesch (Ormay); Schässburg (c. a.); Hátzeg, Kronstadt (Deubel).

Deubeli Holdhaus. Rodnagebirge (Kuhhorn, alpin aus Grashüscheln gesiebt, Deubel).

cognata Er. Schässburg (c. a.).

var. **rubida** Reitter. Schässburg (c. a.).

formosa Reitter. Rotenturm (c. a.).

gibbula Er. Gross-Scheuern, Gross-Scheuk, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

var. **mehadiensis** Ganglb. Hátzeg (Deubel).

458. *Ootypus Ganglbauer.*

globosus Waltl. (*nigriclavus* Reitter). Gross-Scheuern, Gyéke (Bielz); Rotenturm, Schässburg (Kokelufer, c. a.).

459. *Ephistemus Stephens.*

(*Ephistemus* s. str.)

globulus Payk. Kronstadt (Bielz); Malomvitz, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Rodnagebirge alpin. Deubel.
var. **dimidiatus** Sturm. Hermannstadt, Gross-Scheuern, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel).
(*Curelius*).
exigens Er. Hermannstadt (Bielz).

XXX. Erotylidae.

460. *Tritoma Fabr.*

(*Cyrtotriplax* Crotch.)

bipustulata F. Hâtszeg, Götzenberg, Fogarascher Gebirge, Kerzer Geb., Kronstadt, Marosgeb., Dees (Bielz); Karlsburg, Schässburg (an verpilzten Eichenstumpfen, c. a.); Resinar (Ormay).

461. *Triplax Paykall.*

Die Arten leben auf Baumpilzen.

aenea Schall. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

elongata Lac. Schässburg (Witeberg, c. a.).
russica L. Hâtszeg, Retjezat, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Marosgebirge (Bielz); Schässburg, Csukás (c. a.); Rotenturm (Deubel).

pygmaea Kr. Schässburg (Kokelufer im Detritus, c. a.).
(*Platychna*.)

scutellaris Charp. Bistra, Rotenturm, Csukás, Zalatna (c. a.); Kronstadt (Deubel); Marosgebirge (Müller).

var. **Gyllenhali** Crotch (bicolor Gyll.). Retjezat, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Piatra mare, Bozauer Pass, Marosgebirge (Bielz).

carpathica Reitter. Csukás (zusammen mit T. scutellaris auf Baumpilzen, 1 Ex, c. a.).

lepidia Falb. Schässburg, Rotenturm (c. a.); Hâtszeg, Rosenau (Deubel).

rufipes F. Hâtszeg, Gross-Scheuern (Bielz); Rotenturm (Ormay, Deubel, c. a.); Marosgebirge (Müller).

collaris Schall. Rotenturm (c. a.).

Daenini.

462. *Dacne Latreille.*

Die Arten leben wie die vorigen.

notata Gmel. Hâtszeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Csukás (c. a.); Honigberg (Deubel).

rufifrons F. Rotenturm, Unter-Kerz, Kerzer Gebirge, Mediasch (Bielz); Kronstadt, Csukás (c. a.).

bipustulata Thunberg. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

463. *Combocerus Bedel.*

glaber Schall. Hâtszeg, Götzenberg, Kronstadt (Bielz); Stolzenburg, Hermannstadt (Ormay); M-Vasárhely Müller.

Diphyllini.

464. *Diphyllus Stephens.*

tunatus F. Zibinsgebirge (Bielz); Kronstadt, Hâtszeg (Deubel); Oler-Komana (unter Rotbuchenrinde, Méhely).

465. *Diplocoelus Guerin.*

fagi Chevr. Kronstadt (Zinne, Bielz, Deubel, c. a.); Rotenturm (Ormay); Szováta, Schässburg (c. a.).

XXXI. Phalacridae.

466. *Phalaenus Paykull.*

grossus Er. Hammersdorf (Ormay); Kronstadt (Deubel).

hybridus Flach. Siebenbürgen.

timcastri F. (*corruceus* Panz.). Hâtszeg, Cirelsau, Marpod, Reps, Balánbánya, S.-Regen, Zál (Bielz); Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Ormay); Kronstadt, Frecker Gebirge (Serbota), Schässburg (c. a.).

var. **Humberti** Rye. Kronstadt (Zinne, Méhely).

caricis Strm. Szamosujvár (Méhely); Honigberg (Altufer, Deubel).

467. *Olibrus Erichs.*

aeneus F. Kronstadt (Zinne, Méhely).

millefolii Payk. Neudorf b. II., Mediasch (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Schässburg, Borszék (c. a.).

corticalis Panz. Frecker Gebirge (Leitatal bei der Sägemühle im Sägespannen, Schässburg (Fuchsloch, c. a.).

Gerhardtii Flach. Zalatna, Schässburg (Breite, auf Senecio (c. a.)).

aenescens Küst. Szamosujvár (Méhely); Schulengebirge (Deubel).

Das Vorkommen dieser Art bei uns ist näher zu prüfen, da sie dem westlichen Europa angehört.

bisignatus Men. Déva, Karlsburg (c. a.).

flavicornis Sturm. Hermannstadt (Ormay); Hâtszeg (c. a.).

liquidus Er. Hâtszeg (Bielz); Rotenturm, Hermannstadt (J. W., c. a.).

affinis Strm. Mühlbach, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen, Zál (Bielz); Gyögy (Ormay); Schässburg, Ober-Kerz (Glaslütte), Retjezat (c. a.); Hâtszeg, Rosenau, Törzburg (Deubel).

bicolor F. Hâtszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Zood, Schässburg, Reps, Elöpatak, S.-Regen, Záli (Bielz); Rotenturm, Hammersdorf, Klausenburg, Alsó-Rákos, Borszék, Ratosnya (c. a.); Kronstadt (Deubel).

bimaculatus Küst. Reps, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

468. *Stilbus Seidlitz.*

testaceus Panz. Neudorf b. H., Holzmen-gen, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Her-mannstadt (Ormay); Déva (c. a.); Kronstadt (Deubel).

atomarius L. Marpol (Bielz); Prázsmár, Szamosujvár (Méhely); Schässburg, Balánbánya (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. **picatus** Flach. Kronstadt (Deubel).

oblongus Er. Hermannstadt, Baumgarten (Ormay); Kronstadt (Deubel).

XXXII. Latridiidae.

Dasycerini.

469. *Dasycerus Brongniart.*

sulcatus Brongn. Klausenburg (Bielz).

Lathridiini.

470. *Lathridius Herbst.*

Die Arten leben in verwesenden organischen Stoffen, in Pilzen, unter Baumrinden etc.

tardarius Dey. Schanta (Ormay).

angusticollis Gyll. (angulatus Mannh.). Ret-jezat, Fogarasch (Bielz); Unter-Kerz, Zalatna, Baassen, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Rodnagebirge, Kronstadt, Zernest (Deubel).

Pandellei Bris. Balánbánya (auf frisch gesägten Fichtenbrettern), Oláhfalu c. a.).

campicola Gerhardt, d. ent. Z. 1911. 283. Schässburg (c. a.).

alternans Mannh. Porcsest, Surul (Bielz); Büdös, Csukás, Rotenturm (c. a.).

rugicollis Oliv. Hermannstadt, Neudorf b. II., Giresan (Bielz); Oláhfalu (c. a.); Rodnagebirge, Bucsecs, Schulergebirge (Deubel).

471. Enicmus Thomson.

Die Arten leben wie die vorigen. (Conithassa.)

hirtus Gyll. Präsbe, Freck, Kerzer Geb., Schässburg (Bielz); Rodnagebirge, Bü-dös, Elöpatak, Csukás, Malomvitz (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

minutus L. Hermannstadt, Zibinsgebirge, Harbachufer, Schässburg (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Unter-Kerz,

Elöpatak, Balánbánya, Baassen (c. a.); Rotenturm, Szamosujvár (Ormay); Rodnagebirge, Kronstadt, Zernest (Deubel).

consimilis Mannh. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); Rotenturm, Zood (Ormay); Rosenau (Bucsecs - Gebiet, Deubel).

brevicollis Thoms. Kerzer Gebirge (Bielz). (Enicmus i. sp.)

testaceus Steph. Kronstadt (Deubel).

rugosus Herbst. Hâtszeg, Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Elö-patak, Rodnagebirge (c. a.).

transversus Oliv. Hâtszeg, Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Unter-Kerz, Balán-bánya, Schässburg, Bodnagebirge, Zala-tina, Puj (b. Hâtszeg, c. a.); Michelsberg, Rotenturm (Ormay).

brevicornis Mannh. Kronstadt (Zinne, Deubel).

472. Cartodere Thomson.

Die Arten leben wie die vorigen, zuweilen auch in Ameisennestern.

elongata Curtis. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Schässburg (Bielz); Karlsburg, Elöpatak, Baassen (c. a.); Hâtszeg, Alsó-Rákos (Tepe, Deubel).

ruficollis Marsh. Hermannstadt (Bielz).

filiformis Gyll. Hâtszeg, Gross-Scheuern (Bielz); Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Corticarini.

473. Corticaria Marsham.

Die Arten leben wie die vorigen, auch unter Laub. (Brevina.)

ylvicola Bris. Kronstadt (Bielz).

Der Catalogus col. Europae 1906 weist die Art nur aus den Pyrenäen nach, Bielz's An-gabe bedarf daher der Bestätigung. (Corticaria i. sp.)

pubescens Gyll. Retjezat, Hâtszeg, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (Kokel unter Geniste), Unter-Kerz (Altufer, ebenso, c. a.); Schanta, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rodnagebirge (Deubel).

fulva Com. Kronstadt, Erösd (Altfluss), Zaizon (Deubel).

umbilicata Beck. Schässburg (Fuchsloch), Alsó-Rákos (Tepe, c. a.); Kronstadt (Deubel).

impressa Oliv. (denticulata Gyll., badia Mannh.). Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Schanta, Rotenturm (Ormay); Schässburg (Fuchsloch, c. a.).

abietum Motsch. (interstitialis Reitter). Balánbánya, Frecker Gebirge (Serbota), Bistra (c. a.); Kerzer Gebirge (Or-may); Paringul, Nagyhagymás, Schulergebirge (Deubel).

- robusta** Ganglb. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Kronstadt (Deubel).
- linearis** Payk. Kerzer Gebirge (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Rodnagelirge, Deubel).
- Eppelsheimi** Reitter. Frecker Geb. (Serbota, c. a.).
- foveola** Beck. Kerzer Gebirge (Bielz); Rodnagelirge (Deubel).
- longicollis** Zett. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Előpatak, Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagebirge (c. a.); Rotenturm, Präsbe (Ormay); Kronstadt (Deubel).
- serrata** Payk. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge. Kronstadt, Marienburg b. Kr., Schässburg, S.-Regen (Bielz); Zalatna, Balánbánya c. a.); Hászeg (Deubel).
- saginata** Mannh. Baassen (c. a.); Schuler-Gebirge, Erösd (Altfuss, Deubel).
- obscura** Bris. Schässburg (Reissel, c. a., 1 Ex.).
- Pietschi** Ganglb. Schässburg (Mühlenham, 1 Ex. im Fluge gefangen, c. a.).
- elongata** Gyll. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Nächs.-Regen (Bielz); Hászeg, Karlsburg, Előpatak, Schässburg (in alten Eichen bei Lasius brunneus, c. a.); Kleinpold (Ormay); Kronstadt (Deubel).
- terruginea** Marsh. (fenestralis Reitter). Kerzer Gebirge (Bielz); Előpatak, Frecker Gebirge (c. a.); Rodnagelirge (Deubel).

474. *Melanophthalma Motschulsky.*

- transversalis** Gyll. (crocata Mannh.). Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Unter-Kerz, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel); Bistritz (Müller).
- var. **sericea** Mannh. (albopilis Reitter). Gyike (Méhely); Kronstadt (Deubel).
- distinguenda** Com. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Szováta (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- tuscipennis** Mannh. Kerzer Gebirge (Bielz); Unter-Kerz, Schässburg (c. a.). (Cottierina.)
- gibbosa** Herbst. Durch das ganze Berg- und Hügelland.
- similata** Gyll. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Unter-Kerz (c. a.); Schuler-Gebirge (Deubel).
- fuscula** Gyll. Hermannstadt, Kerzer Geb., S.-Regen (Bielz); Gross-Scheuern, Hammersdorf (Ormay); Unter-Kerz (c. a.); Rodnagelirge, Nagyhagymás (Deubel).
- var. **trifoveolata** Redt. Hászeg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- fulvipes** Com. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (Scherkes, c. a.).

truncatella Mannh. Hászeg, Hermannstadt (Bielz); Schässburg (Kokelufer, im Geiste, c. a.); Kronstadt (Deubel).

Holoparamecini.

475. *Holoparanteus Curtis.*

caularum Aub. Hermannstadt (Bielz); Unter-Kerz (wahrscheinlich am Klosterweiher aus Grasbüscheln gesiebt, c. a.).

XXXIII. Mycetophagidae.

Mycetophagini.

476. *Pseudotriphyllus Reitter.*

suluralis F. Zibinsgebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.).

477. *Triphyllus Latreille.*

bicolor F. punctatus (F.). Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Kleinpold, Gyögy (Ormay); Bülös, Schässburg (Baumpilze), Hászeg, Előpatak, Baassen (c. a.); Bodzaer Gebirge (Deubel).

478. *Mycetophagus Helwig.*

Die Arten leben auf Baumpilzen, oft trifft man sie unter Banmrinde. (Tritoma Müll. Reitter.)

quadripustulatus L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

a. **antemacularis** Torre (bipustulatus Schilsky). Tusnád, Kukukhegy (Erdővidék, Méhely); Fogarascher Gebirge, Csukás, Schässburg, Szurdokpass (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

var. **erythrocephalus** Fr. (impostulatus Schilsky). Sósmező (Méhely); Frecker Gebirge (Serbota), Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Bistritz, S.-Regen (Müller).

piecus F. Prázsmár (Méhely); Schässburg (c. a.); Honigberg (Deubel).

a. **sexpustulatus** F. Schässburg, Kronstadt (Zinne, Deubel).

a. **lunaris** F. Schässburg (c. a.); Honigberg (Deubel).

a. **undulatus** Marsh. Honigberg (Deubel).

a. **punctulatus** Schilsky. Schässburg (c. a.); Honigberg (Deubel).

a. **humeralis** Schilsky. Honigb. (Deubel).

dececpunctatus F. Hászeg, Zibins-Gebirge, Fogarasch, Marosgebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

atomarius F. Hermannstadt, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Unter-Kerz, Bükszad, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Csukás, Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Präsbe (Ormay); Kronstadt (Deubel).

quadriguttatus Müll. Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

multipunctatus F. Kronstadt, Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Präsbe (Ormay); Schässburg (c. a.); Bistritz (Müller).

fulvicollis F. Hermannstadt, Präsbe, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Schässburg (c. a., Eiche); Rosenau (Deubel).

var. **Deubeli** Méhely. Kronstadt (Méhely). (Philomyces.)

populi F. Hermannstadt, Präsbe, Sächs.-Regen (Bielz); Előpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel).

479. *Litargus Erichs.*

connexus Geofr. (bifasciatus F.). Hátszeg, Gross-Scheuern, Holzmengen, Götzenberg, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Präsbe (Ormay); Alsó-Rákos, Büdös, Schässburg, Klausenburg (c. a., unter Baumrinde, namentlich Espen- und Weidenrinde); Rosenau, Kronstadt (Deubel).

480. *Typhaea Curtis.*

stercorea L. (fumata L.). Klein-Cserged (b. Blasendorf), Neudorf b. Il., Gross-Schenk, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Baumgarten, Michelsberg, Rotenturm (Ormay); Klausenburg, Karlsburg (c. a.); Honigberg (Deubel).

XXXIV. *Sphindidae.*

481. *Sphindus Chevrolat.*

dubius Gyll. Kerzer Gebirge (Bielz); Előpatak, Schässburg (c. a.).

grundis Hampe. Klausenburg (Bielz).

482. *Aspidiphorus Latreille.*

orbiculatus Gyll. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Csukás, Schässburg (c. a., auf Pilzen); Kronstadt (Zinne, Deubel).

Von der Beschreibung Kiesenwetters (Naturg. d. Ins. Deutschlands, Anobiidae, p. 200) weicht unsere Art durch unpunktierten Kopf und durch die Fühlerbildung ab, indem das erste Glied der Fühlerkeule deutlich länger als breit, das zweite mindestens so lang als breit ist.

XXXV. *Cisidae.*

483. *Hendecatomus Muls.*

reticulatus Hbst. Kronstadt (Deubel).

484. *Xylographus Mellié.*

ostrochoides Dufour. Alsó-Rákos (Tepe, Mai, c. a., Deubel).

485. *Cis Latreille.*

Die Arten leben in Baumschwämmen. (Hadraule.)

striatulus Mell. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.).

comptus Gyll. Kerzer Gebirge (Bielz); Rosenau (Deubel).

(Eridaulus.)

lineatocribratus Mell. Kerzer Geb. (Bielz); Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).

nitidus Hbst. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Frecker Gebirge (Serbota), Alsó-Rákos, Rodnagebirge (c. a.); Tusnád, Bucsecs - Gebiet (Deubel).

Jacquemarti Mell. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Alsó-Rákos, Balánbánya (c. a.); Schuler - Gebirge (Deubel).

var. **glabratus** Mell. Kerzer Geb. (Bielz); Rodna - Gebirge, Alsó-Rákos (c. a.); Schulergebirge (Deubel); Marosgebirge (Müller).

(Cis i. sp.)

boleti Scop. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

var. **caucasicus** Men. Hátszeg, Schässburg (c. a.).

setiger Mell. (villosulus aut. nec Marsh.). Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt, Rodnagebirge (c. a.); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).

micans F. Hátszeg, Götzenberg, Ober-Sebes, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Rodnagebirge (c. a.).

hispidus Gyll. Hátszeg, Zibinsgeb., Gross-Scheuern, Kerzer Geb., Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Klausenburg (c. a.); Resinar (Ormay).

quadridaeus Mell. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Zalatna (c. a.).

fissicollis Mell. Kronstadt (Bielz).

Perrisi Abeille. Schässburg, Malomvitz (c. a.).

atni Gyll. Neudorf b. Il., Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt, Büdös (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay).

bidentatus Oliv. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagebirge, Schässburg, Balánbánya (c. a.); Resinar (Ormay).

festivus Gyll. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); Hátszeg, Neustadt b. Kr. (Deubel).

oblongus Mell. (pygmaeus aut.). Kronstadt (Bielz).

vestitus Mell. Kerzer Gebirge (Bielz).

- castaneus** Mell. Hátszeg, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Előpatak (c. a.); Hermannstadt (Ormay).
punctulatus Gyll. Schulergelände (Deubel).
fissicornis Mell. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Baassen, Hátszeg (c. a.); Wolkendorf b. Kr. (Deubel).

486. Rhopalodontus Mellié.

- Rh. valachiae Reitter, den Bielz anführt, ist nach Seidlitz (Fauna transs., p. 530) un- aufgeklärter noch in literis (Sammlungsnamen).
fronticornis Panz. Hátszeg, Grossscheuern, Fogarasch (Bielz); Schässburg, Balánbánya (c. a.); Resiuar (Ormay); Kronstadt, Nussbach (Deubel).
perforatus Gyll. Präsbe, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); Nussbach (Deubel).

487. Ennearthron Mellié.

- Wagae** Mell. Kerzer Gebirge (Bielz); Rodnagbirge (c. a.).
affine Gyll. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bükszár (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Bodnagbirge (c. a.); Rotenturm (Ormay).
cornutum Gyll. Gross-Scheuern, Ober-Sebes, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel); Marosgeb. (Müll.).
laricinum Mell. Freeker Gebirge (Serbota, c. a.).

488. Octotemnus Mellié.

- glabriulus** Gyll. Hátszeg, Zibinsgebirge, Ober-Sebes, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Retjczat, Ober-Kerz (Glashütte), Karlsburg, Schässburg (c. a.).
(Orophilus.)
mandibularis Gyll. Zibius-Gebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Borszék (Bielz); Schässburg, Rotenturm (c. a.); Götzemberg (Ormay).

XXXVI. Colydiidae.

Die Arten sind Holz- und Rindentiere.

Colydiini.

489. Colidium Fabr.

- elongatum** F. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
filiforme F. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt (Bielz).

Aglenini.

490. Aglenus Erichs.

- brunneus** Gyll. Hermannstadt, Grossscheuern, Neudorf b. Il. (Bielz).

Ditomini.

491. Ditoma Herbst.

(Synchitodes Crotch.)

- crenata** F. Durch das ganze Gebiet verbreitet unter Baumrinde.

492. Colobicus Latreille.

- marginatus** Latr. (emarginatus Er.). Grossscheuern, Rotenturm, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Alsó-Rákos (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Nussbach, Honigberg (Deubel).

493. Synchita Helwig.

(Ditoma Crotch. Reitter.)

- humeralis** F. (juglandis F.). Hermannstadt (Bielz); Schässburg (Burg, im Fluge gefangen, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

494. Cicones Curtis.

- variegatus** Hellw. Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).
pictus Er. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (von Hecken geklopft), Büdös (c. a.); Kronstadt (Deubel).

495. Endophloeus Erichs.

- Markovichiana** Pill. (spinulosus Latr.). Präsbe, Fogarascher Gebirge (Bielz); Rotenturm (aus einem verpilzten Rotbuchenstamm, c. a.).

Orthoerini.

496. Orthocerus Latreille.

- clavicornis** L. (muticus L.). Präsbe (Bielz); Borszék, Schässburg (Breite, unter Moos, c. a.); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt (Zinne, Deubel); Klausenburg (Müller).

Corticini.

497. Corticus Latreille.

- tauricus** Germ. Kerzer Gebirge (Bielz);
tuberculatus Germ. In allen Gebirgswäldern unter Baum-, namentlich unter Tannenrinde, aber auch im Bergland, so in Schässburg unter Eichen- und Buchenrinde.

Apistini.

498. Apistus Motsch.

- Rondanii** Villa. Hátszeg (Paros, Bielz).

Coxellini.

499. Diodesma Latreille.

- subterranea** Duponch. Zibinsgeb. (Bielz).

Tarphlini.**500. Laugelandia Aubé.**

anophthalma Aub. Gross - Scheuern (Bielz).

Pycnomerini.**501. Dechomus Duval.**

sulcicollis Germ. Ober - Sebes, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Schässburg (im Holz und unter der Rinde alter Eichen und Eichenstümpfe).

502. Pycnomerus Erichs.

terebrans Ol. Hermannstadt, Holzmengen, S - Bogen (Bielz); Honigberg, Schässburg (im Holze alter Eichen, c. a.).

Myrmecoxenini.**503. Myrmecoxenus Chevrolat.**

subterraneus Chevr. Schässburg (Kreuzberg, im Neste der *Formica pratensis*, c. a.); Kronstadt (Deubel).

vaporiorum Guer. Kronstadt (Bielz).

Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser dem Süden Europa's angehörigen Art in Kronstadt, wo er nur den *M. subterraneus* sammelte.

Deretaphrini.**504. Oxylaemus Erichs.**

cylindricus Paunz. Dobra, Hermannstadt (Bielz); Hâtszeg (c. a.); Zernest, Honigberg (Deubel).

505. Teredus Shuckard.

opacus Habelm. Zibinsegelbirge (Bielz).

Anommatinii.**506. Anommatus Wesmael.**

12-striatus Müll. Dobra, Gross - Scheuern, Neudorf b. H. (Bielz).

Bothridinerini.**507. Bothrideres Erichs.**

contractus F. Hâtszeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Gross - Scheuern, Neudorf b. H., Dees, Záh, Schässburg (unter Weidenrinde, Bielz).

Cerylonini.**508. Cerylon Latreille.**

Die Arten leben unter Baumrinde.

evanescens Reitter. Kerzer Gebirge (Bielz); Alsó-Rákos (c. a.).

fagi Bris. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Csukás,

Előpatak, Baassen, Schässburg, Borszék, Rodnagebirge (c. a.); Götzenberg (Ormay); Alsó - Rákos, Kronstadt (Deubel).

histeroides F. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

ferrugineum Steph. Retjezat, Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Rotenturm, Präsaka (Zalatna, c. a.); Zood (Ormay); Zernest (Deubel).

impressum Er. Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

deplanatum Gyll. Hâtszeg, Porcsest, Kerzer Gebirge, Tartlau, S.-Regen (Bielz); Ober - kerz (Glashütte). Rotenturm, Schässburg, Rodnagebirge (c. a.); Tusnád (Deubel).

XXXVII. Endomychidae.**Sphaerosominae.****509. Sphaerosoma Leach.**

(Alexia Steph.)

die Arten werden aus Moos und Grashüscheln gesiebt.

glabrum Reitter. Hammersdorf, Kerzer Gebirge (Ormay); Kronstadt (Deubel).

globosum Strm. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

a. *rubrum*. Rotenturm (c. a.).

Im Rotenturm sammelte ich in grosser Anzahl eine etwas kleinere, stets röthlichgelbe, also ausgefärzte Form von mehr rundlicher, aber weniger hochgewölbter Form, die ich als lokale Abänderung bezeichne mit dem Namen *rubrum*. Aus unserem Verzeichnis sind wohl zu streichen: *Sph. pubescens* Friv. die im Schielthal, pilifera, die in Hermannstadt, und *pilosissima*, die in Kronstadt vorkommen soll.

punctatum Reitter. Frecker Gebirge (Serbota, 1 Ex., c. a.).

laevicollis Reitter. Negoi (Deubel); Parigul, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

carpathicum Reitter. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Bistra, Büdös, Torozkó, Topánfalva, Schulergebirge (c. a.); Bucsecs, Nagyhágymás (Deubel).

pilosum Paunz. Kerzer Geb., Kronstadt (?) (Bielz); Zalatna (c. a.).

Reitteri Ormay. Frecker Gebirge, Kronstadt, Schässburg, Rodnagebirge, Rotenturm, Büdös (c. a.).

Mycetaeinae.**Mycetaeini.****510. Clemmus Hampe.**

trogloctytes Hampe. Hermannstadt (Bielz).

511. *Symblotes Redtenbacher.*

gibberosus Luc. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (im Holze alter, von *Lasius brunneus* bewohnter Eichen, c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel).

512. *Myctaea Stephens.*

hirta Marsh. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

Leiestini.

513. *Leistes Redtenbacher.*

seminigra Gyll. Gross-Scheuern, Präsb., Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz); Alsó-Rákos (c. a.).

Trochoideinae.

514. *Pleganophorus Hampe.*

bispinosus Hampe. Hermannstadt (j. W. an alten, von *Lasius brunneus* bewohnten Eichen).

Endomychinae.

Dapsini.

515. *Dapsa Labreille.*

denlicollis Germ. Hermannstadt, Hammersdorf, Heitau, Michelsberg, Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm, Baassen, Schässburg, Håtszeg (unter Laub und verwesenden Pflanzenstücken, c. a.); Bistritz (Deubel); Görgény - Szt. - Imre (Müller).

516. *Lycoperdina Latreille.*

bovistae F. Hermannstadt (Bielz).
(Golgia.)

succincta L. Håtszeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Hammersdorf, Poresest, Reps, Kronstadt, Marosgebirge (Bielz); Rotenturm, Zalatna (in kleinen Bövisten auf Hutweiden, c. a.).

var. **disca** Gerst. Schässburg, Karlburg (c. a.).

crassicornis Reitter. Ober-Kerz (Reitter).

517. *Myctina Mulsant.*

eructata Schall. Retjezat, Hermannstadt, Fogarascher Gebirge, Kerzer Geb., Kronstadt, Tömöscher Pass, Rotenturm, Schässburg (Bielz); Håtszeg (Deubel); Szurdukpass (c. a.).

a. **calabra** Costa. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Bucsecs, Balánbánya, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

a. **Fussi Csiki.** Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Håtszeg (Deubel).

Bei der Farbenänderung Fussi Csiki sind die Flügeldecken einfarbig gelb, nur ein blässer Schattenfleck zu beiden Seiten in der Mitte derselben deutet die Seitenflecken der a. calabra an, die Naht ist schmal gehräunt, ebenso die blaue Querfurche des Halschilde; im übrigen kann die oben Farbenänderungen nicht der Rang der Subspecies (Varietät) zuerkannt werden.

Endomychini.

518. *Endomychus Panzer.*

coccineus L. Zibinsgebirge, Götzenberg, Präsb., Holzmengen, Poresest, Ober-Schés, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Tesla, Dongókő, Rozauer Pass, Mediasch, Schässburg, Marosgebirge (Bielz); Cuskás, Bükszál, Előpatak, Malemviz, Borszék (c. a., unter Baumrinden, wie der folgende).

a. **Biehli** Reitter. Siebenbürgen.

thoracicus Charp. Retjezat, Håtszeger Geb., Zibinsgebirge, Götzenberg, Präsb., Fogarascher Gebirge, Kerzer Geb., Kronstadt, Bucsecs, Tesla, Dongókő, Rozauer Pass, Marosgebirge (Bielz); Rotenturm, Balánbánya, Bistra, Karlburg, Paringul, Alsó-Rákos, Szurduk-Pass, Teroczko, Előpatak, Zalatna, Malemviz (c. a.).

XXXVIII. Coccinellidae.

Epilachninae.

519. *Subcoccinella Huber.*

24. **punctata** L. Håtszeg, Hermannstadt, Holzmengen, Reps, Iléviz, Kronstadt, Tarlau, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees, Gyeke (Bielz); Gyögy, Szamosujvár (Ormay); Tordaer Schlucht (c. a.).

var. **meridionalis** Motsch. Kronstadt (Bielz); Naszód, Tordaer Schlucht, Déva, Töröczkő, Topánsalva, Klausenburg, Schässburg (c. a.).

a. **4-notata** F. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

a. **limbata** Moll. (saponariae Muls.). Håtszeg (Deubel).

520. *Cynegetis Redtenbacher.*

impunctata L. Håtszeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Zool, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf, Szamosujvár (Ormay); Håtszeg (Deubel); Szováta (auf Salzhoden zwischen Röhricht, 5. Juni, c. a.).

var. **palustris** Redt. Håtszeg.

Coccinellinae.

Hippodamini.

521. Hippodamia Mulsant.

- tredecimpunctata** L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Marpod, Freck, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Mediasch, Gyeke (Bielz); Schässburg (c. a.).
7-maculata Deg. Neudorf b. H., Girelsau, Kronstadt (Bielz); Schulergebirge (Deubel).

522. Adonia Mulsant.

- variegata** Goeze. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Reps, Kronstadt, Hosszufalu, Predeal, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Gyeke, Záb (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Annen-See (c. a.); Hátszeg (Deubel).
 a. **constellata** Laich, Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.).
 a. **neglecta** Wse. Dees, Kronstadt (c. a.); Bonc-Nyires, Mező-Samsond (Méhely).
 a. **carpini** Geoffr. Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Kronstadt, Bodzaer Gebirge (Deubel).
 a. **5-maculata** F. Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).
 a. **turmenica** Zulb. (maculiger Wse.). Hermannstadt (Ormay).
 a. **ustulata** Ws. Kronstadt (Zinne, Deubel).
 var. **corsica** Reiche (transsylvaniaica Pe-necke). Schulergebirge (Deubel).

523. Anisosticta Duponchel.

- 19-punctata** L. Gross-Scheuern, Reps, Kronstadt, Dees, Gyeke, Záh (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Szováta (auf Sumpfpflanzen, c. a.).

524. Semiadalia Crotch.

- notata** Laich. Neudorf b. H., Poresest, Borszék (Bielz); Rodnagelgebirge, Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel).
11-notata Schneidl. Götzemberg, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Borszék, Gyeke, Záh (Bielz); Tordaer Schlucht, Reps (c. a.).
 a. **cardui** Brahm. Bodzaer Geb. (alpin), Kronstadt (Deubel).
 a. **9-punctata** Fourer. Baróth, Bone-Nyires (Méhely); Bodzaer Gebirge (alpin), Kronstadt, Hátszeg (Deubel).

Coccinellini.

525. Aphidecta Weise.

- obliterata** L. (livida Deg.). Präsbe, Kronstadt (Bielz); Schulergebirge (c. a.); Schanta (Ormay).
 a. **sexnotata** Thunb. Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).

526. Adalia Mulsant.

- conglomerata** L.
 a. **bohnia** Payk. Nagylagymás, Schässburg (Deubel).
bipunctata L. (dispar Schneid.). Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Dees, Héviz, Oláhfalu (Bielz); Stolzenburg, Kerzer Gebirge (Ormay); Hátszeg (Deubel).
 a. **annulata** L. Kerzer Geb. (Ormay).
 a. **pantherina** L. Kronstadt (Méhely).
 a. **6 - pustulata** L. Kronstadt, Hátszeg (Deubel).
 a. **4 - maculata** Scop. Oláhfalu, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
alpina Villa. Fogarascher Gebirge (Bielz); Rodnagelgebirge, Schulergebirge (Deubel). Revelierei Muls. Siebenbürgen.

527. Coccinella Linnae.

- 7-punctata** L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
 a. **5-notata** Haw. Schulergebirge (Deubel).
5 - punctata L. Schieltal, Gross-Scheuern, Talmesch, Marpod, Fogarasch, Nussbach, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, Mediasch, Dees (Bielz); Schässburg, Tordaer Schlucht (c. a.); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay).
distincta Falb.
 a. **magnifica** Redtenb. Poresest, Surul, (Bielz); Kronstadt (c. a.).
 a. **domiduca** Ws. Kronstadt (Méhely).
hieroglyphica L. Hermannstadt (Bielz).
 a. **flexuosa** F. Schässburg (c. a.).
10 - punctata L. Hátszeg, Retjézat, Gross-Scheuern, Talmesch, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Reen, Dees (Bielz); Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Ormay); Oláhfalu (c. a.); Schulergebirge (Deubel).
 a. **pellucida** Ws. Karlsburg (c. a.).
 a. **lutea** Rossi. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
 a. **subpunctata** Schrank. Kronstadt (Deubel).
 a. **lateralis** Ws. Alsó-Rákos (c. a.).
 a. **6 - punctata** L. Hermannstadt (Ormay); Rodnagelgebirge, Kronstadt (Deubel).
 a. **8 - punctata** Müll. Schässburg (c. a.); Rodnagelgebirge, Kronstadt (Deubel).
 a. **centromaculata** Ws. Kronstadt (Deubel).
 a. **humeralis** Schall. Hermannstadt, Schanta (Ormay); Schässburg (Mai, auf Himbeer, c. a.); Kronstadt (Deubel).
 a. **bella** Ws. Kronstadt (Deubel).
 a. **bimaculata** Pont. (bipustulata Ilbst.). Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
 a. **lateripunctata** Gradi. Kronstadt (Deubel).

a. **10-pustulata** L. (guttatopunctata L.) Kronstadt (Tömös, Bielz, Méhely); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Schässburg (c. a.); Hâtszeg (Deubel).

13-pustulata L. Hâtszeg, Hermannstadt, Fogarasch, Reps, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Gyéke, Záh (Bielz); Parigul, Balánbánya (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

(Synharmonia.)

conglobata L. (18-punctata Scop.). Schässburg, Klausenburg (c. a.); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Kronstadt (Deubel).

a. **gemella** Hbst. Schässburg, Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

a. **impustulata** L. Gross-Scheuern, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg, Birthälm, Dees (Bielz).

var. **caucasica** Motsch. (viridula Hampe). Siebenbürgen.

(Harmonia.)

4-punctata Pont. Fogarasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (auf Kiefern häufig, Deubel).

a. **16-punctata** F. Kronstadt (Deubel).

528. *Mieraspis Redtenbacher.*

sedecimpunctata L.

a. **12-punctata** L. Hâtszeg, Grossscheuern, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt (?), Mediasch, S.-Regen, Dees, Gyéke, Záh, Nagyenyed (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Szamosujvár (Ormay); Reps, Schässburg (c. a.).

529. *Misia Mulsant.*

oblongoguttata L. Surian, Präsbe, Talmesch, Fogarascher Gebirge (Bielz); Schanta (Ormay); Rodna-Gebirge (auf Erlen, c. a.); Schulergebirge, Borszék (auf Fichte und Tanne, Deubel); Marosgebirge (Müller).

530. *Anatis Mulsant.*

ocellata L. Surul, Kronstadt, Klausenburg (Bielz); Schulergebirge, Rodnagelirge (Deubel); Marosgebirge (Müller); Borszék (c. a.).

531. *Halyzia Mulsant.*

sedecimguttata L. Hâtszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Heltau (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Karlburg, Szováta (c. a.).

532. *Vibidia Mulsant.*

12-guttata Poda. Fogarasch, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Rotenturm, Gyögy (Ormay); Petroszény, Malomvíz (c. a.); Hâtszeg (Deubel).

533. *Myrrha Mulsant.*

18-guttata L. Kronstadt (Zinne, Deubel)

534. *Thea Mulsant.*

22-punctata L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

a. **20-punctata** F. Kronstadt (Bielz); Hâtszeg, Vargyas (Deubel).

a. **signifera** Ws. Schässburg (c. a.).

535. *Calvia Mulsant.*

10-guttata L. Kronstadt, Tartlau (Bielz); Hermannstadt, Retjezat, Schässburg (c. a.).

15-guttata F. Fogarasch, Kronstadt (?), Mediasch, Schässburg, Sächs.-Regen, Bistritz (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hâtszeg (Deubel).

14-guttata L. Hâtszeg, Hermannstadt, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Dees, Gyéke (Bielz), Msó-Rákos (c. a.).

536. *Sospita Mulsant.*

20-guttata L. Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

a. **tigrina** L. Fogarasch, Kronstadt, Dees (Bielz); Rodnagelirge (Deubel).

a. **Linnei** Ws. Hermannstadt (Ormay); Rotenturm, Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Hâtszeg (Deubel).

537. *Propylaea Mulsant.*

14-punctata L. Hâtszeg, Hermannstadt, Héviz, Nussbach, Kronstadt, Schässburg, Oláhfalu, Bistritz, Gyéke, Záh (Bielz); Stolzenburg, Baumgarten, Kerzer Gebirge (Ormay).

a. **tetragonata** Laich. Kronstadt (Deubel).

a. **parumpunctata** Sajo. Kronstadt (Deubel).

a. **suratalis** Ws. Kronstadt (Deubel).

a. **biflexuosa** Ws. Hermannstadt (Ormay).

a. **12-pustulata** Pont. Baróth, Kronstadt (Zinne), Mezőség (Gyéke, Samsond, Méhely).

a. **perlata** Ws. Kronstadt, Alsó-Rákos, Nagyhagymás (Deubel).

Chilocorini.

538. *Chilocorus Leuch.*

renipustulatus Scriba (nec similis Rossi). Hâtszeg, Hermannstadt, Grossscheuern, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel); Borszék (c. a.).

bipustulatus L. Hâtszeg, Girelsau, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Záh (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Schässburg (c. a.).

539. Exochomus Redtenbacher.

- 4 - pustulatus** L. Hâtszeg, Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Tarflau, Schässburg, S. - Regen, Dees (Bielz); Stolzenburg, Resinar, Kerzer Gebirge, Nagyenyed (Ormay).
var. floralis Motsch. Hermannstadt (j. W.), Karlburg (c. a.).
flavipes Thunb. (nigromaculatus Ws., auritus Scriba). Hermannstadt, S. - Regen (Bielz); Hâtszeg (Bielz, c. a., Deubel).
var. ♀ collaris Küst. Hâtszeg (c. a.).

540. Platynaspis Redtenbacher.

- luteorubra** Goeze. Salzburg, Hermannstadt, Mediasch, Schässburg, Dees (Bielz); Baassen, Kronstadt, Rotenturm (c. a.); Szamosujvár (Ormay); Rodnagebirge (Deubel).

Hyperaspini.

541. Hyperaspis Redtenbacher.

- repensis** Herbst. Hâtszeg, Dobra, Mühlbach (roter Berg), Gross - Scheuern, Schässburg (Bielz); Alsó-Rákos (c. a.); Kronstadt (Deubel).
a. Teinfurteri Muls. Alsó-Rákos (c. a.).
campestris Herbst. Hâtszeg, Dobra, Hermannstadt, Záh (Bielz); Karlsburg, Schässburg, Klausenburg (c. a.); Götzenberg (Ormay); Kronstadt (Deubel).
concolor Suffr. Hâtszeg (Bielz).

Seymmni.

542. Pullus Mulsant.

- ferrugatus** Moll. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
haemorrhoidalis Herbst. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
auritus Thunb. (capitatus F., minimus Rossi). Hâtszeg, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Schässburg, Iléviz (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

- subvillosum** Goeze. Hâtszeg, Hammersdorf, Schässburg, Gyeke (Bielz); Kronstadt (Deubel).

- a. pubescens** Panz. Kronstadt (Zinne, Mely, Deubel).

- testaceus** Motsch.
a. scutellaris Muls. Unter-Kerz, Schässburg (c. a.).
suturalis Thunb. Gross-Scheuern, Talmesch, Tarflau (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

- pallidivestis** Muls.
var. nanus Muls. Zernest, Kronstädter Gebirge, Bucees (Deubel).

- ater** Kugel. Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt, Alsó - Rákos (Deubel).

543. Scymnus Kugelann.

- nigrinus** Kugel. Gross-Scheuern, Mediasch, S. - Regen, Bielz); Kronstadt (Deubel).
abielis Payk. Kerzer Gebirge, Schuler-Gebirge (Bielz); Bucees (c. a.); Schanfa (Ormay); Rodnagebirge, Kronstadt, Paringul (Deubel).
rufipes F. Schässburg (c. a.).

- frontalis** F. Hermannstadt, Grossscheuern, Marpod, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Schässburg, Gyeke, Záh (Bielz); Hâtszeg (c. a.); Hammersdorf (Ormay).

- a. 4 - pustulatus** Hbst. Déva, Hâtszeg, Schässburg, Kronstadt, Rotenturm (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

- a. immaculatus** Suffr. Schuler - Gebirge (Deubel).

- Apetzi** Muls. Mezőség (Gyeke, Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt, Vargyalta, Rodnagebirge (Deubel).

- interruptus** Goeze. Hâtszeg, Grossscheuern, Kerzer Gebirge, Hosszufalu, Tarflau (Bielz).

- rubromaculatus** Goeze. Hermannstadt, Grossscheuern, Hammersdorf, Giresau, Kronstadt, Hosszufalu, Schässburg, S. - Regen (Bielz); Szamosujvár (Ormay).

544. Nephus Mulsant.

- 4-maculatus** Hbst. (pulchellus Herbst.) Hermannstadt, Gross - Scheuern (Bielz); Klein - Pold (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

- a. obliguus** Ws. Kronstadt (Deubel).

- bipunctatus** Kugel. Hermannstadt (Bielz); Kronstadt (Deubel).

- var. nigrinus** Ws. Schässburg (c. a.); Bodnagelirge (Deubel).

- Redtenbacheri** Muls. Rodnagebirge, Schässburg, Unter-Kerz (Altufer, c. a.); Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).

545. Stethorus Weise.

- punctillum** Ws. Schässburg, Rotenturm, Malomvitz (c. a.).

Rhizobiini.

546. Rhizobius Stephens.

- litura** F. Schässburg (c. a.).

547. Coccidula Kugelann.

- scutellata** Hbst. Klausenburg, Záh (Bielz); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

- rufa** Hbst. Hermannstadt, Gross - Scheuern, Záh (Bielz); Schässburg, Kronstadt (c. a.).

XXXIX. Dascilloidea.

Helodidae.

Cyphonini.

548. Helodes Latreille.

- minuta** L. Gross-Scheuern, Hahnbach b. H., Kronstadt, Tartlau (Bielz); Karlsburg, Hammersdorf, Előpatak, Buceces (c. a.); Alsó-Rákos (Deubel); Marosgebirge (Müller).
 var. **laeta** Panz. Buceces (c. a.).
elongata Tourn. Szurdúkpáss, Hammersdorf, Szováta (c. a.).
flavicollis Kiesenw. Kronstadt (Zinne, Deubel).
marginata F. Rodnagelbirge (Valea Vinului, Deubel).

549. Microcara Thomson.

- testacea** L. Götzberg, S.-Regen (Bielz); Vargyastal, Honigberg (Deubel); Szováta (Quelle auf Sumpfpflanzen, 5. Juni, c. a.).

550. Cyphon Payk.

- variabilis** Thunb. Hermannstadt, Fogarasch, Tartlau, Oláhfalu, Gyéké (Bielz); Marosujvár, Előpatak, Schässburg, Szováta, Kronstadt (c. a.); Michelsberg, Baumgarten (Ormay).
padii L. Kronstadt, Gyéké, Záh (Bielz); Schässburg, Oláhfalu (c. a.); Kronstadt (Deubel).
 var. **discolor** Panz. Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).
coarctatus Payk. Hermannstadt, Fogarasch, Tartlau, Oláhfalu, Záh (Bielz); Szováta, Alsó-Rákos (c. a.); Hátszeg, Törzburg (Deubel).
Paykulli Guer. Rotenturm, Borszék (c. a.); Schulergebirge, Noa (Deubel).
 var. **macer** Kiesenw. Kronstadt (Zinne, Deubel).

551. Prionocyphon Redtenbacher.

- serricornis** Müll. Rotenturm (unter der Rinde eines Haselnussknüppels, der tief in Laub eingebettet war, c. a.); Kronstadt (Zinne, gekötschert, Deubel).

552. Hydrocyphon Redtenbacher.

- deflexicollis** Müll. Topánfalva, Balánbánya (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

553. Scirtes Illiger.

- hemisphaericus** L. Hátszeg, Gross-Scheuern (Bielz); Karlsburg (am Ufer eines Quellabflusses auf Sumpfpflanzen in ausserordentlich grosser Menge), Kronstadt (c. a.); Hermannstadt (Lazaret, Ormay); Schulergebirge (Deubel).

Eubrillul.

554. Eubria Latreille.

- palustris** Germ. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mediasch (Bielz); Paringul (an einer Quelle im Moos, nahe der Schutzhütte), Előpatak (c. a.); Kronstadt, Törzburg, Zernest (Deubel).

Eucynetinae.

555. Eucynetus Germar.

- haemorrhous** Duft. Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg (an feuchten Stellen, Atels-hill, Gross-Alischer Kupen, unter dem Wietebérg aus Moos und Laub ge-siebt, c. a.); Kronstadt, Schulergebirge (Deubel)

XL. Dryopidae.

Potamophiliini.

556. Potamophilus Germar.

- acuminatus** F. Dobra, Mediasch (Bielz); Schässburg (Kokel, an Eichenbohlen, welche im fliessenden Wasser standen, Juli, c. a.); S.-Regen (Müller).

Dryopini.

557. Dryops Olivier. (Parnus F.)

Die Arten leben an Gewässern unter Steinen und Geniste.

- striatopunctatus** Heer. Hátszeg, Dobra (Bielz); Unter-Kerz, Rotenturm (c. a.); Bistritz, Vargyas, Kerzer Gebirge (Deubel).

- vienensis** Heer. Schässburg (Bielz); Bistritz, Rotenturm, Kronstadt (c. a.); Dees (Deubel).

- fulgentus** Er. Hátszeg, Hermannstadt (Bielz); Vargyas (Deubel).

- auriculatus** Geoffr. (prolifericornis F.). Hermannstadt, Fogarasch, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Halvelagen b. Sch. (c. a.); Kronstadt (Deubel).

- turidus** Er. Hátszeg, Reps (Bielz).

- rufipes** Kryn. (pilosellus Er.). Schieltal, Dobra (Bielz).

- ernesti** Gozis (auriculatus Panz.). Durch das ganze Berg- und Hügelland ver-breitet.

- nitidulus** Heer. Reps (Bielz); Schässburg, Naszód, Petrozsény (c. a.); Hátszeg, Törzburg (Deubel).

558. Helichns Erichs.

(Dryops Leach., Potaminus Strm.)

- substriatus** Müll. Talmesch (Altufer, Bielz); Kronstadt (Ragado, Deubel).

Helminthini.**559. Esolus Mulsant.**

angustatus Müll. Balánbánya, Csukás, Els-patak (an klaren Quellrieseln unter Steinen, c. a.); Kronstadt (Ragadó, Deubel).

parallelepipedus Müll. Skore (Altufer), Fogarasch (Bielz); Kronstadt (Ragadó, Deubel).

560. Latelmis Reitter.

Perrisi Dufour (Germari Er.). Balánbánya (Quelle unter Steinen, c. a.); Nagy-hagymás (Ocsém), Zernest, Kronstadt (Ragadó, Deubel).

Volkmaria Panz. Porcesset (Bielz); Alsó-Rákos (Tepe-Bach), Kronstadt (Ragadó, c. a., Deubel).

opaca Müll. Csukás (c. a.).

561. Riolus Mulsant.

cupreus Müll. Kronstadt (?) (Bielz); Salzburg (Ormay).

subviolaceus Müll. Kronstadt (Ragadó, Zernest (Deubel)).

562. Helmis Latreille.

Latreillei Bedel (Mangeli Er.). Csukás (c. a.); Nagy-hagymás, Bucsecs, Zernest (Deubel).

Maugei Bedel.

var. **Megerlei** Duft. Alsó-Rákos (Tepe-Bach, c. a.).

var. **aenea** Müll. Michelsberg, Ober-Sebes, Unter-Kerz, Héviz, Kronstadt (Bielz); Bucsecs, Balánbánya, Csukás, Schässburg (c. a.); Heltau (Ormay).

XLI. Georyssidae.**563. Georyssus Latreille.**

Die Arten leben an Gewässern im Uferschlamm, im Sonnenschein kriechen sie, mit einem Erdklümpchen bedeckt, auf den Letten umher.

crenulatus Rossi (pygmaeus F.). Schiethal, Hermannstadt, Hammersdorf, Schässburg (Kokel, Schaaserbach, Bielz); Honigberg (Deubel); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); S.-Regen (Müller).

substratus Heer. Klausenburg (Bielz).

laesicollis Germ. Dobra (Mietesch), Rotenturm (Altuser, Bielz); Schässburg (Kokeluser, c. a.).

caelatus Er. Hátszeg (Bielz).

XLII. Heteroceridae.**564. Heterocerus Fabr.**

Die Arten graben an Gewässern im Uferschlamm. **H. bicornis** Curtis? Fuss ist nicht aufgeklärt; vielleicht bezieht sich diese Art auf **H. fossor** Kiesenw., dessen ♂ gehörte Mandibeln besitzt.

fossor Kiesenw. Déva, Gross-Schenk, Fogarasch, S.-Regen (Bielz); Unter-Kerz (Altufer), Rotenturm, Schässburg, Halvelagen b. Sch. (c. a.); Dees, Krizba, Honigberg (Deubel).

flexuosus Steph. (femoralis Kryn). Torda, Déva, Marosujvár, Malomvitz (Lunka negru, c. a.).

Das Vorkommen dieser auf Salzhoden lebenden Art in Malomvitz lässt sich nur so erklären, dass sich daselbst eine mir unbekannte Salzquelle befindet.

obsoletus Curtis. Salzburg, Záh (Bielz); Kronstadt, Schässburg (c. a.); Sächs.-Regen (Müller).

marginatus F. Schässburg (Bielz); Unter-Kerz, Hátszeg, Rotenturm, Karlsburg, Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Nagy-enyed (Ormay); Baróth (Méhely); Honigberg (Deubel); Klausenburg (Müll.).

fenestratus Thunb. (laevigatus Panz). Rotenturm, Fogarasch (Bielz); Déva, Unter-Kerz (c. a.); Hátszeg, Honigberg (Deubel). (Littorinus.)

hispidulus Kiesenw. Dobra (Bielz); Iłlomersdorf, Remete (Nagyenyed, Ormay); Schässburg, Unter-Kerz, Karlburg (c. a.).

pruinosus Kiesenw. Unter-Kerz (Altufer, c. a.); Dees, Kronstadt (Gesprenge, Deubel).

crinitus Kiesenw. Schässburg (c. a.).

marmota Kiesenw. Schässburg, Karlsburg

c. a.); Várhegy (Deubel).

sericans Kiesenw. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.); Dees, Honigberg (Deubel).

565. Mielus Mulsant.

murinus Kiesenw. Hátszeg (Bielz).

XLIII. Dermestidae.**Dermestini.****566. Dermestes Linne.**

Die Arten leben auf tierischen Stoffen, oft in Häusern, selten in Ameisennestern.

vulpinus F. Hermannstadt (Bielz).

Frischi Kugel. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

murinus L. Marpol, Szakadat, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Schanta, Szamosujvár, Salzburg (Ormay).

Ianiarius Illig. Kronstadt (Umgebung, auf Feldwegen, Deubel); Klausenburg (Müller).

undulatus Brahm. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, Gyeke (Bielz); Hammersdorf, Nagyenyed (Ormay).

atomarius Er. (tessellatus Gyll.). Schässburg (1. Marz, c. a.).

Erichsoni Ganglb. (tessellatus Er.). Salzburg, Marpod, Mediasch (Bielz).

hecolor F. Hermannstadt, Schässburg (4. Mai, von einem blühenden Kirschbaum geklopft, c. a.); Bistritz (Müller).

tardarius L. Durch das ganze Gebiet, vornehmlich in Häusern und Vorratskammern.

(Montandon.)

latissimus Bielz. Michelsberg, Götzenberg, Zood, Präsb., Porcsest, Surul, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Szurdukpass (c. a.); Schanta (Ormay); Rotenturm, Schulergelände (Taminaschlucht, Deubel).

Attagenini.

567. Attagenus Latreille.

Die Arten leben ähnlich wie die vorigen, häufig finden sie sich auf Blüten.

Schäffleri Herbst. Hátszeg, Borszék, Schässburg (Bielz).

piceus Oliv. Hátszeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Gross-Schenk, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Oláhfalu, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf, Nagyenyed, Gyögy, Szamosujvár (Ormay); Puj (b. Hátszeg, c. a.).

var. **dalmatinus** Küst. (marginicollis Küst.) Königstein (Méhely); Hermannstadt (c. a.).

pellio L. Durch das ganze Gebiet verbreitet, oft in Häusern, oft auf Blüten. (Lanorus.)

punctatus Scop. (vigintiguttatus F.). Hermannstadt (Bielz).

pantherinus Ahr. Hammersdorf, Girelsau, Unter-Kerz, Schässburg (Bielz), soll in den Nestern von Erdbienen vorkommen, ich sammelte eines meiner Exemplare an einer Hausmauer).

Megatomini.

568. Megatoma Samouelle.

undata L. Hátszeg, Hammersdorf, Gross-Scheuerl., Girelsau, Holzmengen, Gross Schenk, Marienburg b. Kr., Gyeke, (Bielz); Schässburg (Kokelufer, unter der Rinde eines abgestorbenen Weidenbaumes, c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

569. Globicornis Latreille.

(Hadrotoma.)

marginata Payk. Hermannstadt (Ormay); Erdővidék (Méhely); Kronstadt (Zinne, Deubel).

Globicornis s. str.)

nigripes F. Hermannstadt (Bielz). Schässburg (Eichenschwamm oder aus Blättern gesiebt, 20. April, c. a.).

570. Trogoderma Latreille.

versicolor Creutz. Dobra (Bielz); Karlsburg (c. a.); S.-Regen (Müller).

nigrum Herbst. (glabrum Herbst, elongatum F.). Hermannstadt, Holzmengen, S.-Regen (Bielz); Schässburg an einer Hausmauer, 1. Juli, c. a.); Kronstadt (in der Schmetterlingssammlung, Deubel).

571. Ctesias Stephens. Tiresias Er.

serra F. Hermannstadt, Gyeke (Bielz); Schässburg, (Breite, aus dem Holze einer alten Eiche, c. a.).

Anthrenini.

572. Anthrenus F.

Die Arten leben auf Blüten, in Häusern, die Larven einiger Arten in Tiersammlungen als Zerstörer.

pimpinellae F. Hátszeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Kronstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Schanta, Kerzer Geb. (Ormay).

serophilariae L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

(Nathrienus.)

verbasci L. Hermannstadt, Neppendorf, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, S.-Regen (Bielz); Karlsburg (c. a.).

Deubel bezweifelt, dass *A. verbasci* im Burzenlande (Kronstadt, Tartlau) und in Fogarasch vorkomme.

(Florilinus.)

museorum L. Hermannstadt, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, S.-Regen (Bielz); Balánbánya, Puj (bei Hátszeg, c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

(Helocerus.)

fuscus Oliv. Hátszeg, Hermannstadt, Schässburg (auf Blüten und in Sammlungen als Zerstörer derselben, Bielz); Rotenturm, Baassen (c. a.); Hammersdorf (Ormay); Kronstadt (Deubel).

Trinodini.

573. Trinodes Latreille.

hirius F. Hátszeg, Hermannstadt (Bielz); Honigberg (Altufer, Deubel).

Orphilini.

574. Orphilus Erichs

niger Rossi (glabratus F.). Hermannstadt (Bielz); Zood (Ormay); Kronstadt (Deubel).

XLIV. Nosodendridae.

575. Nosodendron Latreille.

fasciculare Oliv. Präsbe, Holzmengen, Marosgebirge (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Schässburg (am ausfliessenden Saite der Eichen, Mai, c. a.); Várhelyegy (Deubel); Hermannstadt (Albrecht); S.-Regen (Müller).

XLV. Byrrhidae.

Limnichini.

576. Pelochares Motsant.

versicolor Waltl. Hâtszeg, Dobra, Schässburg (Bielz); Unter-Kerz, Rotenturm (Altuf), c. a.); S.-Regen (Müller).

577. Limnichus Latreille.

Die Arten leben wie die vorigen am Ufer der Gewässer.

pygmaeus Sturm. Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

sericeus Dult. Hâtszeg, Hermannstadt, Fogarasch, Tarflau, Schässburg (Bielz); Nagyenyed, Bistritz (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Byrrhini.

578. Simplocaria Marsham.

Bielz führt *S. maculosa* Er. für Siebenbürgen an; es ist aber wahrscheinlich, dass diese Art bei uns nicht vorkommt, indem sie bei uns vertreten wird durch *S. Deubeli*, welche Bielz nicht kannte.

metallica Strm. Hâtszeg (Bielz); Kronstadt (Deubel).

Deubeli Ganglb. Bucecs, Frecker Gebirge (Serbota), Kerzer Gebirge (Buleca), Schässburg (Citendell), Retjezat (unter Moos, besonders Baummoos, c. a.).

semistriata F. Hermannstadt, Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz); Alsó-Rákos, Balánbánya, Rodnagelbirge, Előpatak, Schässburg, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Rotenturm (Ormay); Bodzaer Gebirge (Deubel).

acuminata Er. Rodnagelbirge (oberhalb der Baumregion aus Grasbüscheln gesiebt, c. a.); Rotenturm (Ormay); Hâtszeg (Deubel).

(Trinaria.)

carpathica Hampe. Präsbe (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Kerzer Gebirge (Bulea), Paringul, Malomviz, Bistra (c. a.).

579. Morychus Erichs.

aeneus F. Schielthal, Zibinsgebirge, Rotenturm, Kerzer Geb., Fogarasch (Bielz); Zernest, Kronstadt (Deubel); Klausenburg (Müller).

580. Pedilophorus Steffalni.

(Lamprobyrrhulus.)

nigridus Schall. (nitens Panz.). Hâtszeg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Schässburg (Kokelner unter Blättern), Baassen (c. a.); (Pedilophorus s. str.)

auratus Duft. Retjezat, Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bucecs (Bielz); Alsó-Rákos, Büdös, Frecker Gebirge (Serbota), Malomviz, Topánfalva, Schässburg, Előpatak, Paringul (c. a.); Schanta (Ormay); Schulergebirge (Deubel); Bistrilz (Müller).

581. Carpathobyrhulus Ganglbauer.

transsylvaniaicus Suffr. Rodnagelbirge, Fogarascher Gebirge (Bielz, c. a., Deubel); Klausenburg (Müller).

582. Cytinus Erichs.

(Cistela Geoffr. Seidl.)

sericeus Forster (varius F.). Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Königstein, Marosgebirge (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Schanta, Porumbacher Geb., Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schässburg, Balánbánya (c. a.).

583. Byrrhus Linné.

fasciatus Forst. Zibins-Gebirge, Obersebes, Surul, Bucecs, Bükszad, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Porumbacher Gebirge (Ormay); Retjezat, Paringul, Rodnagelbirge (c. a.).

arielinus Steff. Hâtszeg, Broos (Bielz); Bucecs, Paringul, Retjezat (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

pustulatus Forst. Dusch, Götzenberg, Präsbe, Kronstadt, Bozauer Pass (Krasna, Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Tordaer Schlucht, Bükszad, Rodnagelbirge, Szurdukpass (c. a.); Paringul (Deubel).

pilula L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

a. *aurafo-punctatus* Reitt. Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).

a. *aurofuscus* Reitt. Hermannstadt (Ormay).

Ganglbauer (Käfer von Mitteleuropa, IV. 71) zieht diese beiden Aberrationen als Synonyme ein.

var. *regalis* Steff. In allen höheren Gebirgen unseres Gebietes.

var. *laevigatus* Ganglb. Rodna-Gebirge (hochalpin, c. a., Deubel); Pietrosul (Deubel).

var. herculeanus Ganglb. Szurduk - Pass (c. a.).

luniger (Germ.) Zibinsgebirge, Hosszufalu (Bielz); Kronstadt (Deubel, c. a.); Schulergebirge, Hátszeg (Deubel); Szurduk - Pass, Rotenturm, Borszék (c. a.).

glabratus Heer. ornatus Panz.) Zibinsgebirge, Fogarasch, Kronstadt, Königstein, Maros - Gebirge (Bielz); Rodnagelände (Deubel).

584. *Poreinolus Mulsant.*

murinus F. Freck (Bielz); Schässburg (bei einer Überschwemmung der Kokel in Anzahl gesammelt, c. a.); Hátszeg (Deubel).

585. *Curimus Erichs.*

decorus Steph. Schielthal, Dobra (Bielz); Schanta (Ormay); Retjezat, Bodnagelände (c. a.); Schulergebirge, Rosenu, Kerzer Gelände (Deubel).

Erichsoni Reitter. Kronstadt, Zalatna, Törczkó, Rodnagelände (c. a.); Nagy-hagymás, Hátszeg (Deubel).

erinaceus Duft. Erzgebirge (Boicza, Bielz).

586. *Synaclypta Stephens.*

Die Arten leben unter Moos und Blättern. (Curimopsis.)

paleata Er. Hátszeg, Rotenturm (Altufer), Schässburg (Kokelufer, Bielz); Karlsburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

setosa Waltl. Kerzer Gebirge (Bielz); Unter-Kerz (Altufer, c. a.).

seligera Illig. Gross-Scheuern, Fogarasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hátszeg, Karlsburg, Topánfalva, Előpatak, Schässburg, Borszék (c. a.); Nagy-hagymás, Kronstadt (Deubel).

(*Synaclypta* i. sp.)

spinosa Rossi. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Schässburg (Bielz); Unter-Kerz (c. a.); Rodnagelände, Kronstadt (Deubel).

XLVI. Dasciliidae.

Dascillini.

587. *Dascillus Latreilte.*

cervinus L. Zibinsgebirge, Götzenberg, Zood, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Csukas, Bozanaer Pass, Marosgeb. (Bielz); Retjezat, Paringul, Schulergebirge, Borszék (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

XLVII. Eiateridae.

Agrypnini.

588. *Adelocera Latreilte.*

punctata Hbst. (atomaria F.). Klausenburg, S.-Regen (Bielz).

lepidoptera Gyll. Kerzer Gebirge (Bielz); Bistra (unter Fichtenrinde, c. a.); Kelenengebirge, Kovászna (Deubel).

fasciata L. Zibinsgebirge, Negovan, Sterpu, Fogarasch, Tusnád, Gyergyó, Borszék, Marosgelände, Borgoer Pass (Bielz); Rodnagelände, Bistra, Balánbánya (unter Fichtenrinde, c. a.); Kelenengebirge (Deubel).

quercea Hbst. Hermannstadt, Hammersdorf (Bielz); Schässburg (Fuchsloch, März, unter Eichenrinde, c. a.); Nussbach (Deubel).

589. *Brachylaeon Motschulsky.*

murinus L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

Luditni.

590. *Dima Eschscholtz.*

elateroides Charp. Retjezat, Heltau, Götzenberg, Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt (Bielz, c. a., von Erlengebüsch geklopft, Mai); Rotenturm (Ormay); Ernest (Deubel).

591. *Corymbites Latreilte.*

virens Schrank signatus Schrank). Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schulergeb., Balánbánya (Öcsém, Bielz); Szurduk-Pass, Schässburg Breite, Rothbuche, wenn sich ihr Laub eben entwickelt hat, c. a.); Zibinsgebirge (Ormay).

pectinicornis L. Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, Marosgebirge (Bielz); Zibinsklaue, Paringul, Rosenauer Gebirge, Szurduk-Pass, Schässburg (c. a.); Resmar, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

Heyeri Saxesen. Retjezat (Bielz); Rodnagelände (c. a.); Ernest (Crepatura, Deubel).

capreus F. Michelsberg, Götzenberg, Kronstadt, Marosgebirge (Bielz), Bucees, Rodnagelände (Deubel).

var. aeruginosus F. Retjezat, Schielthal, Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, Mediasch, Bistritz, Dees (Bielz); Götzenberg, Schanta, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Roimageb., Borszék, Balánbánya, Paringul, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Pietrosul (Deubel).

var. *transylvanicus* Szombathy. Vulkanpass, Fogarascher Gebirge, Biharer Gebirge (Szombathy).

(Anostirus.)

purpureus Poda. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

a. *atropilosus* Buyss. Schulergebirge (c. a.)

haemapterus Illig. Rotenturm, Rodnageb., (Bielz); Schanta, Remete (Nagyenyed, Ormay); Bucsecs (subalpin). Zernest (Deubel); Szurdukpass (Deubel, c. a.); Vulkanpass (Csiki).

castaneus L. Hermannstadt, Holzmengen, Zood, Kronstadt (Bielz); Schässburg (auf blühendem Ahorn, c. a.); Rodnagebirge (subalpin, Deubel).

testaceipennis Duf. (sulphuripennis Germ.). Kerzer Gebirge, Mediasch (Bielz); Vargastal (auf Blumen in der Nähe der Almascher Höhle, Deubel).

(Actenicerus.)

sjaelandicus Müll. (tessalatus F. nec L.). Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Hosszuvalu, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Stolzenburg, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Szurdukpass, Klausenburg, Borszék, Schässburg (c. a.); Nagyhagyomás (Deubel).

var. *assimilis* Gyll. Heltau, Neudorf bei H., Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Klausenburg, Paringul (c. a.); Kronstadt (Deubel).

592. *Selatosomus Stephens.*

(Metanomus.)

montivagus Rosenh. Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge (Bielz); Nagyhagyomás, Bucsecsgebiet, Schulergebirge (Deubel).

(Selatosomus s. str.)

impressus F. Klausenburg (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

nigricornis Panz. Dobra (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Ujszékely b. Sch. (c. a.); Honigberg (Altfluss, Deubel).

melancholicus F. Hermannstadt (Bielz); Schanta, Präsbe (Ormay); Schässburg (c. a.).

amplicollis Germ. var. Buyssoni Szombathy, Kronstadt (Bielz); Schulergeb. (Deubel); Rotenturm, Pilis (bei Nagyenyed, c. a.).

aeneus L. Hátszeg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Hosszuvalu, Tartlau, Mediasch, Marosgebirge, Borszék (Bielz); Rotenturm, Schanta, Bistra (Ormay); Pilis (Nagyenyed, Szurdukpass, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Kelemengeb., Nagyhagyomás (Deubel)).

a. *germanus* L. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Csiker Gebirge, Balánbánya (Bielz); Pilis (Nagyenyed), Rodnagebirge, Tordaer Schlucht (c. a.).

a. *coeruleus* Schilsky. Pilis (Nagyenyed), Rotenturm (c. a.).

tatus F. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

cruciatus L. Gyeke, Záh (Bielz).

globicornis Germ. Kronstadt (Zinne, Deubel).

(Calambus.)

bipustulatus L. Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Reps, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rodnagebirge, Alsó-Rákos (Deubel).

(Haplotarsus.)

affinis Payk. Kerzer Gebirge (Bielz); Schanta (Ormay); Paringul, Frecker Gebirge (Serbota), Kronstadt, Bucsecs (c. a.); Nagyhagyomás, Schulergebirge (Deubel).

Ganglbaueri Rybinski. Frecker Geb. (Serbota, c. a.).

(Neopristilophus.)

depressus Germ. (insitivus Germ.). Hermannstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (c. a.).

(Paranomus.)

guttatus Germ. Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch (Bielz); Arpascher Gebirge (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Retjezat, Paringul, Rodnagebirge (c. a.); Bodzaer Gebirge (Csukás), Schulergebirge, Königstein (Deubel).

593. *Prosternon Latreille.*

tessellatus L. (holosericeus Oliv.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. *bifasciatus* Küst. Kerzer Geb. (Bielz).

594. *Orithales Kiesenwetter.*

serraticornis Payk. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Papolci hegység (Méhely).

595. *Hypoganus Kiesenwetter.*

cinctus Payk. Dees (Bielz); Alsó-Rákos (in einer alten Eiche), Schässburg (aus einem Eichenpfahl, c. a.); Kronstadt (Deubel).

596. *Sericus Eschscholtz.*

S. subaeneus Redt. ist aus dem Verzeichnis gestrichen, da er irrtümlich in dasselbe aufgenommen worden ist.

brunneus L. Gross-Scheuern, Kerzer Geb. (Bielz); Szunyokszék (Burzenland, c. a.); Nagyhagyomás, Schulergebirge, Bodzaer Gebirge (Deubel).

597. *Dolopius Eschscholtz.*

marginatus L. Durch das ganze Gebiet auf Gesträuch.

598. *Agriotes Eschscholtz.*

(*Ectinus*.)

aterimus L. Grossscheuern, Kronstadt (?), (Bielz); Frecker Gebirge Serbota, c. a.); Bodnagelgebirge, Bucecs (Deubel). *Agriotes* s. str.

gallicus Lac. Döblény-Tal, Ober-Tömösch (Méhely).

Schässburg als Fundort dieser Art ist zu streichen; vielleicht beruht auch Méhely's Angabe auf einem Irrtum. Ich habe den echten *A. gallicus* erst später in natura vor mir gehabt. *ustulatus* Schall. (*Blandus* Germ.). Durch das ganze Gebiet verbreitet, auf Schirmblumen gemein.

var. **flavicornis** Panz. Rothenberg, Mediach, Schässburg, Borgoer Pass, Klausenburg, wohl überall mit der Stammform zusammen.

var. **sputator** Redt. Mit der Stammform.

pilosus Panz. (*pilosellus* Schönh.). Hátszeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Präsbe, Schässburg, S.-Regen, Dees, Kronstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm, Schanta, Stolzenburg (in Holzschlägen auf Gesträuch, auch auf Schirmblumen).

acuminatus Steph. (*sobrinus* Kiesenw.). Kerzer Gebirge (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Hátszeg, Hermannstadt, Schässburg (von blühendem Ahorn geklopft, c. a.); Kronstadt (Deubel).

pallidulus Illig. Zibinsgebirge (Bielz).

sputator L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

sordidus Illig. Kerzer Gebirge (Bielz).

Das Vorkommen dieser dem Südwesten Europas angehörigen Art bei uns ist kaum anzunehmen; vielleicht wurde der Käfer mi' *A. obscurus* verwechselt, denn er ähnlich ist.

lineatus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

obseurus L. Kerzer Gebirge (Leita-Tal).

Fogarasch, Kronstädter Gebirge, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm (Ormay); Schanta, Szunyokszék, Schässburg (c. a.); Bodnagelgebirge (Deubel).

599. *Ludius Latreille.*

(*Steatoderus* Eschscholtz.)

ferrugineus L. Hermannstadt, Nependorf, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Hátszeg (Haschagen, c. a.); Schlüergergebirge (Deubel); Lotru-Tal (Csiki).

600. *Synaptus Eschscholtz.*

Auf Gehölz und Strauchwerk.

filiformis F. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

601. *Adrastus Eschscholtz.*

limbatus F. (*nitidulus* Marsh.). Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Mediach, Schässburg, S.-Regen

(Bielz), Hammersdorf, Nagyenyed (Ormay); Előpatak (c. a.).
var. **axillaris** Er. Reps, Schässburg (Bielz); Borszék, Balánbánya, Kronstadt (c. a.); Nagyhagymás (Deubel); Szováta (Csiki).

lacertosus Er. Küküllőszeg, Dicsőszentmárton (Csiki).

nitidulus Marsh.

Die Nomenclatur des *Adrastus nitidulus* Marsh., der als Synonym zu *A. limbatus* gestellt wird, ist von Szombathy folgendermassen geändert worden:

pallens F. (*pusillus* Herbst). Zibinsgebirge, Fogarasch, Reps, Schässburg (Bielz); Hátszeg, Kronstadt, Vargyastal (Szombathy).

var. **lateralis** Herbst. Szurdúkpass (Csiki).

var. **Paykuli** nom. nov. (*limbatus* Payk nec F.). Dicsőszentmárton (Csiki).

a. **pallens** Er. Zibinsgebirge, Fogarasch, Reps, Schässburg (Bielz); Hátszeg, Kronstadt, Vargyastal (Deubel).

rachifer Geoffr. (*nanus* Herbst, *minutus* Oliv.). Puj (b. Hátszeg), Karlsburg, Kronstadt (Zinne), Reps, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Hammersdorf, Kerzer Gebirge, Gyögy (Ormay); Dicső-Szent-Márton (Csiki).

montanus Scop. (*humilis* Er.). Grossscheuern (Bielz); Schässburg, Reps (c. a.); Hammersdorf, Gyögy (Ormay).

Cardiophorini.

602. *Cryptohypnus Eschscholtz.*

riparius F. Kerzer Gebirge (Bielz).

frigidus Kiesenw. Surul (Bielz); Rodnagelgebirge (oberhalb der Baumregion auf kiesigem Grashoden, c. a., Deubel); Bucecs, Schulergelgebirge (Deubel).

603. *Hypnoidus Stephens.*

(*Hypnoidus* s. str.)

tenuicollis (Germ. Schässburg (Kokelufer, gekötschert, 29. Mai, c. a.).

4-pustulatus F. Hátszeg, Gross-Schenk, Törzburg, S.-Regen (Bielz).

(*Negastrius*.)

pusillus L. Hátszeg, Fogarasch, Kronstadt, Mediach (Bielz).

var. **exiguus** L. (*♀ sabulicola*, Boh.). Reps (Altufer, Bielz); Schässburg (Kokelufer im Geniste, c. a.); Honigberg (Deubel).

(*Zorochrus*.)

dermestoides Ilbst. Hátszeg, Kerzer Geb. (Leita-Tal), Kronstadt, Tartlau, S.-Regen (Bielz); Rotenturm (Ormay); Bucecs, Schässburg, Unter-Kerz (c. a.); Rodnagelgebirge (Deubel).

var. **telegraphus** Germ. (*I-guttatus* Lap.). Dobrá (Bielz); Hermannstadt, Csukás, Balánbánya auf feuchten, sandigem Boden, c. a.); Baumgarten, Kakova (Ormay); Rodnagelgebirge, Zernest (Deubel).

meridionalis Lap. Hátszeg, Rotenturm, Pörrbach, S.-Regen (Bielz); Nagyenyed (Flussufer im Saude, c. a.).

Quasimus.

minutissimus Germ. Gross-Scheuern, Rotberg b. H., Giresau, Kerzer Gebirge, S.-Regen, Schässburg (auf Gesträuch); Michelsberg, Rotenturm, Präsbe, Gyögy (Ormay); Kroustadt (Deubel).

604. *Cardiophorus Eschscholtz.*

gramineus Scop. Hátszeg, Hermannstadt, Giresau, Kroustadt, Mediasch, Schässburg, Dees, Maros - Gebirge, Gyeke (Bielz); Rotenturm, Rakovicza, Nagyenyed, Szamosujvár (Ormay).

ruficollis L. Déva, Gross-Pold (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Nagyhagynás (Deubel, von Fichte geklopft).

rufipes Geoffr. (vestigialis Er.). Hátszeg, Mediasch (Bielz); Schässburg (auf blühender Ulme und Eiche, c. a.).

nigerrimus Er. Rotenturm (Ormay); Hermannstadt (a. Berg, c. a.).

atramentarius Er. Mediasch (Bielz).

(*Platynichus*.)

cinereus Ilbst. Neudorf, Fogarasch, Mediasch (Bielz); Alsó-Rákos, Kronstadt (c. a.).

var. **testaceus** F. Hátszeg (Bielz).

equestris Herbst. Hermannstadt, Rothberg b. II., Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

rubripes Germ. Kronstadt (Bielz); Schässburg (Wieteberg, von Eichen geklopft, April, c. a.).

Elaterini.

Elaterina.

605. *Melanotus Eschscholtz.*

rufipes Herbst (castanipes Payk, longipennis Küst.). Hátszeg, Hermannstadt, Kronstadt, Hosszuvalú, Előpatak, Bükkzsád, Schässburg, Záh (Bielz); Salzburg (Ormay); Csukás, Karlsburg, Rotenturm, Schanta, Bistra, Borszék (c. a.); Túdnád (Deubel).

a. **subrufus** Schwarz. Ober-Kerz (Glashütte, (c. a.).

crassicollis Er. S.-Regen, Dees (Bielz); Klausenburg, Karlsburg, Schässburg, Előpatak (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

punctolineatus Pelerin (niger F.). Mühlbach, Hermannstadt, Neudorf b. H., Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, S.-Regen, Dees, Gyeke, Záh (Bielz); Klausenburg, Karlsburg, Hammersdorf, Szováta (c. a.); Stolzenburg, Schanta, Rotenturm (Ormay).

brunneipes Germ. Kerzer Gebirge, Előpatak, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Klausen-

burg, Schässburg, Tordaer Schlucht, Hermannstadt, Kronstadt (c. a.); Stolzenburg (Ormay).

tenebrosus Er. Hátszeg (Deubel, c. a.).
monticola Mén. Rosenau (Burgherg, Juli, Méhely).

606. *Idolus Desbrochers.*

picipennis Bach. Schielthal, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Resinar (Ormay); Schässburg, Balánbánya, Alsó-Rákos, Frecker Gebirge (Serbota), Nagyenyed (c. a.); Rosenau (Burgberg, Méhely); Rodnagebirge (Deubel).

Méhely muss übersehen haben, dass Bielz und Ormay den Betharmion picipennis Bach unter dem Subgenus - Namen Idolus picipennis Bach in der Gattung Agriotes aufführen, da er behauptet, dass Seidlitz (Fauna transs.) zwar den Käfer aus Siebenbürgen anführte, aber Fundorte desselben nicht bekannt seien (Erdély új és ritka bogárfajai 1895. II.).

607. *Betarmion Kiesenwetter.*

ferrugineus Scop. (bishimaculatus Schönh.). Zibins - Gebirge, Fogarasch (Bielz); Schässburg, Karlsburg, Rotenturm, Nieder-Eidisch (c. a.); Hermannstadt (Ormay). Ich sammelte die Art auf Gebüsch an Flussufern.

608. *Drasterius Eschscholtz.*

Auf trockenen, sandigen Grasplätzen und an sandigen Flussufern.

bimaculatus Rossi. Hátszeg, Hermannstadt, Neppendorf, Portumbach, Gross-Schenk, Kronstadt, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz).

609. *Portmidius Germar.*

austriacus Schrank. Kronstadt (Zinne, Deubel, c. a.).

610. *Anchastus Leconte.*

acuticornis Germ. Hermannstadt, Mediasch (Bielz).

611. *Megapenthes Kiesenwetter.*

Iugens W. Redtenb. Hermannstadt (Bielz).

612. *Procræterus Reitter.*

tibialis Lac. Hátszeg, Dees (Bielz); Schässburg (Fuchsloch, Gross-Alscher Kuppen, im Holz alter Eichen, c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

613. *Ischnodes Germar.*

sanguinicollis Panzer. Gross - Scheuern, Hammersdorf (Bielz).

614. Elater Linné.

- cinnabarinus** Esch. Hátszeg, Götzenberg, Gross-Schenk, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszuvalu. Klausenburg (Bielz); Borszék, Szováta, Schässburg (im Holze eines alten Apfelbaumes, c. a.).
- sanguineus** L. Hátszeg, Hermannstadt, Götzenberg, Talmesch, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Schulengebirge, Hosszuvalu, Bozauer Pass, Mediasch, Marosgebirge, Schässburg, Rodnagel. (Bielz); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay).
- var. **rubidus** Cand. Schässburg (in morschem Eichenholz).
- praeustus** F. Tartlau, Kerzer Gebirge, Piatra mare, Mediasch, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Schässburg (c. a.); in morschem Eichenholz).
- pomonae** Steph. Schässburg (in morschem Eichenholz), Előpatak (c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel).
- sanguinolentus** Schrank (ephippium Oliv.). Hátszeg, Kronstadt, Hosszuvalu (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Marosujvár, Schässburg (morsche Eichenholz (c. a.); S. Regen, Marosgebirge (Müller).
- ferrugatus** Lac. (pomorum auct.). Unter-Kerz, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Rodnagelgebirge (c. a.); Hermannstadt (Ormay).
- elongatus** F. Hátszeg, Talmatschel, Rotenturm, Schässburg, Záh (Bielz); Kerzer Gebirge (Ormay); Szunnyokszék, Kronstadt (Zinne, c. a.).
- balteatus** L. Präsbe (Bielz); Borszék (in Fichtenstümpfen), Gyergyó-Szt.-Miklós (c. a.); Rodnagelgebirge (subalpin, Deubel); Bistritz (Müller).
- nigroflavus** Goeze (eracatus Lac.). Präsbe, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm (Ormay); Schässburg (31. Januar, in einem Erlenstumpf am Mühlenkanal, c. a.).
- quadrisignatus** Gyll. Schässburg (auf der Burg einmal im Fluge gefangen, c. a.); S.-Regen (Müller).
- satrapa** Kiesew.
- var. **dibaphus** Schioedte. Schässburg (zwei Exemplare, Fuchsloch, 14. Mai im Holze eines Apfelbaumes, c. a.). Szombathy (Annal. mus. hung. VIII, 1910) bezeichnet Elater fericornis Schwarz als Synonym des Elater satrapa var. diabaphus Schroedte. Die Varietät unterscheidet sich von der Stammform durch die schwarze Behaarung der Ober- und Unterseite. Ich betone hier ausdrücklich, dass meine Exemplare nicht etwa Dimorphe ♂♂ des Elater pomonae sind, die ich auch besitze, denn das dritte Fühlglied ist ebenso gross und fast so breit wie das vierte.
- elegantulus** Schönh. Hátszeg, Kerzer Geb. (Bielz); Rotenturm (Ormay).

sinuatus Germ. Déva, Gross-Pold (Bielz); Schässburg (im Holze alter Eichen, c. a.).

tristis. Borszék (im modernden Holze alter Fichtenstümpfe, ♂ und ♀, c. a.).

? ♀ var. **basalis** Manlh. Borszék (mit dem vorigen, c. a.).

erythrogomus Müll. Zibins-Gebirge, Talmatschel, Girelsau, Gross-Schenk, Hosszuvalu, Bozauer Pass (Bielz); Königstein (Crepatura, 21. Juni, von Geesträuch geklopft, Deubel).

ruficeps Muls. Hermannstadt (Bielz).

nigrinus Payk. Götzenberg (Bielz); Kerzer Gebirge (Bulea, Ormay); Retjezat, Frecker Gebirge (Serbota), Bistra, Malomvitz, Bucsecs, Balánbánya (c. a.); Papole (Méhely); Paringul (Deubel).

nigerrimus Lac. Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt, Präsbe, Bistra (Ormay); Schässburg (in morschem Eichenholz, c. a.); Hátszeg, Kronstadt (Deubel). (Ectamogenous.)

Megerlei Lac. Hermannstadt (Bielz); Resinar (Ormay); Schässburg (c. a.); Keresztenyavas (Méhely); Kronstadt (Zinne, Deubel).

Atholina.

615. Limonius Eschscholtz.

Die Arten leben auf blühenden Pflanzen.

pilosus Leske. Hátszeg, Götzenberg, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Bistritz, Dees, Záh (Bielz); Hermannstadt, Stolzenburg, Szamosujvár (Ormay); Karlsburg, Szurduk-Pass, Szunnyokszék (c. a.).

aeruginosus Oliv. Gross-Scheuern, Holzmenge, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Kronstadt, Alsó-Rákos (Deubel); Szurduk-Pass (c. a.).

minutus L. Gross-Scheuern, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Gyke, Záh (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Klausenburg (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

purvulus Panz. Gross-Scheuern, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Sächs.-Regen, Bistritz (Bielz); Hermannst. (Ormay); Szunnyokszék, Gross-Alisch bei Sch., Alsó-Rákos (c. a.); Hátszeg (Deubel).

616. Pheletes Kiesenwetter.

acneoniger Degeer. (Bruckteri Panz.). Frecker Gebirge (Serbota), Retjezat (c. a.); Nagyhagymás, Negoi, Paringul, Hátszeg, Kronstadt, Vargyastal (Deubel).

quercus Oliv. (lythrodès Germ.). Porcsest (Bielz); Retjezat, Malomvitz (c. a.); Rotenturm (Ormay); Hátszeg (Deubel).

617. *Harminius Fairmairei.*

(*Diacanthus Reitter.*)

- undulatus** Degeer. Kerzer Gebirge, Maros-Gebirge (Bielz); Retjezat, Bistra, Kronstadt, Rodnagelbirge (c. a.); Zernest Bodzaer Gebirge, Schulergeb. (Deubel).
 a. **bifasciatus** Gyll. Zoogebirge, Präsbe, (Bielz).
 a. **limbaticollis** Motsch. Siebenbürgen.

618. *Athous Eschschollzi.*

(*Stenagostus.*)

- villoso** Geoffr. (*rhombeus Oliv.*). Oláhfalu, Oláhlaposbánya (Strimbul, Bielz); Schässburg (Breite, 29. Juni, unter der Rinde einer gestürzten Eiche, c. a.); S.-Regen (Müller).

(*Athous s. str.*)

- hirtus** Hbst. (*orrectus Thoms.*). Neudorf b. H., Kerzer Gebirge, Előpatak, Mediasch, Borszék (Bielz); Hermannstadt, Götzenberg, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Karlsburg, Schässburg (auf wildem Wein, c. a.); Nagyhagymás, Rodnagelbirge (Deubel).

- niger** L. (*alpinus Redt.*). Gölzenberg, Kronstadt (Bielz); Bistra, Kerzer Gebirge (Ormay); Balánbánya, Retjezat, Bucecs, Rodnagelbirge, Előpatak, Rosenau, Schässburg (auf Gehüschl, besonders auf Himbeergesträuch, c. a.).

- var. **scrutator** Hbst. Hermannstadt, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Schässburg (Bielz); Zernest (Deubel).

(*Grypocarus.*)

- vittatus** F. Hászeg, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Tartlau, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees, Záh (Bielz); Hermannstadt, Magyar-Bükös (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Klausenburg (c. a., auf Gehüschl, namentlich in Holzschlägen); Vargyastal (Deubel).

- var. **Ocskayi** Kiesenw. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (c. a.).

- haemorrhoidalis** F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees, Záh (Bielz); Hammersdorf, Szamosujvár (Ormay); Szunyokszék, Klausenburg (c. a.); auf Gehüsch wie der vorige.

(*Anathrotus.*)

- subfuscus** Müll. Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schulergebirge, Frecker Gebirge (Serbota), Szurduk-Pass, Retjezat, Balánbánya, Szunnyokszék, Borszék, Rodnagelbirge (c. a.); Bodzaer Gebirge (Deubel).

- zebel** Bach. Gross-Scheuern, Kerzer Geb., Mediasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

A. Zebei Bach findet sich in meinem gesammten, ziemlich reichen, von Reitter revisierten Materiale nicht. Er gehört den mittel-europäischen Gebirgen an, und ich besitze ihn z. B. aus dem böhmisch-sächsischen Erzgebirge. Da von Reitter viele neue Arten beschrieben worden sind, dürfte das Vorkommen des A. Zebei bei uns sehr fraglich sein, jedenfalls empfiehlt sich eine diesbezügliche Revision der Fundorte.

- mollis** Reitter. Tesla (Bodzaer Gebirge, Méhely); Rodnagelbirge, Schässburg, Kronstadt (Zinne), Retjezat, Balánbánya, Borszék (c. a., ♂ ♀); Hászeg, Nagyhagymás (Deubel).

- carpathicus** Reitter. Klausenburg, Rotenturm (c. a.).

- austriacus** Desbr. (*circumscriptus* Reitter). Puj (b. Hászeg), Rotenturm, Borszék, ♀ Előpatak (c. a.).

- circumductus** Men. Schielthal (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Bodzaer Gebirge (Deubel).

(*Euplatouthos.*)

- difformis** Lac. Zibins - Gebirge (Bielz); Schanta (Ormay).

A. Dejeani Lap. dürfte bei uns nicht vorkommen und verwechselt worden sein mit A. carpathophilus Reitter, den ich aus Klausenburg besitze, woher Bielz seinen A. Dejeani anführt. Zweifelhaft ist auch das Vorkommen des A. difformis bei uns, wenigstens bedarf dasselbe weiterer Nachweise.

(*Grypatheros.*)

- longicollis** Oliv. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt (?), Tartlau (?), S.-Regen, Dees (Bielz); Hermannstadt, Götzenberg, Sölzenburg (Ormay); Karlsburg (c. a.); Vargyastal (Deubel).

- picipennis** Reitter. Schässburg, Ratosnya (c. a.).

- carpathophilus** Reitter. Klausenburg, Rotenturm (c. a.).

- plagipennis** Reitter. Schässburg (Fuchsloch, 18. Juni, c. a.).

- circumscriptus** Cand. Kerzer Geb. (Bielz); Hászeg, Klausenburg (Zinne, Deubel).

Denticollini.

619. *Denticollis Pilleri.*

- rubens** Piller. Zibinsgebirge, Kerzer Geb., Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Maros-Gebirge (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Hermannstadt, Retjezat, Balánbánya (c. a.); Rodnagelbirge, Zernest, Bodzaer Gebirge, Schulergebirge (Deubel).

- linearis** L. In unseren Gebirgen und im Bergland verbreitet.

XLVIII. Cerophytidae.

620. *Cerophytum Latreille.*

elateroides Latr. Schässburg (Witenberg, 3. April, an einem Ahornstamm unter Rinde, c. a.).

XLIX. Eucnemidae.

Melasini.

621. *Melasis Olivier.*

buprestoides Lap. Zood. Rotenturm, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Zinne), Mediasch (Bielz); Resinár (Ormay); Előpatak, Schässburg (Siechhofberg, 1. Mai, aus dem morschen Holz einer Weissbuche, c. a.). Alsó-Rákos (Magy. Tepe, Deubel).

622. *Isorhipis Lacordaire.*

(*Tharops* Laporte.)

melasoides Lap. Hlászeg (Páros, Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

Eucnemini.

623. *Euenemis Ahrens.*

capucina Ahr. Gross-Scheuern (Bielz); Kronstadt, Rosenau (Deubel).

624. *Dirrhagus Latreille.*

(*Mierorrhagus*.)

lepidus Rosenh. Rotenturm (Bielz); Honigberg (Deubel).

pygmaeus F. Hévíz, Rotenturm (Bielz); Kronstadt, Balánbánya, Ratosnya unter Blättern des in büschelförmigen Gruppen stehenden Haselgestrauches, 18. Juli, c. a.).

(*Dirrhagus*.)

clypeatus Hampe. Hermannstadt (Bielz). **attenuatus** Mäkl. (*longicornis* Hampe). Hermannstadt (Bielz).

625. *Hypocoelus Lacordaire.*

procerus Mannh. Borgoer Pass (Bielz); Előpatak (im Holze eines gefällten, morschen Weidenstamms, Juli, c. a.).

Trixagini.

626. *Trixagus Kugelann.*

Die Arten finden sich unter Reisighaufen, unter Blättern, in und am Holz.

brevicollis Bonv. Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Ratosnya (c. a.); Kronstadt (Deubel).

dermestoides L. Hlászeg, Hermannstadt, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Roteulurm, Schässburg

(einmal in grosser Menge unter Reissig auf der Breite, c. a.).

carinifrons Bonv. Hlászeg, Hermannstadt (Bielz); Rodnagelürge, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel); Ratosnya (Müller, c. a.).

elateroides Heer. Dobra, Hlászeg, Gross-Scheuern (Bielz); Rotenturm, Bistra, Karlsburg (c. a.).

var. **Bonvouloiri** Desbr. (*modestus* Weise) Hermannstadt (Bielz).

exul Bonv. Kronstadt (Deubel).

Duvali Bonv. Bonecz - Nyires (Méhely); Schässburg in Baumwulum, Kokelufer unter Geniste, c. a.).

obtusus Curt. Mezőség (Gyéke, Záh, Bielz); Marosujvár, Karlsburg, Schässburg (Witenberg, Atelhill, c. a.); Kronstadt, Hammersdorf (Deubel)

627. *Drapetes Redlenbacher.*

biguttulus Piller (mordelloides Host.); Klausenburg (Bielz); Kerzer Gebirge (Ormay); Schässburg, Előpatak (in jungen Holzschlägen auf Eichentrieben, c. a.); Kronstadt, Honigberg, Nussbach (Deubel).

L. Buprestidae.

628. *Chalcophora Solier.*

mariana Lap. Talmatschel (Bielz).

629. *Perotis Spinola.* (*Aurigena* Laporte.)

lugubris F. Mühlbach, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Gyéke, Záh), Hermannstadt, Buzsá (Unterweissenburger Komitat), Nagyenyed, Magyarforró (Unterweissenburger Komitat), Haró (Hungader Komitat), Schässburg (an Obstbäumchen, c. a.); Dieső-Szt. Márton (Csiki).

630. *Capnodis Eschscholtz.*

tenebrionis L. Reussmarkl, Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Tartlan, Mediasch, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Szamosujvár (Ormay); Karlsburg (Weingärten, c. a.).

631. *Dicerca Eschscholtz.*

aenea L. Mühlbach, Reussmarkt, Hermannstadt, Zood, Unter-Kerz, Kronstadt (Bielz); Tusnád (Deubel).

berolinensis Hbst. Karlsburg, Mühlbach, Gross-Pold, Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Schässburg (Schrankel, 6. Mai, c. a.); Msó - Rákos (Deubel).

632. *Poeillonota Eschscholtz.*

variolosa Payk. Zood (Bielz); Hermannstadt (j. W., c. a.).
rutilans F. Hermannstadt, Neudorf bei H., Kerzer Gebirge, Klausenburg (Bielz); Schässburg (2. Juni, c. a.); Rosenau (Deubel).

633. *Buprestis Linné.*

aurulenta L. (splendida Payk.). Zibinsgebirge (Bielz).
rustica L. Talmesch, Zood, Kerzer Geb., Törzburg, Kronstadt, Hosszufalu, Tusnád, Borszék, Marosgebirge (Bielz); Bistra (Ormay); Frecker Gebirge (Sorbata). Schässburg, Rodnaberg (auf frisch gesägten Brettern c. a.); Schulengebirge (Deubel).
haemorrhoidalis Herbst. Rodnaberg (c. a.); Kronstadt, Zernest (Deubel); Tusnád (Müller).

634. *Eurythrea Sol.*

austriaca. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Tusnád, Marosgebirge (Bielz); Rodnaberg (auf frisch gesägten Fichtenbrettern, c. a.).
scutellaris Oliv. Hermannstadt, Zood, Kerzer Gebirge (Bielz).
marginata Oliv. (micans F.). Talmatschel (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schässburg (untere Wench, August, c. a.).

635. *Melanophila Eschscholtz.*

acuminata Deg. Zood, Kronstadt (Bielz); Rodnaberg, Kovászna (Deubel).

636. *Phaenops Lacordaire.*

cyanæa F. Kronstadt, Hosszufalu, Tarflau, Gyergyó, Marosgebirge (Bielz).

637. *Anthaxia Eschscholtz.*

Die Arten findet man in den Blüten niederer Pflanzen bei Sonnenschein, besonders der Compositen.

olympica Kiesenw. Hammersdorf auf Wucherblumen, Chrysanthemum, 3. Juli, Ormay).

echorii Oliv. Hászeg, Rothberg b. H., Schässburg (Bielz); Baassen (c. a.); Gyergyó (Bad), Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt (Deubel).

millefolii F. Vásárhely, Nyáradtal (Bielz).

inculta Germ. (? unbellatarum F.). Gross-Pold (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Puj (bei Hászeg), Schässburg (c. a.).

aurulenta F. Déva (Bielz).

manca F. Gross-Pold, Mediasch (Bielz); Schässburg (c. a.).

Hackeri Friv. Siebenbürgen.
salicis F. Gross-Scheuern, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay, c. a.); Szunyokszék b. Kr., Schässburg (c. a.); Kronstadt, Vargyas (Deubel).

var. **speciosa** Csiki. Siebenbürgen.

fulgurans Schrank. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet auf Blüten.

grammica Lap. Gross-Scheuern (Bielz); Vargyasbach (Almásér Höhle, Deubel).

nitidula L. Hászeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Mezőség (Gyeye, Bielz); Gyögy (Ormay). var. **signaticollis** Kryn. Gross-Scheuern, Rothberg b. H., Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

funerula Ill. Kronstadt (Zinne, Deubel).
morio F. Keresztlényhavas, Schulergebirge (Méhely); Hászeg (Deubel).

plicata Kiesenw. Siebenbürgen (Bielz).
sepulchralis F. Klausenburg (Bielz); Balánbánya, Borszék (c. a.).

quadripunctata L. In unseren Gebirgen und im Bergland verbreitet.

Polycestini.

638. *Ptosima Solier.*

II-maculata Herbst. Hermannstadt, Hammersdorf, Mediasch, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Baassen (unter den Weingärten am Stamm eines Pfauenbaumes, 11. Juni, c. a.).

639. *Aemaeodera Eschscholtz.*

convolvuli Waltl. (cylindrica auct.). Fogarasch (Bielz).

degener Scop. (18-guttata Piller). Gross-Scheuern, Giresau, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Baassen (unter den Weingärten gekötschert, c. a.).

pilosellae Bon. Klausenburg (Bielz).

flavofasciata Pill. Hermannstadt, Rothberg, Gross-Schenk, Kronstadt, Tarflau, Mediasch (Bielz); Schässburg (auf Chrysanthemum - Blüten am Wieteberg), Baassen (ebenso), Vargyasbach (Almásér Höhle, Deubel); Sächs.-Regen (Müller).

640. *Sphenoptera Solier.*

antiqua Illig. Hermannstadt, Unter-Kerz, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Nagylak (Unterweissenburger Komitat, Ormay).

Chrysobothrini.

641. *Chrysobothris Eschscholtz.*

chrysostigma L. Gyergyó, Borgoer Pass (Bielz); Rodna - Gebirge (auf abgehauenen Tannenstämmen, c. a.).

affinis F. In unsern Vorgebirgen und im Bergland verbreitet.

Solieri Lap. Marosgebirge (Bielz).

Ch. Solieri Lap. ist dem Ch. *affini* sehr ähnlich, durch weniger breites Hals-schild, schmäler, zur Spitze gerade vereigte Flügeldecken, deren Grüchen breiter sind, verschieden. Das Vorkommen dieser Art bei uns erscheint mir nicht ausser allem Zweifel.

Trachydini.

642. *Coraebus* Laporte.

tampsanae Bon. (elatus F.). Déva, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neulorß, Mezőség (Gyeké, Bielz); Hâtszeg, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

643. *Agrius* Curtis.

Die Arten finden sich auf verschiedenen Holzarten, in denen ihre Larven leben, auch auf Blüten.

sexguttatus Brahm. (biguttatus Rossi). Gross-Pold, Gross-Schenk, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S.-Regen (Bielz).

Es ist nicht ausgeschlossen, dass hier ein Irrtum eingeschlichen ist zwischen A. *biguttatus* Rossi = *sex guttatus* Brahm und *biguttatus* F.; Schässburg wenigstens ist aus der Reihe der Fundorte gestrichen.

biguttatus F. (pannonicus Piller). Hermannstadt, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau (Bielz); Schässburg (c. a.); Bistritz (Müller); Klausenburg (Deubel).

sinuatus Oliv. Hâtszeg, Hermannstadt, Hammersdorf (Bielz); Nagyenyed (Ormay); Kronstadt (Zinne, c. a.).

subauratus Gebl. Hammersdorf (Bielz).

viridis L. Kronstadt, Schässburg (Deubel); Hermannstadt, Gyögy (Bad), Buleasee Kerzer Gebirge (Ormay).

var. *novicus*. Ratzelburg, Schässburg (Bielz); Zibinsgebirge (Ormay); Borszék, Nussbach (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. *fagi* Ratzel. Hermannstadt (Bielz); Rodnagebirge, Kronstadt (Deubel); Borszék (c. a.).

coeruleus Rossi. Hammersdorf, Rotenturm, Schässburg (Bielz); Kronstadt (Deubel).

? *fissifrons* Ab. Borszék (3 Exemplare, c. a.).

Robertii Chevr. Hammersdorf (Deubel, 22. Juni).

elongatus Herbst. Hermannstadt, Zibinsgebirge, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg (Bielz).

angustulus Illig. Grossau, Gross-Schenk, Hosszufalu, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Klausenburg (c. a.); Hermannstadt (c. a., Ormay); Hâtszeg, Kronstadt (Deubel).

var. *rugicollis*. Dobra (Bielz); Hermannstadt, Stolzenburg, Remete (Nagyenyed, Ormay).

laticeornis Illig. Honigberg (Altfloss, 21. Juni, Deubel).

olivaceolus Kiesenw. Kronstadt, Schässburg (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

hastulifer Ratzel. Kronstadt (Zinne, Deubel).

graminis Lap. Schässburg (1 Exemplar, c. a.); Reps (Seidlitz).

derasolasciatus Lae. Gross-Scheuern, Giersau (Bielz); Klausenburg, Baassen (c. a.).

antiquus Muls. Hermannstadt (von Eichen geklopft, Ormay); Kronstadt, Erösd (Alt, Deubel).

sericans Kiesenw. Bonecz-Nyires (Méhely); Torda (Deubel).

aurichalceus Redtenb. Hâtszeg, Kronstadt (Zinne, Deubel).

integerimus Ratz. Klausenburg, Borszék (c. a.).

hyperici Crtz. Zibinsgebirge (Bielz); Hammersdorf, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

obscureicollis Kiesenw. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

Trachyinl.

644. *Trachys* Fabr.

minuta L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

pygmaea F. (corusea Panz.). Zood (Bielz).

froglydotes Gyll. Hâtszeg, Hermannstadt (Bielz); Gyergyó (Ormay); Kronstadt (Deubel).

pumila Illig. Hermannstadt, Neppendorf, Gross-Scheuern, Előjatak, Schässburg (Bielz); Hâtszeg (c. a.); Kronstadt Erösd (Altfloss, Deubel).

645. Habrolooma Thomson.

nana Herbst. Hâtszeg, Gross-Scheuern (Bielz); Kronstadt (Deubel).

L. Lymexylidae.

646. *Hyloeoctes* Latreille. (Elateroides Schäffer.)

dermestoides L. In unseren Gebirgen und im Bergland verbreitet.

var. ♂ *Marei* L. Rodnagebirge (Deubel).

var. ♂ *Morio* F. Rodnagebirge (Deubel).

647. *Lymexilou* Fabr.

In altem Holze.

navale L. Hermannstadt, Götzemberg, Zood, Gross-Schenk, Kronstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Zernest (Deubel).

LII. Bostrichidae.

Psoini.

648. *Psoa Herbst.*

viennensis Herbst. Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Mediasch (Bielz); Vajda-Hunyad, Schässburg (von Hecken geklopft und aus alten Weinrebentrieben gesiebt, c. a.).

Bostrichini.

649. *Stephanopachys Waterhouse.* (*Dinoderus* Kiesenw., Seidlitz.)

substriatus Payk. Hermannstadt, Zood, Präsbe, Sterpu, Girku, Kronstadt (Bielz); Kerzer Gebirge (Ormay).

650. *Bostrichus Geoffroy*

capucinus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

651. *Xylonites Lesne.*

(*Xylopertha* Kiesenw., Seidlitz.)

retusus Oliv. (φ *sinuatus* F.). Hammersdorf, Gross-Scheuern (Bielz); Haró (Hunyader Komitat), Remete (Nagyenyed, Ormay); Schässburg, Nagyenyed (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

652. *Sinoxylon Duflschmid.*

perforans Schrk. (*bispinosum* Oliv.). Klausenburg (Bielz); Schässburg (Fuchslöch von einer Hecke geklopft, c. a.).

LIII. Lyctidae.

Lyctus Fabr.

linearis Goeze. (*unipunctatus* Hbst.). Fogarasch, Retjezat, Hátszeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Schenk, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Bistritz, Mezőség (Záh, Bielz).

Nach meinem Material erhalte ich die Ueberzeugung, dass *L. linearis*, dessen Fühlerkeule so lang sein soll, als die übrigen Glieder zusammen, bei uns gar nicht vorkommt, sondern nur *L. pubescens*. Besonders machen mich die zahlreichen Fundorte, die Bielz für diese Art angibt, stutzig, während er für *L. pubescens*, der nicht selten vorkommt, nur wenige Fundorte angibt.

pubescens Panz. Hátszeg, Retjezat, Schässburg, Mezőség (Gyéke, Bielz); Alsó-Rákos, Előpatak (auf frisch geschältem Weidenholz oder auf frischen Wunden der Weiden, auch an Telegraphenstangen (c. a.); Kronstadt, Honigberg (an Eichenstämmen, Deubel).

LIV. Ptinidae.

Gibbiini.

654. *Gibbium Scopoli.*

psyloides Czempinski. Hermannstadt (La-zareth), Klausenburg (auf Sumpfpflanzen, Bielz); Hammersdorf, Salzburg (Ormay).

Ptinini.

655. *Pitus Boieldieu.*

hololeucus Falderm. Kronstadt (Deubel, aus dem Kehricht einer Spezereihandlung, vielleicht importiert).

656. *Ptinus Linné.*

(*Pseudoptinus*)

lichenum Marsh. Zibinsgebirge (Bielz); Rotenturm (Ormay).

coarcicollis Sturm. Schässburg (Witeberg, 25. Februar, wahrscheinlich an einer alten Eiche, c. a.); Rotenturm, Bucsecs (subalpin, Deubel).

(*Bruchoptinus*)

rufipes Oliv. Hátszeg, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Marosujvár, Hammersdorf, Vajda-Hunyad (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(*Ptinus i. sp.*)

fur L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

pussillus Sturm. Schässburg (30. März Witeberg, 11. April Breite, wahrscheinlich aus alten Eichen, c. a.).

bicinctus Strm. Kronstadt (Bielz).

Der Fundort Schässburg ist aus dem Verzeichnis zu streichen.

latro F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

brunneus Duft. Hátszeg (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

villiger Reitter. Hermannstadt (Februar), Kerzer Gebirge (Juli, Ormay); Unter-Kerz, Bistra, Baassen, Schässburg, Hátszeg (in Eichen, c. a.).

perplexus Rey. Hermannstadt (8. März), Klein-Pold (24. Oktober, Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Hátszeg, Schässburg (März, unter alten Reben, c. a.).

filosus Müller. Hátszeg (Bielz); Klein-Pold (Ormay); Schässburg (c. a.); Hátszeg, Kronstadt, Rotenturm (Deubel).

subpilosus Strm. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Bucsecs (subalpin, Deubel).

(*Gynopterus*)

dubius Sturm. Gross-Scheuern, Mediasch (Bielz).

variegatus Bossi. S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Hermannstadt (c. a.).

(*Uphodeses*.)

raptor Sturm (*bidens* Sturm). Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu (Bielz), Hermannstadt, Heltau, Schanta (Ormay); Paringul, Schässburg (c. a.); Rodnagbirge (alpin), Rosenau (Deubel).

Pt. *bidens* Oliv scheint bei uns nicht vorzukommen.

Schlerethi Reitter. Hermannstadt (17. Mai, Ormay); Schässburg (April, Eichenmulm (c. a.); Alsó-Rákos (Deubel).

LV. Anobiidae.

Die Arten leben grösstenteils in altem Holz.

Hedobilini.

657. *Hodobia Sturm.*

imperiatis L. Michelsherg, Schässburg, Klausenburg (Bielz); Rotenturm, Hammersdorf, Kronstadt (c. a.); Schulergebirge, Zinne (Deubel).

regalis Duft. Gross-Scheuern (Bielz).

658. *Dryophilus Chevrolat.*

pusillus Gyllh. Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (c. a.); Schuler (Pojana, von Fichten geklopft, Deubel).

659. *Gastrallus Duval.*

immarginatus Müll. Gross-Scheuern (Bielz); Håtszeg (Deubel).

laevigatus Oliv. Hermannstadt (Ormay).

660. *Xestobium Motschulsky.*

(*Hyperisus*.)

plumbeum Ill. Paringulgebirge, Kronstadt (Zinne), Rosenau (Deubel); Szováta (5. Juni, c. a.).

(*Xestobium i. sp.*)

rufovillorum Deg. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

austriacum Reitter. Negoi (1 Exemplar, c. a.).

661. *Ernobius Thomson.*

Kiesenwetteri Schilsk. (pini Muls). Parangulgebirge (subalpin, Deubel).

nigrinus Strm. Håtszeg, Kronstadt (Zinne, Deubel).

var. **politus** Redtb. Rodnagbirge (c. a.).

abietinus Gyll. Kronstadt, Borszék (Bielz); Schanta (Ormay); Rodnagbirge, Parangulgebirge, Schulergebirge, Bucsees (alpin, gesiebt, Deubel).

abietis F. Schanta (Ormay); Schulergeb., Königstein (Crepatura, Deubel).

mollis L. Zibinsgebirge, Sächs.-Bogen (Bielz); Baassen, Schässburg, Borszék (c. a.).

662. *Anobium Fabricius.*

Die Arten leben in altem Holz.

Dendrobium.

denticolle Panz. S.-Regen, Dees (Bielz); Kerzer Gebirge, Gyögy (Bad, Ormay); Kronstadt (Deubel).

pertinax L. In unseren Gebirgen und im Berglande verbreitet.

(*Anobium s. str.*)

striatum Oliv. (*domesticum* Geoffr.). Håtszeg, Hermannstadt, Unter-Kerz, Fogarasch, Tartlau (Bielz); Schässburg, Olahsfalu, Heviz, Frecker Gebirge (Serbota), Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Zinne), Paringul (subalpin, Deubel). (Hadrabregmus.)

rufipes F. Gross-Scheuern, Fogarasch, Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schässburg (in alten Weissbuchenholz). Szováta, Kronstadt (c. a.).

nitidum Herbst. Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm (Ormay); Schässburg (Peissel 25. Juli, in altem Lindenholz, c. a.).

fulvicorne Strm. Fogarasch (Bielz); Kronstadt (c. a.); Håtszeg (Deubel); Klausenburg Müller).

var. **rubrum** Reitter. Håtszeg (Deubel).

var. **rufipenne** Duft. Götzemberg (Ormay).

tagi Muls. Kronstadt Zinne, Deubel).

663. *Oligomerus Redtenbacher.*

ptilinoides Woll. (Reyi Bris.). Hermannstadt (Mai, Ormay).

brunneus Oliv. Håtszeg, Präsbe, Kronstadt (Zinne, Bielz); Hammersdorf (Ormay); Baassen, Schässburg (Lattenzaun, 6. Juli, c. a.).

664. *Sitodrepa Thomson.*

panicea L. Hermannstadt, Gross-Schenk, Kronstadt (Zinne), S.-Regen (Bielz); Rotenturm (Ormay); Karlburg, Schässburg (Wohnhaus, 6. August, c. a.); Schulergebirge (Deubel).

Xyletinini.

665. *Trypopitys Redtenbacher.*

carpini Herbst. Zood (Bielz); Schässburg (im Hause), Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel); S.-Regen Müller).

666. *Ptilinus Geoffroy.*

pectinicornis L. Håtszeg, Götzemberg, Zood, Gross-Schenk, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Malomvitz (c. a.).

fuscus Geoffr. (*costatus* Gyllh.). Håtszeg, Präsbe, Tartlau (Bielz); Kerzer Geb. (Ormay); Schässburg, Kronstadt, Frecker Gebirge (Serbota), Malomvitz, Alsó-Rákos (c. a.).

667 *Xyletinus Lalreille.*

- maculatus* Kiesenw. Siebenbürgen (Catalog. col. Europae 1906, 131).
afer Panz. Rotenturm (Juli, Ormay); Rodnaggebirge, Schässburg (Scheunereberg, gekötschert, Mai, Breite, 1. Juni, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
brevitarsis Schilsky. Hermannstadt (2 Ex. c. a.).
peclinatus F. Hermannstadt, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Wolkendorf (Deubel).
talieollis Duft. Gross-Scheuern (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Kalán, Schässburg (Scheunereberg 23. Mai, gekötschert, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
oblongulus Muls. Schässburg (1 Exempl., c. a.).

668. *Lasioderma Stephens.*

- obscurum* Solsky. Baassen (Juli, 1909, c. a.).

669. *Ochina Stephens.*

- Latreillei* Bon. Klausenburg (Bielz).

Dorcatomini.

670. *Dorcatoma Herbst.*

- flavicornis* F. Bolzmengen (Bielz); Wolken-dorf (Deubel).
chrysomelina Sturm. Hermannstadt (Bielz); Schässburg, Előpatak (c. a.); Hammersdorf (Ormay).
dresdensis Herbst. Schielthal, Petrozsény, Fogarasch (Bielz); Schässburg, Borszék (c. a.); Alsó-Rákos (Deubel).

671. *Coenocara Thomson.*

- bovistae* Hoffm. Fogarasch (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).
subglobosa Muls. Schässburg (Siechhofwald, 20. Juli, auf Bovist, c. a.).

Heteromera.

LVI. Oedemeridae.

Calopini.

672. *Calopus Fabricius.*

- serraticornis* L. Gyergyó (Bielz); Kis-Somlyó (Méhely); Schuler (oberhalb der Wolfsschlucht unter Fichtenrinde), Präsbe (oberhalb der Schutzhütte von trockenen Fichten geklopft, Deubel).

673. *Sparedrus Serville.*

- testaceus* Andersch. Gross-Pold (Bielz); Bistritz (Müller).

Oedemerini.

674. *Anoncodes Duponchel.*

Auf blühenden Pflanzen: Disteln, Schirmblüten etc.

(Nacerda.)

- mehanura* L. Hátszeg (Bielz).

(Anoncodes.)

- rufiventris* Scop. Dobra, Kerzer Gebirge, Borgoer Pass, Dees (Bielz); Balán-bánya, Arpascher Gebirge, Rotenturm, Baassen, Malomvitz, Rodnaggebirge (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

- ustulata* F. Talmatschel, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg, Baassen, Kronstadt (Giespreng), Bucsecs, Retjezat (c. a.); Vargyas (Almáser Höhle), Hátszeg (Deubel).

- fulvicollis* Scop. Dobra (Bielz); Nagy-Hagymás, Schuler (Varna im Tömös-Tal, Deubel).

(Pachychirus.)

- adusta* Panz. Gross-Scheuern, Mediasch, Borszék, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Rotenturm, Kerzer Gebirge (Ormay); Hátszeg (Deubel).

675. *Ischnomera Stephens.*

- sanguinicollis* F. Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Hosszuvalu (Bielz); Schulergelände, Malomvitz, Schässburg (Eichrücken, c. a.).

- coerulea* L. Zibinsgebirge, Präsbe, Kerzer Gebirge, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Klausenburg, Nagy-enyed (c. a.); Kronstadt, Zernest (Deubel).

676. *Chrysanthia Schmidt.*

- viridissima* L. Fogarasch, Sächs.-Regen, Gyergyó (Bielz); Frecker Gebirge (Sorbola, c. a.); Hátszeg, Nagyhagymás (Öcsém), Zernest (Plajú fő, Deubel).

- viridis* Schmidt. Zibinsgebirge, Fogarasch, Fogarascher Gebirge, Tartlau, Oláhfalu, Borszék, Borgoer Pass, Kerzer Geb. (Bulea, Bielz); Balán-bánya, Borszék, Schässburg (c. a.); Nagyhagymás (Öcsém, Deubel).

677. *Oncomera Stephens.*

(Dryops Fabr.)

- femorata* F. Kronstadt (Deubel, Zinne, geklopft, Abend ans Licht geflogen im Schützenhaus).

678. *Oedemera Olivier.*

Auf blühenden Pflanzen.

(Oedemeronia.)

- flavipes* F. Hátszeg (2 ♀♀, c. a.).

(Oedemerastra.)

- podagrariae* L. Hermannstadt, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Oláhfalu, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Retjezat, Előpatak (c. a.).

(Oedemerella.)

croceicollis Gylly. Gross-Scheuern (Bielz), Schässburg (Scheuerberg, 13. Mai, auf Schilfrohr, c. a.).

(Oedemera i. sp.)

flavescens L. (femorata Ganglb.). Hermannstadt, Zibinsgebirge, Girelsau, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Schässburg, Oláhfalu, S.-Regen (Bielz); Stolzenburg, Bistritz (Ormay); Hátszeg, Előpatak, Nagyenyed (c. a.).

subulata Oliv. Gross-Scheuern, Rotenturm, Oláhfalu (Bielz); Schässburg, Tordaeer Schlucht (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

tristis Schmidt. Rodnagebirge (Deubel).

Deubeli Ganglb. Kronstadt (Zinne, Deubel, c. a.).

(Oedemerina.)

virescens L. Hermannstadt, Marpol, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Mediasch, Schässburg, Oláhfalu, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Zood, Resimar (Ormay).

turida Marsh. Hermannstadt, Kerzer Geb., Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Kronstadt (Zinne, Deubel).

LVII. Pythidae.

Pythini.

679. *Pytho Fabricius.*

depressus L. Zood, Präsbe, Fogarascher, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schulergeb., Görgényer Tal und Gebirge, Marosgebirge (Bielz).

Salpingini.

680. *Lissodema Curtis.*

4 - **pusillum** Marsh. Karlsburg (unter den Weingärten aus abgeschnittenen alten Reben in grosser Anzahl gesiebt, 28. Mai), S.-Regen, Vajda-Hunyad (c. a.).

cursor Gyll. Schässburg (aus Aststückchen, 28. Juni, c. a.); Kronstadt (Zinne), Honigberg (23. Juni, Deubel).

681. *Spaeriestes Stephens.*

Was für eine Art Bielz mit Salpingus (Colposis) ruficollis Panz. meint, kann ich nicht eruieren; nachdem er auch Schässburg unter den Fundorten aufzählt, hat es den Anschein, dass mit dieser Art Rhinosimus ruficollis L. gemeint ist.

foveolatus Ljungb. Fogarasch (Bielz); Szováta, Schässburg (Februar und April, Wietberg, aus morschem Weissbuchenholtz, c. a.).

682. *Rhinosimus Latreille.*

Die Arten leben im Holz, namentlich in den Ästen verschiedener Bäume.

viridipennis Latr. Rotenturm, Schässburg (Musler, Fuchsloch, Buche, c. a.); Kronstadt, Hátszeg, Schuler Deubel, Bistritz (unter Eichenrige, Müller).

ruficollis L. Gross-Scheuern, Götzemberg, Kronstadt, Gyergyó Bielz); Csukás, Büdös, Schässburg (in Weissbuche), Rodnagebirge, Beljezat (c. a.); Tusnád (Deubel).

planirostris F. Grossscheuern, Götzemberg, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Retjezat, Gross-Alischer Kupen bei Sch., Teroczkó, Klausenburg, Busecs (c. a.); Bistritz (Müller).

Mycterini.

683. *Myterus Olivier.*

curelionoides F. S.-Regen, Klausenburg (Bielz).

umbellatarum F. Talmatschel, Sächs.-Regen (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

LVIII. Pyrochroidae.

684. *Pyrochroa Geoffroy.*

coccinea L. Durch das Bergland verbreitet.
serraticornis Scop. (purpurata Müll.). Hermannstadt, Gross-Schenern, Neudorf b. H., Holzmengen, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Maros-Gebirge (Bielz); Schässburg, Hammersdorf, Rotenturm (c. a.); Vargyasbach (Mmäser Höhle, Deubel).

pectinicornis L. Retjezat, Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Hermannstadt (c. a.); Schulergebirge, Rodnagebirge (Deubel).

LIX. Hylophilidae.

(Pedilidae.)

685. *Phytobaenus Saltberg.*

amabilis Saltb. Klausenburg (Bielz).

686. *Hylophilus Berthold.*

Englenes Westwood.

(Aderus.)

populneus Panz. Schässburg (im Holze alter Eichen), Klausenburg, Előpatak (c. a.); Rosenau (Deubel); S.-Regen (Müller).

pygmaeus Degeer. Zibinsgebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

var. **oculatus** Panz. Zibinsgebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg, Baassen, Schässburg (c. a.).

LX. Anthicidae.

687. Notoxus Geoffroy.

biinterruptus Pic. Rotenturm (auf Weiden am Alt), Kronstadt (c. a.).

monoceros L. Ilátszeg, Hermannstadt, Neppendorf, Neudorf b. H., Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Karlsburg, Ratosnya (c. a.).

brachycerus Fald. Hermannstadt, Neppendorf, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Bistritz (Müller).

cornutus F. (trifasciatus Rossi). Hátszeg, Előpatak, Klausenburg (Bielz); Kronstadt, Rotenturm, Nagyenyed (c. a.).

miles Schmidt. Előpatak (c. a.); Kronstadt (Bielz).

688. Mecynotarsus Laferté.

serricornis Panz. Hermannstadt, Holzmen-gen (Bielz).

689. Formicomus Laferté.

pedestris Rossi (formicarius auct.). Hermannstadt, Schässburg, Dees, Mezőség (Gyeke, Bielz); Déva, Nagyenyed (c. a.); Vajda-Hunyad (Deubel).

690. Authieus Payk.

humilis Germ. Déva, Salzburg, Fogarasch, Kronstadt, Hosszuvalu (Bielz); Dees-akna, Baassen (c. a.).

floralis L. Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Gross-Schenk, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Bielz); Kronstadt, Schässburg, Szovála (c. a.); Hermannstadt, Remete (Nagyenyed, Ormay).

var. **formicarius** Goeze. Kronstadt, Schässburg, Klausenburg (c. a.).

gracilis Panz. Hermannstadt, Mezőség (Záh, Bielz); Kronstadt, Schässburg (c. a.).

hispidus Rossi. Schässburg (einmal im Körper einer abgestorbenen Sitaris inu-ralis, 1. Oktober, c. a.); Hátszeg (Deubel).

antherinus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

bifasciatus Rossi. Hátszeg, Neudorf bei H., Gross-Schenk, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Nagyenyed, Karlsburg (c. a.).

ater Panz. Rotenturm (c. a.).

fenestratus Schmidt. Hermannstadt (Bielz).

flavipes Panz. Rotenturm (Altufser, Bielz); Kronstadt (c. a.).

axillaris Schmidt. Hermannstadt, Klausenburg (Bielz); Unter-Kerz, Nagyenyed, Schässburg (c. a.); Brendorf (Priester-hügel, Deubel).

sellatus Paaz. Honigberg (Altfloss, Deubel).

unicolor Schmidt. Gross-Scheuern, S.-Regen (Bielz); Honigberg (Altfloss, Deubel).

691. Ochthenomus Schmidt.

tenuicollis Rossi. Fogarasch (Altufser, Bielz).

LXI. Meloidae.

Meloind.

692. Meloë Linné.

Die Käfer findet man unter Blättern und im Gras, die Larven leben parasitisch in verschiedenen Bienennestern. (Proscarabaeus.)

proscarabaeus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

violaceus Marsh. Wie der vorige verbreitet.
autumnalis Oliv. Neudorf, Hosszuvalu, Medi-asch (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Szamosujvár (Ormay).

(Meloë i. sp.)

hungarus Schrnik. Hermannstadt (a. B.), Hammersdorf, Mediasch, Torda, Mezőség (Gyeke, Bielz); Salzburg, Buzd (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Schässburg (in Weingärten, c. a.).

uralensis Pall. Zibinsgebirge (Bielz); Salzburg (Ormay).

decorus Brandt. (pygmaeus Reitlenb.). Präsbe, Fogarascher Gebirge, Marienburg, Hátszeg (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Kronstadt, Schässburg (c. a.).

cicatricosus Leach. Gross-Scheuern, Neu-dorf, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Karlsburg (c. a.); Rosenau (Deubel).

coriarius Brandt. Hammersdorf, Resinar (Ormay).

variegatus Donov. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Marienburg b. Kr., Mediasch, Dees (Bielz); Schässburg, Karlsburg (c. a.); Honigberg (Deubel); Klausenburg (Müller).

brevicollis Panz. Hátszeg, Gross-Scheuern, Hosszuvalu, Mediasch, Schässburg, Mezőség (Záh, Bielz); Szonyokszék b. Kr., Karlsburg (c. a.); Bodola (Deubel).

rugosus Marsh. Hátszeg, Déva, Talmatschel, Fogarasch, Hosszuvalu, Schässburg, Mezőség (Záh, Bielz); Nagylak (Unter-weissenburger Komitat, Ormay); Kronstadt (c. a.); Klausenburg (Müller).

scabriuscatus Brandt. Zood, Marienburg b. Kr., Schässburg (Bielz); Karlsburg, Hammersdorf, Orlát (c. a.); Stolzenburg, Szamosujvár (Ormay); Kronstadt (Deubel).

Lydini.**693. Cerocomia Geoffroy.**

Die Arten leben auf blühenden Pflanzen an sonnigen Bergabhängen.

Schreberi F. Gross-Scheuern (Bielz). Hátszeg (c. a.).

Schäfferi L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Fogarasch, Mediasch (Bielz).

Mühlfeldi Gyll.

var. **Kunzei** Friv. Klausenburg (Bielz).

694. Zonabris Harold.

variabilis Pallas. Gross-Scheuern (Bielz); Mezőség Gyöke, Mélhely).

floralis Pallas. Poplaka, Resinar, Reps. Mezőség (Záh, Gyöke, Bielz); Retjekatz auf einer Bergwiese im Tale des Liu mare auf blühenden Pflanzen, wenn ich mich recht erinnere, vornehmlich Seabiose, c. a.).

var. **spartii** Germ. Gross-Scheuern (Bielz, 1 Ex. aus der Fuss'schen Sammlung, c. a.).

695. Lydus F.

trimaculatus. Neudorf b. H. (Bielz); Mező-Sámsond (Mélhely).

(Halosimus.)

collaris F. Gross-Scheuern (Zakelsberg? Bielz).

chalybaeus Tausch. Mezőség Gyöke, Bielz).

Lyttini.**696. Lytta Fabr.**

vesicatoria L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

697. Zonitis Fabr.

immaculata Oliv. (mutica Scriba). Mediasch (Bielz).

698. Enzonitis Semenow.

sexmaculata Oliv. Gross-Scheuern (Bielz); Hátszeg Vurfu Urlea, Bergabhang oberhalb des Bahnhofs Váralja-Hátszeg auf blühenden Pflanzen, c. a.).

fulvipennis F. Klausenburg (Bielz).

699. Stenodera Eschscholtz.

caucasica Pall. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kronstadt, S.-Regen, Mezőség (Záh, Nagyenyed, Bielz); Hahnbach (Albrecht).

Deufel bezweifelt das Vorkommen dieser Art in Kronstadt.

700. Hapalus Fabr.

bipunctatus Germ. Mediasch, Klausenburg (Bielz).

bimaculatus L. S. Regen (Bielz), Nagyenyed, Szamosujvár (Ormay).

necydaleus Pall. Schässburg (Bielz).

Das Tier befindet sich gelegentlich nicht mehr in meiner Sammlung, weshalb auch eine nochmalige Überprüfung unmöglich ist. Da die Zeit der Bestimmung des Tieres in die ersten Jahre meiner Sammeltätigkeit fällt, ist immerhin das Vorkommen dieser Art bei uns nicht sicher gestellt.

creticus Friv. S.-Regen (Bielz).

Das Vorkommen dieser Art erscheint sehr fraglich, eher dürfte *B. spectabilis* bei uns zu finden sein.

701. Sitaris Latreille.

muralis Forst. Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schässburg (ich sammelte diese Art mehrere Male an Häusern, deren Dächer mit Schindeln gedeckt und innen mit Wespen-Nestern besetzt waren im August, c. a.); Hermannstadt (Albrecht); S.-Regen (Müller).

LXII. Rhipiphoridae.**Pelecotomini.****702. Pelecotoma Fischer.**

fennica Payk. Klausenburg, Gyalu (Bielz); Hátszeg (an einem geschälten alten Weidenstamm, c. a.); Kronstadt (Burzen, Viehweide, Deubel).

Rhipiphorini.

Die Arten leben parasitisch in den Nestern einer Erdwespe.

703. Metoeens Gerstäcker.

paradoxus L. Kronstadt, Schuler Gebirge (Bielz); Pojane (Schulerau, von einer Fichte geklopft, Deubel).

LXIII. Mordellidae.**Scaptini.****704. Scaptia Latreille.**

fuscula Müll. Holzmengen, Klausenburg (Bielz); Hermannstadt, Broos (Ormay); Baassen (im morschen Holze eines alten Nussbaumes, c. a.).

705. Tomoxia Costa.

biguttata Gyll. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Büdös (Bielz); Borszék (Fichtenstumpf), Szováta (aus einem verpilzten Rothuchen-Stumpf herausgehauen, 5. Juni, c. a.).

706. Mordella Linné.

perlata Sulz. Kronstadt (c. a.).

maculosa Naezen. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Gross-Schenk (Bielz); Frecker Gelirge (an den Wurzeln einer Fichte), Bistra, Borszék, Rotenturm (an den Schwämmen, welche an den Fichtenslämmen der Uferbefestigung wuchsen, in Mehrzahl, c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

aurofasciata Comoll. Baróth (Méhely).

bisignata Rdtb. Gross-Scheuern, Reps (Bielz); Schässburg, Rotenturm (c. a.).

fasciata F. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

acuteata L. Durch das ganze Gebiet, wie die vorige Art auf blühenden Pflanzen.

707. Conalia Mulsant.

Baudii Muls. Rotenturm (an Schwämmen der Uferbefestigung, wie Mordella maculosa, Ende Juni, c. a.).

708. Mordellistena Costa.

abdominalis F. Kronstadt, Zernest, Vargastal, Hátaszeg (Deubel); Szováta (auf Schirmplanten des Bachufers, 5. Juni, c. a.).

Das ♂, welches ich mit zahlreichen normal gefärbten Weibchen bei Szováta sammelte, ist bis auf die Dornen der Hinterschienen ganz dunkel; die Fühler sind vom vierten Gliede an der Unterseite dicht, kurz, weiß gewimpert.

a. *maculicollis* Schilsky. Szováta (c. a.).

humeralis L. Zood. Fogarasch (Bielz).

a. *axillaris* Gyll. Porumbach, Kerzer Gebirge (Bielz).

lateralis Oliv. Girelsau, Marpod, Kronstadt (Bielz).

neuwaldeggiana Panz. (brunnea F.). Gross-Scheuern, Fogarasch, Mediasch (Bielz); Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

nana Motsch. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

parvula Gyll. Hátaszeg, Neudorf b. H., Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Gyögy (Bad, Ormay); Schässburg (c. a.); Nagyhagymás, Kronstadt (Deubel).

a. *inaequalis* Muls. Klausenburg (Bielz); Schässburg (18. August, c. a.).

episternalis Muls. Dees, Szamosujvár, Gyeke (Méhely).

breviceauda Boh. Hátaszeg (Bielz); Hermannstadt, Reps (Seidlitz); Baassen, Schässburg, Alsó-Rákos, Borszék (c. a.).

micans Germ. Hátaszeg (Bielz); Hermannstadt, Salzburg, Gyögy (Bad, Ormay); Kronstadt, Hátaszeg, Schuler-Gebirge (Deubel).

pumila Gyll. Hátaszeg, Gross-Scheuern, Mediasch, Kronstadt, Hosszuvalu (Bielz);

Hermannstadt (Ormay); Schässburg Baassen, Borszék (c. a.).

stenidea Muls. Hermannstadt (Seidlitz); Borszék, Petrozsény (c. a.).

Anaspini.

709. Pentaria Mulsant.

badia Rosenh. Hátaszeg, Zibins-Gebirge (Bielz).

710. Cyrtanaspis Emery.

phalerata Germ. Kronstadt (im Flieder-gässchen und auf der Zinne geklopft, (Deubel)).

711. Anaspis Geoffroy.

frontalis L. Retjezat, Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, Előpatak, Bükszad, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Baassen, Borszék, Balánbánya, Rotenturm, Karlsburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay). a. *lateralis* F. Puj (bei Hátaszeg, c. a.). a. *verticalis* Fald. Kronstadt (Deubel).

pulicaria Costa. Hermannstadt (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

thoracica L. Retjezat, Mühlbach (roter Berg), Gross-Scheuern, Marpod, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Bistrítz (Müller).

ruficollis F. Zibinsgebirge (Bielz); Puj (b. Hátaszeg), Schässburg (c. a.); Kronstadt, Vargyas (Deubel).

Kiesenwetteri Em. Schanta (auf blühender Spirea und Astrantia, Ormay); Bistra, Retjezat, Borszék (c. a.); Kronstadt, Hátaszeg, Nagyhagymás, Zernest (Deubel). (Nassipa.)

flava L. Hátaszeg, Negovan, Grossscheuern, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, S.-Regen (Bielz); Vargyas (Almáser Höhle, Deubel); Bistrítz (Müller); Szováta (c. a.).

rufilabris Gyll. Hátaszeg, Gross-Scheuern, Marktschelken, Előpatak, Bükszad (Bielz); Schanta, Gyögy (Ormay); Retjezat, Schuler-Gebirge, Schässburg, Kronstadt (c. a.); Zernest (Deubel).

melanostoma Costa. Schulergebirge, Schässburg, Szováta (c. a.). (Spanisa.)

subtilis Hampe. Siebenbürgen.

(Larisia.)

palpalis Gerhardt. Hátaszeg, Schässburg (c. a.). (Silaria.)

brunnipes Muls. Petrozsény, Rotenturm, Schässburg (c. a.); Hátaszeg (Deubel).

varians Muls. Fogarasch, Kronstadt, Turtlau (Bielz); Hâtszeg, Schässburg (c. a.); Vargyas (Almáser Höhle, Deubel).
a. collaris Muls. Borszék, Rotenturm (c. a.).

LXIV. Melandryidae.

Tetratomini.

712. Tetratoma Fabr.

fungorum F. Zibinsgebirge, Fogarascher Gebirge, S.-Regen (Bielz); Präsbe (Ormay); Kronstadt (Zinne, Deubel).
ancora F. Präsbe, Porumbach, Surul, Kerzer Gebirge, Schässburg (Bielz), besonders auf getrockneten, verpilzten Buchenästen; Rodnagelirge, Csukás, Büdös (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Eustrophini.

713. Eustrophus Latreille.

dermestoides F. Hermannstadt, Zibinsgebirge, Fogarasch, Görgény - Gebirge (Bielz); Schässburg (am Fusse alter Eichen unter Moos, entzündet sel r leicht durch ihre purzelnden raschen Bewegungen, c. a.); Kronstadt (Deubel).

714. Hallomenus Panzer.

hinotatus Quens. Negoi (unterhalb der Schutzhütten, an Pilzen, Deubel); Bistra (an den Wurzeln eines verpilzten Fichtenstumpfes, c. a.); Nagyhagymás (von einer Fichte geklopft, Deubel).

axillaris Illig. Zibinsgebirge (Bielz); Kronstadt (Deubel).

Orchesini.

715. Orchesia Latreille.

Die Arten leben an vertrockneten und verpilzten Ästen und Baumstämmen.

micans Panz. Zibinsgebirge, Neudorf, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).

acicularis Reitter (picea Seidlitz nec Herbst). Rotenturm, Büdös, Schässburg, Oláhfalu, Rosenau b. Kr. (c. a.).

Die 7 Exemplare meiner Sammlung konnte ich mit *Orchesia micans* Panz. aus Dessau vergleichen. Sie stimmen mit den Merkmalen, welche Seidlitz F. transs. 569 von *O. picea* Herbst hervorhebt, vollkommen überein. Da *O. picea* Herbst jedoch zu *O. micans* Panz. als Synonym gebürt, habe ich zu *O. acicularis* als synonym gesetzt *O. picea* Seidl. Dagegen ist mir *O. micans* Panz. aus Siebenbürgen nicht vorgekommen.

Cloacoa.

minor Walk (sepco'a Bo-ehn) Schässburg, Büdös, Bistra, Kronstadt (c. a.); Schanta (Ormay) Bucsecs (subalpin), Nagyhagymás, Zernest (Deubel).

undulata Kr. Ritivoi b. kr., Büdös, Schässburg (c. a.); Zerest, Kronstadt, Rodnagelirge (Deubel).

fasciata Payk. Götznerberg, Anna - See (Bielz); Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge (Ormay); Schässburg (c. a.); Bucsecs (subalpin, Deubel).

blanda Brancsik. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz). Bucsecs (subalpin, Deubel); Ratosnya, Borszék (c. a.).

var. transsylvanica Reitter. Kerzer Geb. (Bielz); Rotenturm, Schanta, Gyögy (Bad, Ormay); Schässburg, Büdös (c. a.).

var. carpathica Reitter. Schulergelirge, Csukás (c. a.).

grandicollis Roseh. Kerzer Gebirge, Kronstadt (?) Bielz).

716. Abdera Stephens

(Varidae)

affinis Payk. Hermannstadt (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

flexuosa Payk. Zibinsgebirge (Bielz); Kronstadt (Deubel).

Abdera i. sp.

quadrifasciata Curt. Kroustalit (Bielz); Schässburg, Praszaka (bei Zalathna aus verpilztem Buchenholz gesiebt, c. a.); Zinne (Deubel).

717. Dircea Fabr.

australis Fairm. (1-guttata Reitenb. nec Payk.). Oláhfalu, Oláhlaposhánya (Bielz).

Seidlitz (F. transs. p. 571) hält für wahrscheinlich, dass sich die Angabe Bielz's, welcher die 1-1-guttata Payk. für Siebenbürgen anführt, auf 1-guttata Reitenb. beziehe; ihm folgend, nehme ich daher nur letztere in unser Verzeichnis auf.

718. Phloeotrya Stephens.

rufipes Gyll. Kerzer Gebirge (Bielz). **scaber** n. sp. Schässburg (Breite, 2 Ex. c. a.).

Phloeotrya scabra n. sp. Länge 9—10 mm. Dem *Ph. rufipes* ähnlich, aber grösser, mehr cylindrisch, Oberseite mit weniger dichter, feinerer und kürzerer gelblich-brauner Behaarung. Kopf bis über die Augen in den Halschild einziehbar. Stirne mässig fein und dicht, in der Mitte sparsamer punktiert, glänzend, heller oder dunkler braunlichgelb. Oberlippe im letzteren Falle heller. Augeninnenrand sehr seicht ausgerandet, am Augenunterrande eine seichte Fühlersfurche. Fühler schlanker als bei *Ph. rufipes* und etwas länger als Kopf und Halschild zusammen, bei *Ph. rufipes* etwas kürzer, das dritte Glied mehr als 1^o so lang als das zweite und so lang als das vierte, die fol-

genden etwas kürzer, aber alle fast doppelt so lang als breit, hell rötlichgelb so wie die Taster, deren messerförmiges, gerades Endglied etwa so lang ist als das zweite und dritte Glied zusammen. Halsschild dunkelbraun, fast so lang als hinten breit, die Seiten gerundet, nach hinten wenig mehr als nach vorn verengt, der Vorderrand stark gerundet vorgezogen, der Hinterrand ist gegen das Schildchen etwas vorgezogen und gegen die Hinterecken schief, aber geradlinig abgeschnitten, die Hinterecken dadurch sehr stumpfwinklig, etwas abgerundet, der Seitenrand bis in die sehr stumpfen Vordercken deutlich, die Scheibe gewölbt, vor dem Hinterrand schwach quer niedergedrückt und mit einer seichten, nach vorn abgekürzten Mittelfurche und jederseits derselben mit seichten Längsgruben, ziemlich dicht grob, rauhkörnig querunzlig punktiert, matt. Die Flügeldecken dunkelbraun, an der Basis kaum breiter als der Halsschildhinterrand, cylindrisch, mit kaum angegedeuteten Streifen, wesentlich feiner und sparsamer, querunzlig rauh punktiert, glänzender als der Halsschild. Die Unterseite bei dem einen Exemplar samt den Beinen hell rötlichgelb, bei dem andern Exemplar mehr hell bräunlichgelb.

Demnach unterscheidet sich die neue Art von Ph. rufipes durch bedeutendere Grösse, rühr zylindrische Gestalt, wesentlich gröbere und rauhere Punktierung der Oberseite, die auf den Flügeldecken merklich feiner ist als auf dem Halsschild, hellere Färbung, längere und schlankere Fühler, längeres Maxillartasterendglied usw.

Ich sammelte zwei Stück dieser Art, das eine unter Eichenrinde, das andere an einem Weissbuchenstumpf, letzteres am 12. August.

719. *Xylita Paykull.*

buprestoides Payk. (*Iaevigata* Panz.). Klauenburg (Bielz); Frecker Gebirge (Sorbota, c. a., 3 Ex.); Rodnagelbirge (Valea Vinului, Deubel); Marosgebirge (Müller).

livida Sahlb. Königstein (Juli, unterhalb Kápu-Tamás von Fichten geklopft, Deubel).

720. *Serropalpus Hellenius.*

barbatus Schall. Hermannstadt, Zibinsgeb., Kronstadt, Hosszuvalu, Marosgebirge (Bielz); Schässburg (im Zimmer eines neu gebauten Hauses, dessen Fussboden vor kurzem gelegt worden war, daher wahrscheinlich im Fichtenholz lebend, 24. Juni 1897); am Gyilkostó im Fluge gefangen, Nagybagymás und Schulergelbirge geklopft (Deubel).

Hypulini.

721. *Hypulus Paykull.*

querinus Quens. Hermannstadt, Neudorf b. H., Götzenberg, Gross-Schenk (Bielz); Schässburg (im Moos alter Eichen, wie der folgende). Alsó-Rákos (c. a.).

bifasciatus F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Gross-Schenk, Kronstadt Bielz; Resinar (Ormay); Rotenturm, Alsó-Rákos, Schässburg (c. a.); S.-Regen (Müller).

722. *Marolia Mulsant.*

variegata Bosc. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge (Bielz); Retjezat, Bucsecs, Präsbe, Paringul (von Latschen und Fichten geklopft, Deubel).

723. *Zilora Mulsant.*

sericea Sturm (Eugeniae Ganglb.). Schuler-Geb. (Ganglb., Deubel, an Schwämmen und unter der Rinde gestürzter Fichten); Zernest (Königstein 30. Mai 1891 am Kamme der Spirle, ebenfalls unter Fichtenrinde, Deubel).

Melandrylni.

724. *Melaudrya Fabr.*

Die Arten leben in verpilztem, morschem Holz, namentlich der Weissbuchen.

dubia Schall. Präsbe, Kerzer Gebirge (Bielz); Szováta (c. a.); Bodzaer Gebirge (Agárka), Rosenauer Gebirge (Götzenempel, Deubel).

caraboides L. Ilátszeg, Zibinsgeb., Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Hosszuvalu, Görgénygebirge, Dees (Bielz); Rosenauer Gebirge, Honigberg, Szurduk-Pass, Schässburg, Szováta (c. a.); Rodnagelbirge (Deubel).

barbata F. (*flavicornis* Duft., *rufibarbis* Seidl. nec Schall). Götzenberg (Bielz); Csukás (aus dem Holze einer gestürzten Rotbuche unter einem Schwamm herausgebauene, c. a.); Schässburg (einmal aus einem Weissbuchenstumpf, einmal aus Espenholz gewonnen, c. a.); Bucsecs (Valea Jeppi, Deubel).

coerulescens n. sp. Schässburg (1 Exemplar Langholtgraben unter Espenrinde, ein 2. Exemplar Mühlenthal aus einem verpilzten Weissbuchenstumpf, c. a.).

Melandria coerulescens n. sp.
Melandriæ, *barbatae* Fabr. proxima, colore prothorace medio elytrisque non sulcatis et statura angustiore sat diversa. Nigra, palpi tarisorumque articuli ultimi testacei, elytra coerulecentia. Angusta, apicem versus haud ampliata. Frons dense subtiliter punctato medio fovea rotunda instructo. Antennarum articulus 3. quarto nonnihil brevior. Prothorax convexus, basi elytris vix angustior, lateribus usque ad medium parallelus, abinde ad apicem rotundato-angustatus, nitidus, modice punctatus, medio sublaevigatus, ante basin utrinque fovea subrotunda impressus. Elytra parallela, dense punctata, striata, haud sulcata, striis basin versus apice obsoletioribus. Länge 10–11 mm.

Durch die schmale, parallele, nach hinten nicht erweiterte Körperform der Melandria barbata F. nahestehend, von ihr jedoch unterschieden durch noch schmälere Gestalt, durch schwarze Fühler, an denen höchsten die Spitze des letzten Gliedes heller ist, schwarze Beine mit rötlichgelbem dritten und vierten Tarsenglied, erst von der Mitte nach vorn verengtes Halsschild, dessen Mittellinie höchsten in der Mitte schwach glättet ist, kürzere etwas rundliche, tiefe Basalgrübchen am Halsschildhinterrand, weniger tief gestreifte bläulichschwarze Flügeldecken, deren Streifen gegen Basis und Spitze seichter werden, verschieden.

Verglichen mit *Melandria barbata* F. vom Csukás; *M. caraboides* L. von verschiedenen Fundorten und mit *M. dubia* Schall. aus Szováta. Zwei Exemplare, das eine jedoch nicht ausgewürtigt, ganz braun mit bläulichem Schimmer auf den Flügeldecken, aber auch bei diesem sind Fühler und Beine bis auf die beiden letzten Tarsenglieder dunkelbraun gefärbt und nicht hellrötlichgelb, wie bei *M. barbata* F.

725. *Pryganophillus Sahlb.*

ruficollis F. Kerzer Gebirge (Bielz).

Osphiliini.

726. *Osphyta Illiger.*

bipunctata F. (♂ clavipes Oliv.). Kronstadt (Zinne), Mediasch, Klausenburg (Bielz); Reps (c. a.).

LXV. Lagriidae.

Lagriini.

727. *Lagria Fabr.*

atrilpes Muls. Hermannstadt (Bielz); Dees, Szamosujvár (Méhely); Bistritz (Deubel).

hirta L. Durch das ganze Gebiet verbreitet, auf Gebüsch nicht selten.

Agnathini.

728. *Agnathus Germ.*

decoratus Germ. Håtszeg (Bielz).

LXVI. Alleculidae.

Alleculini.

729. *Allecula Fabr.*

morio F. Kerzer Geb., Fogarasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

(*Upinella*.)

aterrima Rosenh. Hermannstadt, Gross-Schenern, Zood, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Gross-Schenk, Kerzer Gebirge (Ormay); Schässburg (c. a.).

730. *Prionychus Solier. (Eryx)*

ater F. Salzburg, Hermannstadt, Holtau, Zood (Bielz); Schässburg (Juli, Breite, unter der Rinde eines Eichenstumpfes, c. a.); Kronstadt (Hornissenest), Honigberg (angeflohen an einem Hause), Nussbach (im Walde unter Spänen, Deubel!).

Fairmairei Reiche (laevis Seidl.). Marosgebirge (Ratosnya, Bielz).

731. *Hymenalnia Mulsant.*

rufipes F. Erzgebirge (Boholt), Kronstadt (Zinne), Nussbach, Krizba (Bielz), Puj (bei Håtszeg, c. a.).

732. *Gonodera Mulsant.*

(Pseudocistela.)

cerambooides L. Kerzer Gebirge, Fogarasch, Tömöser Pass, Preleal, S.-Regen (Bielz); Nagyenyel (c. a.).

var. *serrata* Chevr. Hosszufalu (Bielz); Előpatak, Schässburg, Borsék (c. a.); Tusnál, Büdös (Méhely); Rodnagedb., Kronstadt, Nussbach (Deubel).

(*Gonodera* i. sp.)

luperus Herbst. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

(Isomira.)

antennata Panz. Kronstadt (Bielz).

murina L. Hermannstadt, Kronstadt, Tömöser Pass, Klausenburg (Bielz); Rotenturm (c. a.); Erzgebirge Müller).

a. *evonymi* F. Kronstadt (Zinne), Honigberg (Deubel).

a. *maura* F. Rosenauer Burgberg (Méhely); Puj (bei Håtszeg), Hammersdorf (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

a. *thoracica* F. Kronstadt (Méhely); Kronstadt (Zinne, Deubel); Klausenburg (Müller).

733. *Mycetochara Berthold.*

Die Arten leben an Pilzen in altem Holz.

(Mycetophila.)

flavipes F. Håtszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Präsie, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstädter Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Paringul (subalpin, Deubel).

axillaris Payk. Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt (Bielz).

var. *morio* Redt. Zalatna, Schässburg (Breite, auf Eichenschwämmen, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

(Ernolius.)

humeralis F. (ipustulata Illig.). Håtszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Götzemberg, Zool, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schässburg, Mezőség (Záh, Bielz); Szováta (c. a.); Klausenburg (Müller).

graciliformis Reitter. Zalatna, Paringul, Retjezat (♂, ♀, c. a., vidiit Reitter).

linearis Ill. Håtszeg, Poplaka, Resinar, Götzemberg, Talmesch, Girelsau, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Karlsburg, Brassen (c. a.).

pygmaea Redt. Kronstadt (Deubel); Håtszeg (c. a.).

Omophlini.**734. Podonta Mulsant.**

nigrita F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Mezőség (Záh, Bielz); Gyergyó-Tölgyes, Nagyenyed (Ormay).

735. Cteniopus Solier.

sulphureus L. Mühlbach (r. Berg), Néppendorf, Kronstadt (Zinne), Hargitta, Schässburg, Klausenburg (Bielz); Rotenturm (c. a.); Kerzer Geb. (Ormay); S.-Regen (Müller).

a. **sulphuratus** Gmel. (bicolor F.). Kronstadt (Zinne, Méhely, Deubel).

736. Omophlus Solier.

(Odontomorphins.)

lepturoides F. Hátszeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Michelsberg, Götzenberg, Talmatschel, S.-Regen, Dees, Mezőség (Gyöke, Bielz); Alsó-Rákos, Karlsburg, Nagyenyed, Szurduk-Pass (Pilis, c. a.).

(*Omophlus* i. sp.)

rugosicollis Brull. Ober-Komana (Méhely, 11. Mai).

LXVII. Tenebrionidae.**Blaptini.****737. Blaps Fabricius.**

lethifera Marsh. (*similis* Latr.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

mortisaga L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

mucronata Latr. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz).

halophila Fisch. (*longicollis* Slev., *confusa* Men.). Kronstadt (Bielz); Karlsburg (c. a.).

Platyscelini.**738. Platyscelis Latreille.**

gages Fischer. Torda (Bielz); Klausenburg (Müller).

Pedinini.**739. Pedinus Latreille.**

temoralis L. Déva, Csib (Erzgebirge), Hammersdorf, Gross-Scheuern, Zood, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Mezőség (Záh, Bielz); Rehó b. H., Nagyenyed (Remete), Gyögy (Bad, Ormay); Pilis (Nagyenyed), Karlsburg (an trockenen

Bergabhängen unter Steinen und im Grase, c. a.).

Opatriini.**740. Melanimou Steven**

(*Microzoum* Redt.)

tibiale F. Kronstadt (Bielz).

741. Opatrum Fabricius.

sabulosum L. Durch das ganze Berg- und Hügelland, an trockenen, sandigen Orten.

742. Opatroides Brulle.

punctulatus Brull. Szombat (Bielz).

743. Licheum Blanchard.

pictum F. Hammersdorf (Bielz).

Crypticini.**744. Crypticus Latreille.**

quisquilius L. Im Berg- und Hügelland auf trockenen Grasplätzen.

Boletophagini.**745. Boletophagus Illig.**

reticulatus L. Durch das ganze Gebiet in Baumschwämmen.

interruptus Illig. Retjezat, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (Breite, Eichenschwamm, 1. Mai, c. a.).

armatus Panz. Rotenturm (Deubel).

746. Eledona Latreille.

agaricola Herbst. Hermannstadt, Reps, Kronstadt, Hosszufalu, Bükszad, S.-Regen (Bielz); Marosujvár, Schässburg (in trockenen Eichenschwämmen, c. a.); Nussbach (Deubel).

Diaperini.**747. Scaphidema Redtenb.**

metallicum F. Hátszeg, Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Alsó-Rákos, Klausenburg, Ober-Kerz (Glashütte), Rotenturm (unter Baumrinden, c. a.).

748. Diaperis Müll.

An Baumschwämmen.

boleti L. Präsbe, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Borsék, Bükszad, Mediasch, Schäss-

burg, S.-Regen, Borszék (Bielz); Balánbánya (c. a.); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay).

749. *Platydema Lap.*

violacea F. (*dytiscoides* Rossi?). Gross-Scheuern (Bielz); Kronstadt, Klausenburg, Schässburg (unter Baumrinden, Zwetschken, Maulbeerbaum), Rotenturm (c. a.); Alsó-Rákos (Deubel); Bistritz (Müller).

Dejeani Lap. Hermannstadt, Grossscheuern. Präsbe, Ober-Selcs, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bükszál, Schässburg (Bielz, unter der Rinde und an den Wurzeln alter Hollundersträucher, in morschem Eichenholz); Alsó-Rákos, Rotenturm, Szurduk-Pass (c. a.); Sächsisch-Regen (Müller).

750. *Arrhenoplita Kirby.*

(*Haplocephala* Laporte.)

haemorrhoidalis F. ent. Syst. Zibinsgeb., Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bükszál (Bielz); Rotenturm, Bistra, Alsó-Rákos (in einem alten Buchenschwamm, c. a.).

751. *Alphitophagus Stephens.*

bifasciatus Say (*l-pustulatus* Steph.). Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Karlsburg (c. a.); Bistritz (Müller).

752. *Pentaphilus Latreille.*

testaceus Hellw. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a., im Holze alter, kranker Eichen); Kronstadt (Deubel).

Ulomini.

753. *Hypophloeus Fabr.*

(*Corticeus* Crotch.)

unicolor Piller (*castaneus* F. Unter Baumrinden durch das ganze Gebiet verbreitet.)

(*Paraphloeus*.)

pini Panz. Retjezat, Borszék, Borgóer Pass (Bielz).

suturalis Payk. (*bivittatus* Reitter). Siebenbürgen,

bicolor Oliv. Hermannstadt, Grossscheuern, Hammersdorf, Nendorf b. II., Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (unter der Rinde der Eiche und der italienischen Pappel, des Maulbeerbaumes, des Ahorns, c. a.).

fasciatus F. Hátseg, Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (im Holze alter Eichen, c. a.); Neustadt, Honigberg (Deubel).

linearis F. Kronstadt, Tömöser Pass (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Baassen (c. a.).

versipellis Baudi. Schässburg (Hainbuche, Oktober, c. a.).

754. *Caenocorse Thomson.*

(*Palorus* Duval.)

depressus F. Hátseg, Zibinsgebirge, Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Baumgarten (Ormay); Baassen, Alsó-Rákos, Schässburg (im Holze alter Eichen, c. a.).

755. *Tribolium Mac Leay.*

navale F. (*ferrugineum* F.). Hermannstadt, Zood, Fogarasch, S.-Regen (Bielz).

756. *Melasia Mulsant.*

(*Uloma* Lap.)

eulinaris L. Hátseg, Talmatschel, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, Hosszuhalu, Tartlau, Schässburg, Harrigitta, Oláhfalu, Kéroly, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

Perroudi Muls. Oláhfalu, Kronstadt (c. a.); Zernest (Coltius-Chililar, Méhely).

757. *Alphitobius Stephens.*

pieceus Ol. (*diaperinus* Panz.). Zibinsgebirge, Bükszál (Bielz).

ovatus Hbst. (*diaperinus* Muls., Seidl.). Klausenburg (Bielz).

testudineus Piller (*chrysomelinus* Hbst.). Hátseg, Zibinsgebirge, Csíker Gebirge (Bielz).

Tenebrionini.

758. *Menephilus Mulsant.*

cylindricus Hbst. (*curvipes* F.). Gross-Scheuern, Hammersdorf, Talmatschel, Bükszál, Mezőség (Gye'e, Bielz); Hermannstadt (Ormay); Persáner Gebirge (Deubel).

759. *Tenebrio Linné.*

opacus Duft. Retjezat (Bielz); Schässburg (im trockenen, mehligen Holz einer alten Eiche in Mehrzahl, c. a.).

obscurus F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

molitor L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

picipes Herbst. Salzburg, Hermannstadt, Kronstadt, Mezőség (Záh, Bielz); Hátseg, Schässburg (c. a.); Brád (Ormay); S.-Regen (Müller).

760. *Bius Mulsant.*

thoracicus F. Kovászna (Juli 1893, beim Sägewerk Gyulafalva unter trockenem Fichten? oder Tannenrinde 2 Exempl., Deubel).

761. *Boros Herbst.*

Schneideri Panz. Kronstadt (in der Stadt im Fluge gefangen, Deubel).

Helopinae.762. *Laena Latreille.*

vienensis Sturm (pimelia F.). Hátszeg, Heltau, Michelsberg, Kronstadt (Bielz). **Ormayi** Reitter. Götzenberg, Kerzer Gebirge, Königstein, Kronstadt, Tömöser Pass (Bielz); Schässburg, Borszék, Ratosnya, Frecker Gebirge (Serbota), Rotenturm, Hermannstadt, Toroczkó, Szováta, Szurduk-Pass (c. a.); Baumgarten, Michelsberg, Heltau, Gyógy (Bad), Felső-Orbó (Ormay); Klausenburg (Müller).

L. Reitteri Wse. wurde nicht in das Verzeichnis aufgenommen, da Bielz die L. Ormayi Reitter nicht kannte, welche die in Ungarn vorkommende L. Reitteri zu vertreten scheint.

Hopfgarteni Weise, Kerzer Geh. (Bielz); Rotenturm (c. a.); Szurduk - Pass (Deubel).

763. *Enoplopus Solier.*

(Acanthopus Latr.)

velikensis Piller (caraboides Petag, dentipes Rossi). Hátszeg, Déva, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Sächs.-Regen (Bielz); Hátszeg (an Eichenstümpfen, c. a., Deubel); Schässburg (c. a.).

764. *Helops Fabr.*

Helops badius Redt. scheint irrtümlich in unser Verzeichnis aufgenommen worden zu sein, da Deubel erklärt, die Art nur in Herkulesbad gesammelt zu haben, nicht aber in Kronstadt. (Stenomax.)

Ianipes L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

(Nalassus.)

laevicostriatus Goeze (striatus Geoffr. Fourer, caraboides Panz.). Hátszeg, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz).

quisquilius Sturm (Fabricii Gemm. Bielz). Hátszeg, Neudorf b. II., Holzmengen, Talmatschel, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Bielz); Kronstadt (Deubel).

picipes Küst. Kronstadt (Bielz).

Auch Helops picipes Küst. ist Deubel aus Kronstadt nicht bekannt; demnach ist das Vorkommen auch dieser Art in Siebenbürgen zweifelhaft.

Phytophaga.**LXVIII. Cerambycidae.****Spondylini.**765. *Spondylis Fabr.*

buprestoides L. Heltau, Bükszán (Bielz).

Prionini.766. *Prionus Geoffroy.*

Auf Weidengebüsch.

coriarius L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

767. *Aegosoma Serville.*

scabriceorne Scop. Erzgebirge (Guraszada, Bielz).

Lepturini.768. *Rhagium Fabricius.*

sycophanta Schrnk (mordax F.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Holzmengen, Heltau, Gross-Schenk, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Bistriz, Dees, Mezőség (Záh, Bielz); Nagyenyed (an Eichen und auf Gebüschen in der Nähe alter Eichen, c. a.).

mordax Deg. Schielhal, Hermannstadt, Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Bükszán, Mediasch, Schässburg, Görgény (Bielz); Rotenturm, Bistra (Ormay); Szováta, Rodnagébirge (c. a.).

(Rhagium s. str.)

bifasciatum F. Klausenburg (Bielz).

(Hargium.)

inquisitor L. In unseren Gebirgen auf Fichten.

769. *Rhamnusium Latreille.*

bicolor Schrnk. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Klausenburg, Mezőség (Záh, Bielz); Rodnagébirge (Kiságpatak, Deubel).

770. *Xylostens Frivaldszky.*

Spinolae Friv. Präsbe, Kronstadt (Zinne, Zaison, Kirschgärten an einer alten Fichte, Scheeser, c. a.); Königstein (Propster Schlucht an den Steinwänden und auf Buchen), Görgénygeb. (Bielz); Bodzagebirge (Teszla, Deubel).

771. Oxymirus Mulsant.

cursor L. Retjezat, Zibinsgebirge, Kerzer, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Marosgebirge (Bielz); Bistra, Frecker Gebirge (Serbota), Schässburg (auf trockenem, abgestorbenen Holz, Reisig etc., c. a.).
var. *Verneuli* Muls. Rodnagebirge (Deubel).

772. Stenochorus Fabr.

(*Stenochorus* s. str.)
meridianus L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

(Anisorus.)
quercus Goetz. Gross-Pold, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Neudorf b. II., Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Tinód (Unterweissenburger Komitat, Ormay).

773. Pachyta Stephens.

tamed L. Kerzer, Fogarascher, Kroustädter Gebirge, Bükszár, Csíker Geb., Gyergyó (Bielz); Balánbánya (Deubel); Bistra (Ormay, c. a.); Marosgebirge (Müller).
quadrimaculata L. (*bishisignata* Bielz). In unseren Gebirgen verbreitet.
a. bimaculata Schönh. Bistra (c. a.); Hátzegger Gebirge, Lunka negru (Deubel).

774. Evodinus Leconte.

(*Brachyta* Fairmaire).

clathratus F. Zibins-Gebirge, Prásbe, Retjezat, Frecker Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kroustädter Gebirge, Hosszufalu (Bielz); Malomiviz, Schulergebirge (c. a.); Götzemberg, Bistra (Ormay); Ratosnya (Müller).
var. brunnipes Muls. (*nigrescens* Grell.). Prásbe, Kroustädter Gebirge (Bielz).
var. reliculata F. Kronstadt (Zinne, Deubel).

775. Aenaeops Leconte.

pratensis Laich. Zibinsgebirge (Tomnatik, Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Bistra (Ormay).
septentrionis Thoms. Gyulafalva (Papolezi hegység, Méhely); Kronstadt (Hangestein, Deubel).
(Dinoptera.)

collaris L. Durch das ganze Gebiet verbreitet, auf blühenden Pflanzen.

776. Gaurotes Leconte.

virginea L. (*nigricollis* Bielz). In unseren Gebirgen verbreitet.
excellens Brancsik. Siebenbürgen (Catalog. col. Europ. etc. 1906, p. 505).

777. Cortodera Mulsant.

femorata F. Kronstadt (Hangenstein, Deubel).
humeralis Schall. Déva (Bielz); Hátzeg Bergabhang oberhalb der Bahnstation Hátzeg-Váralja, c. a.); Vajda-Hunyad (Deubel).
a. suturalis F. Schässburg (c. a.).
holoserica F. Klausenburg (Bielz).

778. Pidonia Muls.

furida F. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
a. Ganglbaueri Ormay. Mit der Stammform.

779. Nevellia Mulsant.

sanguinosa Gyll. Malomiviz (Lunka negru, Deubel); Rodnagebirge (Scheeser.).

780. Leptura Linne.

(Anoplodera.)

rufipes Schall. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Unter-Kerz, Kronstadt, Mediasch, Mezőség (Záh, Bielz); Hermannstadt, Schässburg (c. a.).
sexguttata F. Kronstadt (Bielz); Schässburg (Fuchsloch auf Schirmblüten); Vargas (Almásér Höhle, Deubel).
a. exclamationis F. Neudorf, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

nigroflava Fuss. Zibinsgebirge (Dusch, Bielz).
(Vadon.)

unipunctata F. Fogarasch, Csíker Geb., S.-Regen (Bielz).
Ormay (Adatok Erdély bogárfaujához, 1888) bemerkt in der Fußnote p. 46, es sei im Bielz'schen Verzeichnis statt L. unipunctata F. „impunctata F.“ zu setzen, ohne jedoch seine Notiz näher zu begründen. Welche Art er mit L. impunctata F. meint, kann ich nicht enträtseln mit Hilfe der mir zu Gebote stehenden Literatur; vielleicht L. tesserula Charp var. impunctata Heyden nec F., die bei uns auch vorkommen soll?

bisignata Brull. Mediasch, S.-Regen (Bielz).
livida F. Hermannstadt, Kroustadt, Bükszár, Mediasch, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Hátzeg, Schässburg (c. a.).

var. bicarinata Arnold. Hammersdorf (Ormay).
(Leptura i. sp.)

erythroptera Hagenb. Zood, Csíker Gebirge, S.-Regen (Bielz); Nussbach (c. a.).

rufa Brull. Kerzer Gebirge (Bielz).
maculicornis Deg. Zibinsgebirge, Fogarascher Gebirge, Marosgebirge, Kronstadt (Bielz); Retjezat, Balánbánya (c. a.).

? **tesserula** Charp. Siehe die Note oben!

- rubra** L. (*testacea* L., *rubrotestacea* Ill.). In unseren Gebirgen und im Bergland verbreitet.
- scutellata** F. Zibinsgebirge, Dusch, Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bükszár, Tusnál, Schässburg, Marosgebirge, Malomváz, Rotenturm, Nussbach, Rodnagelgebirge.
- var. **ochracea** Faust. Bodzaer Gebirge (Agárka, Magura), Sósmező (Méhely und Deubel); Vargyas bei der Almascher Höhle zusammen mit der Stammform (Deubel).
- var. **ochraceipennis** Pic. Bükszár (c. a.).
- virens** L. In unseren Gebirgen verbreitet.
- sanguinolenta** L. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszuvalu, Predeal, Oláhfalu, Gyergyó, Borszék, Rodnagelgebirge (Bielz); Schanta (Ormay); Bistra, Retjezat, Balánbánya (c. a.).
- dubia** Scop. Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Tusnál, Gyergyó, Borszék, Maros-Gebirge, Rodna-Gebirge (Bielz); Schanta (Ormay); Bistra, Balánbánya (c. a.).
- a. **chamomillae** F. Retjezat (c. a.).
- (*Pachytodes*)
- cerambyciformis** Schrnk. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
- a. **transsylvania** Csiki.
- erratica** Dalm. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Mezőség (Záh), Hammersdorf, Stolzenburg (Bielz); Schässburg, Klausenburg, Toroczkó (c. a.); Kovászna (Gyulafalva, Deubel). (Judol.)
- sexmaculata** L. Kronstadt (Bielz); Bistra (Ormay, c. a., auf Schirmpfanzen); Borszék (c. a.); Nagyhagymás, Kovászna (Gyulafalva, Deubel). (Sphenalia.)
- revestita** L. Gross-Pold (Bielz); Hátseg (Bergabhang oberhalb der Station Hátseg-Váralja, c. a.); Kronstadt (Zinne, von Haselgesträuch geklopft, Deubel).
- pubescens** F. Zibinsgebirge (Bielz); Götzenberg b. Hermannstadt (Albrecht).
- nigripes** Deg. Klausenburg (Bielz).
- aurulenta** F. Zibinsgebirge, Kerzer, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Dongókő, Bükszál, Oláhfalu, Schässburg (Bielz).
- quadrifasciata** L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
- maculata** Poda. Retjezat, Zibinsgebirge, Talmatschel, Kerzer Geb., Kronstadt, Dongókő, Bükszár, Mediasch, Schässburg, Marosgebirge, Rodnagel. (Bielz); Rotenturm, Malomváz (c. a.).
- arcuata** Panz. Präsbe, Talmatschel. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bükszár, Mediasch, Oláhfalu, Marosgebirge (Bielz); Schässburg, Rodnagelgebirge (c. a.).
- aethiops** Poda. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Marosgeb.,

- Hermannstadt, Michelsberg (Bielz); Schässburg (c. a.); Vargyas (Almásér Höhle, Deubel).
- melanura** L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
- bifasciata** Müll. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
- nigra** L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
- septempunctata** F. Hátseg, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kerzer Geb., Kroustadt (Bielz); Hermannstadt, Resinar (Ormay); Rotenturm, Malomváz, Schässburg, Baassen (c. a.); Vargyas (Almásér Höhle, Deubel); Sächs.-Regen (Müller).
- a. **quinquesignata** Küst. Ilátszeg (Deubel). (*Typocerus*.)

- attenuata** L. Hermannstadt, Neudorf, Talmatschel, Leschkirch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Oláhfalu, Sächs.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Baassen, Frecker Geb. (Sérbot), Rotenturm (c. a.); Vargyas (Almásér Höhle, Deubel).

781. *Allosterna Mulsant.*

- tabacicolor** Deg. (*chrysomeloides* Schrank.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

782. *Grammoptera Serville.*

- ustulata** Schall. Heltau, Götzenberg (Bielz); Schässburg (c. a.).
- ruficornis** F. Hermannstadt, Kronstadt, Mediasch, Schässburg (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Szurduk-Pass (c. a.).
- variegata** Germ. (*femorata* Muls.). Klausenburg (Bielz); Kronstadt, Honighberg (Altfluss, Deubel).

Necydalini.

783. *Necydalis Linné.*

- major** L. Gross-Scheuern, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay, c. a., Lazareth); Salzburg (Ormay); Kovászna (an Weidenläume angeflogen), Kronstadt (aus Löchern alter Weiden, Deubel); S.-Regen (Müller).

- ulmi** Chevr. (Panzeri Harold). Karlsburg, Hermannstadt, Fogarasch (Bielz).

784. *Caenoptera Thomson.*

- minor** L. Hermannstadt, Girelsau, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Birthälm, Schässburg, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Schulergebirge, Rodnagelgebirge, Szurduk-Pass (auf Fichtenholz, frisch geschnittenen Brettern, c. a.); Sächs.-Regen (Müller).

(Linomius.)

umbellatarum Schrb. (minima Scop.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Gyöke, Bielz); Baassen, Szováta, Brszek (c. a.).

Kiesenwetteri Muls. Schässburg (c. a.); Vajda-Hunyad (Deubel, c. a., unter den Weingärten von Reisig geklopft).

Cerambycini.

785. *Stenopterus Stephens.*

flavicornis Küst. Mühlbach, Klausenburg (Bielz).

rufus L. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kronstadt, S.-Regen, Hászeg, Nussbach, Schässburg (Bielz); Szováta, Baassen (c. a.); Remete (Nagyeyued, Ormay); Zernest (Deubel).

ater L. (praeustus F.). Hermannstadt (Bielz).

786. *Dilus Serville.*

tugax Oliv. Gross-Pold, Gross-Scheuern, Götzemberg (Bielz); Schässburg (auf blühender Euphorbia cyparissiae, c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt, Rösenau, Vargyas (Almásér Höhle, Deubel).

787. *Callimus Mulsant.*

angulatus Schrank. Zibinsgebirge, Csíker Gebirge, Balánbánya (Bielz).

788. *Öhrium Curtis.*

cantharinum L. Baróth (Méhely).

brunneum F. Iléviz, Kronstadt, Klausenburg (Bielz); Retjezat, Schulengebirge (c. a.); Zernest (Crepatura, Deubel).

789. *Cerambyx Linné.*

cerdo L. (heros Scop.). Durch das ganze Gebiet in Eichenwäldern.

miles Bon. Gross-Pold, Hermannstadt (Bielz).

Scopoli Füssl. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

790. *Saphanus Serville.*

pleucus Laich. (Götzemberg, Kronstadt, Klausenburg (Bielz); Retjezat, Rotenturm (auf Rothuche, c. a.); Vargyas (Almásér Höhle, abends an den Lichtfangapparat angeflogen, Deubel)).

791. *Criocephalus Mulsant.*

rusticus L. Tatmatschel, Kronstädter Gebirge, Bükszál, Olálfalu, Marosgeb. (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Balánbánya (c. a.); Nagyhagymás, Kovászna (Gyulafalva, Deubel).

792. *Asemum Eschscholtz.*

striatum L. Hászeg, Talmatschel, Kronstadt, Marosgebirge (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay, an Kieferstämmen und deren Wurzeln).

793. *Tetropium Kirby.*

castaneum L. Bistra (c. a.).

var. **Iuridum** L. Zibinsgebirge, Gurariu, Präsbe, Sterpu, Kerzer Gebirge, Kronstädter Gebirge, Marosgebirge, Bihar-Geb. (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

var. **fulcratum** F. Zood, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bozauer Pass, Görgény, Marosgeb. (Ratosnya, Bielz); Schanta (Ormay); Borszó, Balánáya (c. a.).

var. **aulicum** F. Zibinsgebirge, Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstädter Gebirge, Marosgebirge (Bielz); Balánbánya, Parigul, Borszék, Rohnagebirge (c. a.).

fuseum F. Bistra (2 Ex., c. a.); Schulbergbirge, Königstein (Koltzu Chilior, Deubel).

794. *Auisarthron Redtenb.*

barbipes Schrank. Rotenturm (Ormay, Juli); Bistriz (Müller; Heltau an einer lebenden Buchenhecke, Albrecht).

795. *Phymatodes Mulsant.*

(Lioderes.)

Kollari Redtenb. Kronstadt (Zinne, von Bäumen geklopft, auch auf Blumen, Deubel, c. a.).

(Protocallidium.)

angustus Kriechb. Borszék (Ormay); Tusnád (Méhely); Bereczk (im Ojtoz-Tal bei der Säge auf Brettern, Deubel).

(Phymatodes Muls.)

glabratus Charp. Klausenburg (Bielz).

pusillus F. (abdominalis Bon.). Hammersdorf, Reps (Bielz).

testaceus L. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz, auf Eichenholz); Schässburg (a. c.).

a. **variabilis** L. Hászeg, Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Bistriz, Mezőség (Gyöke, Bielz); Salzburg, Nagyenyel (Ormay).

a. **similaris** Kütt. Schässburg (c. a.).

a. **praeustus** F. Kronstadt, Schässburg (c. a.).

(Poecilum.)

alni L. Hászeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Dees, Mezőség (Gyöke, Záh, Bielz); Nagyenyel (Ormay).

rufipes F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kronstadt, Sächs.-Regen, Dees, Mezőség (Gyöke, Záh, Bielz);

Reps, Klausenburg, Schässburg (Scheuerelberg, von Zwetschkenbäumen geklopft, c. a.).

796. *Pyrrhidium Fairmaire.*

sanguineum L. In Eichenwäldern durch das ganze Gebiet.

797. *Callidium Fabr.*

aeneum Deg. Zibinsgebirge (Mai, Ormay); Schulergelände, Schässburg, Klausenburg (c. a.).

violaceum L. In unseren Gebirgen und im Bergland verbreitet.

coriaceum Payk. Präsbe (Bielz); Bucsecs (c. a.); Egyeskö bei Balánbánya, Kovászna (Deubel).

Schässburg ist als Fundort dieser Art zu streichen.

798. *Semanotus Mulsant.*

undatus L. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schässburg (2 Ex. im Zimmer, wohl vom Brennholz, 1. März, c. a.); Schuler-Gebirge (an das Schutzhäus angeflogen, Deubel).

799. *Hylotrupes Serville.*

bajulus L. Hászeg, Salzburg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Frecker Geb. (Serbota), Karlsburg, Toroczkó, Abrudbánya (c. a.); Kerzer Gebirge, Gyögy (Bad), Nagyenyed (Ormay).

800. *Rhopalopnus Mulsant.*

hungaricus Herbst. Klausenburg (Bielz). **clavipes** F. Hermannstadt, Grossscheuern, Hammersdorf, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, S.-Begen, Dees, Mezőség (Gyöke, Záh, Bielz); Rotenturm (Ormay); Klausenburg, Retjezat, Schässburg (Hennerberg auf Zwetschkenholz, c. a.).

macropus Germ. Hermannstadt, Grossscheuern, Hammersdorf, Holzmengen, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Rotenturm (Ormay); Schässburg, Szurduk-Pass, Klausenburg (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

femoratus L. Heltau (Bielz); Vajda-Hunyad (Deubel).

801. *Rosalia Serville.*

alpina L. Retjezat, Schielthal, Zood, Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge, Vister Tal, Kronstadt, Tusuád, Marosgebirge, Dees, Bolkatsch (Bielz); Bemete (Nagyenyed), Szamosujvár, Baassen (Ormay); Rotenturm, Malomvitz (auf gefälltem Rothuchenholz), Schässburg (c. a.); S.-Regen (Müller).

a. **prolongata** Reitter. Siebenbürgen.
a. **transsylvania** Csiki Siebenbürgen.

802. *Aromia Serville.*

moschata L. Im Berg- und Hügelland verbreitet.

803. *Purpuricenus Fischer.*

Kaehleri L. Broos (Rumes), Grossscheuern, Hammersdorf, Neudorf b. H., Giresau, Fogarasch, Mediasch, Schässburg (auf Buche), S.-Regen (Bielz); Salzburg, Nagyenyed, Szamosujvár (Ormay); Haschag (Haschagen), Karlsburg (c. a.).

Clytini.

804. *Plagionotus Mulsant.*

detritus L. Karlsburg, Mühlbach, Zood, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Seps-Szlt.-György, Mediasch, Schässburg, Sächs.-Regen, Dees (auf Eichenholz, Bielz).

arcuatus L. Durch das ganze Gebiet in Eichenwäldern.

floralis Pall. Hermannstadt, Grossscheuern, Hammersdorf, Neudorf b. H., S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Schässburg (Juli, auf Schirmblüten, c. a.).

805. *Xylotrechus Chevrolat.*

rusticus L. Götzberg, Zood, Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen, Mezőség (Gyöke, Bielz); Resinar, Rotenturm (Ormay); Nussbach, Schässburg, Bistra (c. a.); Hászeg (Deubel).

pantherinus Saven. Siebenbürgen (Catalogus col. Eur. p. 513).

arvicola Oliv. Hászeg (Bielz); Zibinsgebirge (Ormay).

antilope Zett. Kronstädter Geb., Schuler-Gebirge (Bielz); Schässburg (auf Achillea millefolium, c. a.).

806. *Clytus Laicharting.*

tropicus Panz. Hermannstadt, Neudorf, S.-Regen (Bielz); Schässburg (von einem Schüler gesammelt, c. a.); Kronstadt (Deubel).

arietis L. Hászeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Zood, Kronstadt, Hosszufalu, Mediasch, Schässburg, Oláhfalu, S.-Regen, Dees (Bielz); Karlsburg, Rotenturm, Marosujvár (auf Blüten, c. a.).

a. **gazella** F. S.-Regen (Bielz).

lama Muls. Sehanta (7. August, Ormay); Schässburg, Rodnagebirge (c. a.); Papolcz, Keresztlény-Gebirge (Méhely); Schuler-Gebirge (Deubel).

rhamni Germ. Neudorf, Zood, Fogarasch, Kronstadt (?), Wolkendorf b. Kr., Tartlau, Tusnád, Mediasch (Bielz); Ratosnya Müller.

a. **temesiensis** Germ. Neudorf, Zood, Gross-Schenk (Bielz).

807. *Cyrtoclytus Ganglb.*

capra Germ. Schielthal, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Zood, Kerzer Gebirge, Klausenburg (Bielz); Retjezat, Nussbach (c. a.); Vargyastal (bei der Almáser Höhle, Deubel, c. a.); Csukás (Deubel); Marosgebirge (Müller).

808. *Clyanthus Thomson.*

Die Arten leben auf blühenden Pflanzen.

varius F. (verbasci L., ornatus Herbst). In Berg- und Hügelland verbreitet.

Herbsti Brahm (verbasci F.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

sarior F. (massiliensis L.). Mühlbach, Salzburg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Götzenberg, Kronstadt, Meliasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Nagyenyed, Baassen (c. a.); Kovászna (Deubel).

figuratus Scop. Håtszeg, Gross-Scheuern, Girelsau, Tahnatschel, Marpod, Gross-Schenk, Kronstadt, Meliasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Karlsburg, Baassen (c. a.); Hammersdorf (Ormay).

speciosus Schneid. Håtszeg, Karlsburg, Mühlbach, Götzenberg, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees, Mezőség (Záh, Bielz); Salzburg, Gyögy (Bad, Ormay); Puj (b. Håtszeg), Topánfalva (c. a.).

809. *Anaglyptus Mulsant.*

mysticus L. Gross-Scheuern, Michelsberg, Götzengberg, Gross-Schenk, Kronstadt, Hosszufalu, Tusnád, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Hammersdorf, Rotenturm (Bielz); Szurdok-Pass, Malomvitz, Szunyokszék (b. Kr., c. a.).

a. **hieroglyphicus** Herbst. Michelsberg, Kronstadt (Bielz); Hammersdorf, Rotenturm, Reschinar, Karlsburg (c. a.).

Lamini.

810. *Neodoreadion Ganglb.*

Die Art lebt auf kiesigem Grasboden, Hutweiden, auf Salzboden.

bilineatum Germ. Déva, Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Fogarasch, Reps, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Marosujvár, Kalán, Karlburg (c. a.); Salzburg (Albrecht).

811. *Dorcadion Dalman.*

Die Arten leben auf Grasboden, namentlich Hütweiden.

aethiops Scop. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

fulvum Scop. Mühlbach, Hammersdorf, Reps, Klausenburg, Torda, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz).

Murrayi Küst. Håtszeg, Mühlbach, Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Fogarasch, Reps, Kronstadt, Mediasch (Bogeschdorf), Schässburg, Dees (Bielz); Pilis (Nagyenyel), Kalán, Karlsburg (c. a.).

Scopolini Herbst. Mühlbach, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Girelsau, Fogarasch, Mediasch, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Marosujvár, Klausenburg, Schässburg, Kalán (c. a.); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Ilonigberg (Altfluss, Deubel).

decipiens Germ. Håtszeg (Bielz).

arenarium Scop. Hammersdorf, Örményszékes (Unterweissenburger Komitat), Nagyenyed, Fogarasch (Ormay).

Sollte hier nicht etwa eine Verwechslung vorliegen mit D. pedestre var. *gogium* Thomson, da an diesen Orten auch viele andere gesammelt haben?

equestrum Laxm. Hermannstadt, Rotenturm (Bielz).

a. **transylvanicum** Ganglb. Wohl an denselben Lokalitäten.

pedestre Poda. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

a. **austriacum** Ganglb. (molitor Redtenb.). Gross-Scheuern, Hammersdorf, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Salzburg b. Hermannstadt (Deubel); Kalán (c. a.).

var. **gogium** Thomson. Schässburg, Kalán (c. a.); Salzburg bei Hermannstadt (Deubel).

812. *Morimus Serville.*

Man findet die Arten unter Baumstämmen und Holzstücken.

funereus Muls. Håtszeg, Karlsburg, Resinar, Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch (Bielz); Schässburg (c. a.); Rotenturm (Ormay); Marosvásárhely Müller).

asper Sulz. Karlsburg (Bielz, c. a.).

813. *Lamia Fabricius.*

texlor L. Håtszeg, Mühlbach, Hermannstadt, Freck, Kronstadt, Mediasch, Oláhfalu, Görgéuy, Klausenburg (Bielz); Michelsberg, Reschinar, Mirisszó (Unterweissenburger Komitat), Tinód (Unterweissenburger Kom., Ormay); Borszék, Karlsburg (c. a.).

814. *Monachamus Curtis.*

Die Arten leben auf gestürzten Fichten, fliegen bei Sonnenschein gern an den Holzvorräten der Sägemühlen an; doch finden sie sich auch auf anderen Holzarten, z. B. Buchen.

Mulsanti Sdl. Paringul, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Bistra, Rodnagebirge, Borszék (c. a.).

sutor L. Zibinsgebirge, Dusch, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Sepsiszentgyörgy, Mediasch, Marosgeb., Borszék, Gyergyó (Bielz); Bistra (Ormay).

Die ♂♂ unseres M. sutor besitzen auf den Flügeldecken in der Regel nur sehr spärliche, kleine, weisse Haarleckchen, namentlich an den Seiten und auf der Spitze, reichlicher finden sie sich bei den ♀♀, vollständig scheinen sie nie zu fehlen. Doch besitzen beide Geschlechter einen dunkelbraunen Toment, der bei der Stammform weniger bemerkbar ist, da die Härchen zerstreut sind; bei der Varietät fuscomaculatus jedoch sind die Härchen, wie bei M. saltuarius, zu zahlreichen grösseren und kleineren Flecken (Bürstenflecken) verdichtet, im übrigen haben die Tiere ganz die Körperform, Grösse und Flügeldeckenkulptur des typischen M. sutor, können also nicht mit M. saltuarius verwechselt werden. (Vielleicht passt auf diese Varietät *Lamia sutor* Celerhj.) Bemerkenswert ist ein sonst normales Exemplar von der Bistra, welches deutlich geteilten Scutellartoment, sehr spärliche kleine Fleckchen auf den Flügeldecken und nur fein verteilten braunen Toment, aber einen ebenso deutlichen, tiefen Quereindruck im ersten Drittel der Flügeldecken besitzt wie M. Mulsanti; ich bezeichne sie als Kreuzungsform zwischen M. Mulsanti und sutor mit den wesentlichen Merkmalen des letzteren, M. sartor v. hybrida.

var. **fuscomaculatus** n. Rodna - Gebirge, Frecker Gebirge (Serbota), Bistra, Borszék (c. a.).

var. **hybrida** n. Bistra (c. a., ♂).

galloprovincialis Oliv. Gyergyó, Borszék (Bielz); Bistra (Ormay).

var. **nitidior** Abcille. Bistra (c. a.).

saltuarius Gebl. Rodnagebirge (Bielz); Zernest (Plaju foi, Deubel).

815. *Acanthoderes Serville.*

clavipes Schrank. Zibinsgebirge, Zood, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Nussbach, Schässburg, Marosgebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm, Retjezat, Rodnagebirge, Rosenau (c. a.).

816. *Acanthocinus Stephens.*

Die Arten leben auf gefälltem Holz, Reisig etc.

aedilis L. Hermannstadt, Zibinsgebirge, Tusnád, Girku, Kronstadt, Schässburg, Marosgeb., Marosujvár (Bielz); Rodnagebirge (Valea Vinului), Nagyhagymás (Deubel).

griseus F. Mediasch, Görgény, Marosgebirge (Bielz); Bistra, Borszék (c. a.); Kronstadt, Bodzaer Gebirge, Kovászna (Gyulafalva, Deubel).

817. *Liopus Serville.*

nebulosus L. Hermannstadt, Grossscheuern, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, S.-Szt.-György, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Baassen (c. a.); Hammersdorf (Ormay, auf Eichenholz und Reisig, Reisigzäunen).

818. *Hoplosia Mulsant.*

fennica Payk. Kronstadt (Zinne, Deubel, Méhely); Schässburg (c. a.); Tordaer Schlucht (Deubel).

819. *Exocentrus Mulsant.*

adspersus Muls. Fogarasch, Héviz, S.-Regen (Bielz); Malomviz, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Hátszeg (Deubel).

lusitanus L. (balteatus Gyll.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Arpascher Gebirge, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Retjezat (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Stierlini Ganglb. Unter-Kerz, Schässburg (c. a.); Hátszeg (Deubel).

820. *Pogonochaerus Gemminger.*

Die Arten leben auf gefälltem Holz, Reisig etc.

hispidulus Pill. (bidentatus Thomson). Klauenburg (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel); Szurduk-Pass, Rotenturm, Schässburg (c. a.).

Eugeniae Ganglb. Kronstadt (Deubel, auf Fichten-Scheitholz).

hispidus L. Hátszeg, Hermannstadt, Mediasch, Schässburg (Bielz); Stolzenburg, Mezőfele (Torda), Maros-Ludas (Ormay); Alsó-Rákos (c. a.); Kronstadt (Deubel).

tasciculatus Degeer. Zibinsgeb., Stirpu, Csik, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Dees (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Hermannstadt (Ormay).

ovatus Goeze. Kronstadt, Wolkendorf (Deubel).

821. *Deroplia Rosenhauer.*

(Belodera Thomson.)

Genel Arag. Hermannstadt, Michelsberg (Bielz).

822. *Haplocrenia Stephens.*

(Mesosa Serville.)

curculionoides L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Neudorf b. H., S.-Szt.-György, Mediasch, Schässburg, Bistritz, S.-Regen (Bielz); Nagyenyed, Szamosujvár (Ormay); Kronstadt, Tartlau, Präsbe (Deubel).

nebulosa F. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kerzer Geb., Gross-Schenk, Kronstadt, Hosszufalu, Meliasch, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Klausenburg (Bielz); Szunyokszék b. Kr., S. urduk-Pass (c. a.); Hátszeg (Deubel).

823. *Anaesthetis Mulsant.*

testacea F. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kronstadt, Mediasch, Sächs.-Regen, Mezőség (Gyeke, Bielz); Retjezat, Klausenburg, Szunyokszék b. Kr. (c. a.); Salzburg (Ormay).

824. *Calamobius Guerin.*

litum Rossi (gracilis Creutz). Klausenburg (Bielz).

825. *Agapanthia Serville.*

aspheodeli Latr. Hermannstadt, Hammersdorf, Fogarasch (Bielz).

Dahli Richter Gyllentali Ganglb., cardui F., S.-Regen, Mezőség (Gyeke), Klausenburg (Bielz); Bistritz (Müller); Szamosujár (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

villosovirideens Degeer (lineatocollis Dou.) Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Girelsau, Fogarasch, Mediasch, Schässburg (Bielz); Besinar, Zibinsgebirge, Szamosujár (Ormay); Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

maculicornis Gyll. Kronstadt? (Bielz); Kerzer Gebirge (Stina ursulea, Ormay).

violetacea F. (cyanæa Ilbst.). Gross-Scheuern, Gross-Schenk, Kronstadt, Mediasch, Schässburg (Bielz); Klausenburg (Müller); Miriszlo (Unterweissenburger Komitat), Mühlbach (Ormay); Torda (Deubel); Vajda Hunyad (Deubel, c. a. (Calamobiomorphus)).

leucaspis Stev. Klausenburg (Bielz); Schässburg (c. a.).

826. *Saperda Fabricius.*

(Anaerea.)

carcharias L. Nagyág, Hermannstadt, Heltau, Götzenberg, Gross-Schenk, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schässburg (auf Espen, c. a.); Szamosujár (Ormay).

(Amilia.)

simitis Laich. Gross-Schenk (Scheeser).

(Compsidia.)

populnea L. Hammersdorf, Rotherg (b. II.), Talmesch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

(Saperda i. sp.)

scalaris L. Hermannstadt, Hammersdorf, Präsbe, Gross-Schenk, Kerzer Gebirge,

Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Götzenberg, Zibinsgebirge, Rotenturm (Ormay); Schässburg, Szurduk-Pass (in Eichenholz, c. a.).

perforata Pall. Fogarasch, Schässburg, S.-Regen, Klausenburg (Bielz). (Argalia.)

8-punctata Scop. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf (Ormay).

827. *Menesia Mulsant.*

bipunctata Zoubk. Hammersdorf, Mediasch, Sächs.-Regen, Klausenburg (Bielz).

828. *Tetrops Stephens.*

praeusta L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

a. nigra Kr. Kronstadt (Zinne, Deubel); Schässburg, Szurduk-Pass, Retjezat (c. a.).

829. *Stenostola Mulsant.*

hirsutula Fröl. Déva, Klausenburg (Bielz). stadt (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Schässburg, Szurduk-Pass, Retjezat (c. a.); Klausenburg, Bistritz (Müller).

830. *Pilemia Fairmaire.*

hirsutula Fröl. Déva, Klausenburg (Bielz). **tigrina** Mulsant. Dees, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz).

831. *Phytoecia Muls.*

(Cardoria.)

scutellata F. Hermannstadt (A. B.), Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Nagyenyed (Ormay).

(Musaria.)

Argus Fröl. Kronstadt, Honigberg (Altfluss, Deubel).

rubropunctata Goeze. Mühlbach (r. B.), Hammersdorf (Bielz).

Deubel teilt mit, dass er diese Art in Kronstadt nicht gesammelt habe, der Fundort Kronstadt daher zu streichen sei.

affinis Harzer. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Girelsau Marpol, Kronstadt, Unter-Kerz, Tartlau, Mediasch, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Karlsburg, Szurduk-Pass (c. a.).

(Phytoecia i. sp.)

virgula Charp. Hátszeg, Gross-Scheuern, Meliasch, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Schässburg, Karlsburg, Előpatak (c. a.); Bistritz, Törzburg (Deubel).

pustulata Schrank. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Schässburg, Vajda-Hunyad (c. a. von niederen Pflanzen durch Kötschern erhalten); Kronstadt (Deubel).

rufimana Sebrank. Klausenburg, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Karlsburg (c. a.).

ephippium F. Ilátszeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Girelsau, Rotenturm, Marpod, Fogarasch, Klausenburg, Mezőség (Záh, Bielz); Szováta, Marienburg, Schässburg (c. a.).

geniculata Muls. Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).

cylindrica L. Mühlbach, Hermannstadt, Neppendorf, Gr.-Scheuern, Marpod, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Stolzburg (Ormay); Schässburg, Baassen, Marienburg h. Sch., Szováta (c. a.).

nigricornis F. Gross-Pold, Tartlau, Mediasch, Schässburg (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel); Borszék, Szurdukpass (c. a.).

(Opis. ia.)

coerulescens Scop. (virescens F.). Hátszeg, Rotenturm, Gross-Scheuern, Mediasch (Bielz); Borszék, Schässburg, Karlsburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Klausenburg, Bistritz (Müller).

a. **obscurus** Bris. Schässburg (Siechhofberg, 25. Mai gekötscher), c. a.).

uncinata Redtenb. Schässburg (c. a., Fuchslöch von einer Hecke geklopft).

molybdæna Dalm. Neudorf b. H. Mediasch, Schässburg, Mezőség (Záh, Bielz).

832. Oberea Mulsant.

pupillata Gyll. Klausenburg, Mezőség (Záh), Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (auf Lonicera häufig), S.-Regen (Müller).

oculata L. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Rotenturm (von einer alten Weide geklopft), Schässburg (Mühlenham von Weidenschösslingen geklopft, Dicső-Szent-Márton (c. a.)).

linearis L. Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Gross-Schenk (Bielz); Kronstadt (Ragado-Tal), Baassen, Schässburg (Postland, von Weidenschösslingen geklopft, c. a.); S.-Regen (Müller).

euphorbiae Germ. Gross-Pold, Marpol (Bielz).

erythrocephala Schrank. Hátszeg, Girelsau, Kronstadt (Bielz); Schässburg (Wolkendorfer Grund, von Euphorbia amygdaloïdes gekötschert, c. a.); S.-Regen (Müller).

LXIX. Chrysomelidae.

Eupodae.

Donaciini.

833. Donacia Fabricius.

crassipes F. S.-Regen (Bielz); Nagy-hagymás (Deubel).

semicuprea Panz. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Néulför b. H., Unter-Kerz, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Borszék (Bielz); Marosuvárv (Ormay).

dentata Hoppe. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

versicolorea Bräunl. Hermannstadt (Bielz).

Malinovskyi Ahr. Honigberg (Altfluss, Deubel).

aquatica L. Gross-Schenorn, Hahnbach, Branisch-Wald, Unter-Kerz, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

brevicornis Ahr. Hermannstadt (Bielz).

impressa Payk. Mediasch, S.-Pegen (Bielz).

marginata Hoppe (limbata Panz.). Gross-Scheuern, Branischwald, Tartlau, Mediasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

bicolora Zschach. Neppendorf, Fogarasch, Kronstadt (Bielz).

obscura Gyll. Mediasch (Bielz).

antiqua Kunze. Kronstadt (Deubel).

thalassina Germ. Gross-Scheuern, Branisch-Wald (Bielz); Klausenburg (bot. Garten, Müller).

vulgaris Zschach. Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (c. a.).

simplex F. Gross-Scheuern, Branischwald (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

cinerea Herbst. Zood, Mezőség (Gyeke, Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

834. Plateumaris Thomson.

sericea L. Hermannsfeld, Neudorf, Kronstadt, Bistritz, Mezőség (Gyeke, Bielz); Schässburg (c. a.).

discolor Panz. Kerzer Gebirge, Mezőség (Gyeke, Bielz); Klausenburg (Deubel).

braceata Scop. Klausenburg (Bielz); Szováta (c. a.); Mező-Záh (Deubel, c. a.).

consimilis Schrank. Neudorf b. H., Girelsau, Kerzer Gebirge, Unter-Kerz, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schässburg, Klausenburg, Retjezal, Balánbánya, Rónhagegebirge, Szováta (c. a.).

var. **variabilis** Kunze. Bucsecs, Bodzaer Gebirge (Méhely).

affinis Kunze. S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Honigberg (Altfluss, Deubel).

Orsodacnini.

835. Orsodacne Latreille.

Die Tiere leben auf Gesträuch.

cerasi L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Mediasch, Schässburg, Klausenburg, Zibinsgebirge (Bielz); Borszék (Bielz).

- szék**, Schulergebirge, Bistra, Retjezat (c. a.); Kronstadt (Deubel).
 a. **limbata** Ol. Schässburg, Héviz (Bielz); Kronstadt (Deubel).
 a. **glabrata** Panz. Kronstadt (Deubel).
 a. **cantharoides** F. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
 a. **Duffschmidtii** Ws. (glabrata F.). Zibinsgebirge (Ormay, auf Spiraea). Kronstadt (Deubel).
tineola Panz. (nigriceps Latr.). Hermannstadt (Ormay); Schässburg (von Schlehe geklopft, c. a.); Klausenburg (Bielz).
 a. **nigricollis** Oliv. Gross-Scheuern, Kronstadt (?) (Zinne, Bielz).
 a. **coeruleoscens** Duft. Hermannstadt, Mediasch (Bielz); Schässburg (auf Schlehe, c. a.).

836. Zeugophora Kunze.

- subspinosa** F. Girelsau, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Schässburg Kokel-ufer auf Weiden, 11. Mai, c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel).
Haviceollis Marsh. Hátszeg, Mühlbach (r. B.), Hermannstadt, Krons'alt, S.-Regen (Bielz); Borszék, Schässburg (Kokel-ufer auf Weiden und Schwarzpappel, 11. Juli, c. a.).
 a. **australis** Weise. Schässburg (Kokel-ufer auf Weiden, 11. Juli, c. a.).

Criocerini.

837. Lema Lacordaire.

- Die Arten leben auf verschiedenen Pflanzen.
puncticollis Curt. Gross-Scheuern, Nendorf b. II., Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Schässburg (Bielz); Hermannstadt, Grossau (Ormay).
Erichsoni Suffr. Hátszeg, Schielthal, Hermannstadt (Bielz); Kronstadt, Malomvitz, Puj (bei Hátszeg, c. a.).
septentrionis Weise. Hátszeg (Deubel).
cyanella L. (lichenis Voet.). Kronstadt (Bielz); Schässburg, Petrozsény, Puj (bei Hátszeg, c. a.).
 var. **abseura** Steph. Kronstadt, Zernest, Hátszeg (Deubel).
tristis Herbst (lavipes Suffr.). Hermannstadt, Neppendorf, Hosszuvalu (Bielz); Schässburg (c. a.).
melanopus L. Hátszeg, Mühlbach, Hermannst., Götzberg, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Balán-bánya, Sächs.-Regen, Bistritz, Dees, Klausenburg, Mezőség (Gyöke, Záh, Bielz); Hammersdorf, Grossau, Stolzenburg (Ormay); Baassen, Hátszeg, Rotenturm, Unter-Kerz, Karlsburg, Borszék (c. a.).
 var. **afrata** Waltl. Zernest, Rosenau (Deubel).

838. Crioceris Geoffroy.

- Lil** Scop. Hermannstadt, Fogarasch, Mediasch, Schässburg, Héviz, Kronstadt?, Tartlau, S.-Regen (Bielz).
merdigera L. Grossau, Neudorf b. II., Götzberg, Unter-Kerz, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Hermannstadt, Zibinsgebirge, Nagyenyed, Egerpatak (Háromszék), Szamosujvár (Ormay); Prászka (Zalatna), Klausenburg (auf Türkembund in Schässburg, Gärten, c. a.).
12-punctata L. Hermannstadt, Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Klausenburg (Schässburg auf Spargel, Bielz).
14-punctata Scop. Hermannstadt, Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Gyöke, Bielz); Karlslurg (c. a.).
5-punctata Scop. Hermannstadt, Leschkirch, Hosszuvalu, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Várhegy (Deubel).
asparagi L. Bistritz (Müller).

Camptosomatidae.

Clytrini.

839. Labidostomis Redtenb.

- Auf verschiedenen Pflanzen, namentlich Weiden.
tridentata L. Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Petrozsény, Hátszeg (c. a.).
humeralis Schnell. Déva, Gross-Pold, Gross-Scheuern, Mediasch, Borszék, Mezőség (Gyöke, Záh, Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Klausenburg (c. a.); Paringul (subalpin, Deubel).
lucida Germ. Schässburg (Bielz); Unter-Kerz, Karlslburg, Nagyenyed (c. a.); Gyögy (Ormay).
 var. **axillaris** Lac. Unter-Kerz (Altufer), Nagyenyed (c. a.).
longimana L. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Talmatschel, Fogarasch, Kronstadt, Nussbach, Előpatak, Bükszad, Mediasch, Schässburg, Oláhfalu, S.-Regen (Bielz); Gyögy (Ormay); Dees, Malomvitz, Ponor bei Hátszeg (c. a.).
 var. **dalmatina** Lac. Unter-Kerz (Altufer auf Weiden, c. a.).
 var. **pilicollis** Lac. Klausenburg (Bielz).
cyanicornis Germ. Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

840. Tituboea Lacordair.

- macropus** Illig. Gross-Scheuern, Klausenburg (Bielz); Schässburg (Sülabhang der Breite, 12. August gekötscert, 1 ♂ und ♀).

841. *Lachnaea Redtenb.*

sexpunctata Scop. Fogarasch, Mediasch, S.-Regen, Dees, Klausenburg (Bielz); Nagyenyed, Karlsburg (c. a.); Tinód (Unterweissenburger Komital), Szamosuvár (Ormay); Hátszeg (Deubel).

842. *Clytra Laicharting.*

quadripunctata L. Hermannstadt, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Dees (Bielz); Talmesch, Zood (Ormay).

appendicina Lac. Kronstadt, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Karlsburg, Klausenburg (c. a.).

laeviuscula Ratzburg. Durch das ganze Berg- und Flügelland verbreitet.

843. *Gynandrophthalma Lacord.*

cyanæa F. (salicina Leß.). Hátszeg, Hermannstadt, Neppendorf, Grossscheuern, Neudorf b. H., Holzmeigen, Uter-Kerz, Fogarasch, Reps, Kronstadt, Hosszafalu, Tartlau, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Borszék, Mezőség (Gyeke, Bielz); Karlsburg (c. a.).

transsylvaniaica Frivaldszky. Siebenbürgen.

flavicollis Charp. Bodzaer Geb. (Döblény, Mélhely); Retjezat, Rotenturm (c. a.).

diversipes Letze. Schulergbirge (Deubel).

aurita L. Kerzer Gebirge, Mediasch (Bielz); Schässburg, Karlsburg, Klausenburg (c. a.); Kronstadt, Bistritz (Deubel).

affinis Hellw. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt, Schässburg, Mediasch, S.-Regen (Bielz).

xanthaspis Germ. Hátszeg, Gross-Pold, Gross-Scheuern, Götzenberg, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Gyögy (Ormay); Karlsburg (c. a.).

844. *Chilotoma Redtenb.*

musciformis Goeze. Déva, Mezőség (Záh, Bielz); Schässburg (Wieteberg, Fuchsloch, auf niedern Pflanzen, c. a.); Kronstadt (Deubel).

erythrostoma Falb. Karlsburg (1 ♂, c. a.).

845. *Coptocephala Chevrolat.*

chalybaea Germ. Déva, Mühlbach (r. B.), Gross-Scheuern, Rotberg, Marpod (Bielz); Hammersdorf, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

unifasciata Scop. Hátszeg, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Bükszad, Mediasch, Schässburg, Oláhfalu, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Gyögy (Ormay); Petrozsény, Puj (bei Hátszeg, c. a.).

a. **femoralis** Kr. (nec Küster). Kronstadt (Bielz); Hátszeg (Deubel).

Scopolina L. Mühlbach (Szászcsor), Marpod, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay);

rubicunda Laich. Klausenburg (Bielz); Schässburg, Hátszeg, Oláhfalu (c. a.).

846. *Cryptocephalus Geoffroy.*

Die Arten leben auf verschiedenen Pflanzen. (Homalopus.)

Coryli L. Hátszeg, Gross-Scheuern, Thalheim, Reps, Unter-Kerz, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).

Alle vier Exemplare meiner Sammlung gehören der Varietät temesiensis an; da Bielz die Varietät gar nicht anführt und auch Deubel die Stammform nicht gesammelt hat, so will mir scheinen, als ob die letztere, falls sie bei uns zu finden sein sollte, überaus selten sei.

a. **temesiensis** Suffr. Kronstadt, Schässburg, Borszék, Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

cordiger L. Hátszeg, Hermannstadt, Fogarasch, Mediasch, Mezőség (Gyeke, Bielz); Kronstadt (Deubel).

octopunctatus Scop. Hermannstadt, Hammersdorf, Neudorf b. H., Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg, Dees (Bielz); Karlsburg, Klausenburg, Szurduk-Pass (c. a.); Kerzer Gebirge (Ormay).

sexpunctatus L. Gross-Pold, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt, Nussbach, Tartlau, Mediasch (Bielz); Nagyenyed (Ormay); Schässburg (c. a.).

signatus Laich. (5-punctatus Seidl.). Talmesch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg (Bielz); Schanta (Ormay).

distinguendus Schneid. Hátszeg (Bielz). **albolineatus** Suffr. Fogarasch (Bielz).

Das Vorkommen dieser seltenen, den Alpen eigentümlichen Art wäre näher zu prüfen.

laevicollis Gebl. Alsó-Rákos (1 Ex, c. a.). **a. viennensis** Ws. Vajda-Hunyad (c. a.).

imperialis Laich. Gross-Pold (Bielz).

bipunctatus L. Mühlbach, Hermannstadt, Rotenturm, Marpod, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Nussbach, Bükszad, Mediasch, Schässburg S.-Regen, Borszék, Dees, Mezőség (Záh, Bielz); Előpatak, Hátszeg, Petrozsény, Puj b. Hátszeg (c. a.).

a. **sanguinolentus** Scop. (lineola F.). Fogarasch, Kronstadt, Balánbánya (Öcsém), Gyergyó (Bielz); Petrozsény, Karlsburg, Előpatak (c. a.).

biguttatus Scop. Zibinsgebirge, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Girelau, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Mediasch, Schässburg, Mezőség (Gyeke, Bielz); Hermannstadt (Ormay); Nagyenyed, Baassen (c. a.).

14-maculatus Schneid. (coloratus Suffr.). Klausenburg (Bielz).

gamma II. Schäff. Bonez-Nyires (sós-völgy, Mélhely); Torda (9. Juni. Deubel).

apicalis Gebl. Dobra (Bielz).

(Proctophysus.)

Schäfferi Schrank. Déva, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Mediasch, Dees (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Schässburg, Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

cyanipes Suffr. Keresztenyavas (Mélhely).

villosulus Suffr. Mühlbach (Rekite), Gross-Pold, Fogarasch (Bielz); Kronstadt (Deubel).

aureolus Suffr. Gross-Scheuern, Neudorf b. II., Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bükszár (Bielz); Schässburg, Oláhfalu, Klausenburg, Rodnagelbirge (c. a.).
a. **coeruleolus** Schilsky. Zinne, Tömö-scher Pass (Vladez, Mélhely).

sericeus L. Hátaszeg, Schiellhal, Hermannstadt, Neudorf, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Bükszár, Schässburg, Oláhfalu, S.-Regen, Borszék (Bielz); Zibinsgebirge, Bistra, Gyógy (Bad, Ormay); Nagyenyed, Klausenburg, Rodnagelbirge (c. a.).

a. **coeruleus** Weise. Előpatak, Nagyenyed, Klausenburg (c. a.); Hátaszeg, Rosenau (Deubel).

eristula Duft. (hypochoeridis Suffr.). Mühlbach (Szászcsor), Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Borszék, Dees, Mezőség (Zál, Bielz); Bistra, Gyógy (Bad, Ormay); Malomvitz, Előpatak, Bükszár, Rodna-Gebirge, Nussbach, Oláhfalu, Klausenburg (c. a.).

a. **frigidum** Jacobs. (cyanescens Wse.). Kronstadt (Stehil, Mélhely).

violaceus Laich. Hátaszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. II., Götztenberg, Girelsau, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Mediasch, S.-Regen, Mezőség (Gyéke, Bielz); Hammersdorf, Salzburg, Stolzenburg (Ormay); Nussbach, Schässburg, Balánbánya, Baassen, Klausenburg, Nagyenyel, Karlsburg, Borszék (c. a.).

a. **smaragdinus** Suffr. Előpatak (c. a.).

virens Suffr. Hátaszeg, Zál (Bielz).

elongatus Germ. Déva (Bielz); Schässburg (c. a.).

nilidulus F. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Klausenburg, Borszék, Schässburg (c. a.).

nitidus L. Gross-Scheuern, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hátaszeg, Salzburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

parvulus Müll. Neudorf b. H., S.-Regen (Bielz); Kerzer Geb. (Ormay); Schässburg (c. a.).

concininus Suffr. Siebenbürgen (wohl Hátaszeg-Tal).

Siedlitz (F. transs. 1891, p. 763) führt diese Art für Siebenbürgen an ohne eine nähere Fundortangabe zu machen, während er das Vorkommen des C. marginatus nicht als vollkommen sichergestellt betrachtet.

marginatus F. Talmesch, Talmatschel, Rotenturm (Bielz).

frenatus Laich. Kerzer Gebirge, Fogarasch, Fogarascher Gebirge, Nussbach, Mediasch, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (c. a.).

a. **flavescens** Schnei. Gross-Pold, Hermannstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Unter-Kerz (c. a.); Hátaszeg (Deubel).

Moraei L. Durch das ganze Gebiet verbreitet (auch im Rodnagelbirge c. a.).

a. **bivittatus** Gyll. Puj (b. Hátaszeg), Schässburg, Unter-Kerz (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

a. **arquatus** Ws. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

octacostus Bedel (6-pustulatus Rossi, Weise nec Villers). Hátaszeg, Mühlbach, Gross-Scheuern, Girelsau, Marpod, Fogarasch, Reps, Kronstadt, Tömöser Pass, Nussbach, Mediasch, Dees, Mezőség (Gyéke, Bielz); Brassen, Schässburg, Karlsburg, Nagyenyel, Hermannstadt (c. a.).

4-guttatus Richter. Dobra, Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Röberg b. II., Girelsau, Marpod, Fogarasch, Héviz, Tarltau, Előpatak, Mediasch (Bielz); Schässburg, Borszék (c. a.); Kronstadt, Zernest (Deubel).

4-pustulatus Gyll. Rodnagelbirge (Koronjás, c. a.).

a. **rhacticus** Heyd. Kronstadt, Retjezat (c. a.).

var. c. Weise. Retjezat (c. a.).

flavipes F. Hátaszeg, Hermannstadt, Holzmenge, Marpod, Girelsau, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Nussbach, Tarltau, Előpatak, Mezőség (Gyéke, Zál, Bielz); Gyógy (Bad, Ormay); Karlsburg, Schässburg, Klausenburg (c. a.).

a. **nigrescens** Grall. Retjezat, Előpatak, Schässburg (c. a.).

vittatus F. Hátaszeg, Talmesch, Porcess, Fogarasch, Előpatak, Bükszár, Oláhfalu (Bielz); Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Ormay); Petrozsény, Malomvitz, Retjezat (Zenoga), Puj (b. Hátaszeg), Rotenturm, Kronstadt, Brassó, Ratosnya, Schässburg (c. a.).

bilineatus L. Hátaszeg, Mühlbach (Szászcsor), Gross-Scheuern, Márpol, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Gyógy (Bad, Ormay);

- Rotenturm**, Puj (b. Hâtszeg, c. a.); Kronstadt (Deubel).
a. moestus Ws. Rotenturm, Baassen (c. a.).
a. armeniacus Fald. Hâtszeg, Puj (bei Hâtszeg), Schässburg, Retjezat (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).
elegantulus Grav. Dobra, Gross-Scheuern (Bielz); Déva, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
strigosus Germ. Schässburg (Wieteberg, 1 ♂, Juli, c. a.).
chrysopodus Gmel. Hâtszeg, Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Rothenberg b. H., Holzmengen, Girelsau, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Resinar, Rotenturm (Ormay); Schässburg, Nagyenyed, Klausenburg, Vajda-Hunyad (c. a.).
frontalis Marsh. Hermannstadt (Bielz); Hâtszeg, Rodnagebirge (Koronj), c. a.). Kronstadt (Deubel).
ocellatus Drap. Hâtszeg, Hermannstadt, Girelsau, Porcsest, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Nussbach, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Resinar, Rotenturm (Ormay); Malomvitz, Hammersdorf (c. a.).
carpathicus Friv. Hammarsdorf, Balánbánya (c. a.); Schulergieberge (Deubel).
labiatus L. Gross-Scheuern, Marpol, Fogarasch (Bielz); Előpatak, Schässburg, Karlsburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Nagyhagymás, Kronstadt, Schulergieberge (Deubel).
a. diagrammus Suffr. Előpatak, Büdös, (Bielz); Schässburg, Karlsburg, Baassen (c. a.); Vargyas (Deubel).
pygmaeus F. Michelsberg, Talmesch (Bielz); Gyögy (Bad, Ormay).
 Wahrscheinlich sind auch die Fundorte von Bielz und Ormay für die Stammform, welche nach Weise dem südlichen Europa angehören soll, auf die beiden Varietäten zu beziehen.
a. amoenus Drap. (vitula Suffr.). Schiellthal (Bielz); Petrozsény, Rotenturm, Schässburg (c. a.); Hâtszeg (Deubel).
a. orientalis Weise. Schässburg (c. a.).
connexus Oliv. Hâtszeg, Talmesch, Girelsau, Freck, Klausenburg (Bielz); Gyögy (Ormay); Petrozsény, Schässburg (c. a.).
 var. **fasciatus** n. Petrozsény (c. a.).
Cryptocephalus connexus var. *fasciatus*. Der schwarze Nahtfleck hinter der Mitte der Flügeldecken verbindet sich nicht nur mit der schwarzen Längsbinde, sondern auch mit dem schwarzen Seitenrande, so dass von der gelben Färbung der Flügeldecken nur 6 gelbe isolierte Makeln übrig bleiben, je eine längliche neben der vorderen Nahthälfte und über den Epigleuren und je eine quere vor der Spitze. Der gelbe Halsrand ist ziemlich schmal, aber nicht scharf begrenzt, die Stirne trüb rötlichgelb mit der wenig scharfen Zeichnung der Männchen.
fulvus Goeze (minutus F.). Grossscheuern, Michelsberg, Talmatsch, Tartlau (Bielz); Ratosnya, Frecker Gebirge (Leitatal bei der Sägemühle), Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Zinne), Törzburg (Deubel).

- populi** Suffr. Fogarasch (Bielz); Karlsburg, Schässburg (Kokel, 26. Juli auf Schwarzpappel, c. a.).
pusillus F. Neudorf b. H., Unter-Kerz, S.-Regen (Bielz).
a. Marshami Weise. Schässburg (Breite, Juli), Toroczkó (c. a.).
rufipes Goeze. Hâtszeg, Hosszufalu, Tartlau (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

847. *Pachybrachys Redtenbaeher.*

Die Arten leben auf Gesträuch, besonders Weiden. (Pachystylus.)

- hieroglyphicus** Laich. Hâtszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Holzmengen, Girelsau, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Bielz); Karlsburg, Ratosnya (c. a.).
a. ictericus Wse. Schässburg, Ujszéke (b. Keresztur, c. a.).
a. tristis Laich. Vargyas (Almáser Höhle, Deubel); Borszék (c. a.).
carpathicus Rey. Schässburg, Ratosnya (c. a.).

Ich beziehe auf *P. carpathicus* Rey, dessen Beschreibung mir unbekannt ist, dem *P. hieroglyphicus* Laich, sehr ähnliche Tiere mit ganz schwarzem Pygidium.

- haliciensis** Mill. (sinuatus Seidl. nec Muls.). Hâtszeg, Petrozsény, Karlsburg, Kronstadt, Baassen, Schässburg, Nagyenyel, Ratosnya, Rölnagelbirge (c. a.); Vidombák, Tömös, Prázsmár (Méhely).
a. rufimana Wse. Hâtszeg, Karlsburg (c. a.).

- hypophaeus** Suffr. Fogarasch, Kronstadt (?) (Bielz).

- tesselatus** Oliv. Hâtszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Sächs.-Regen, Dees (Bielz); Hermannstadt, Salzburg (Ormay); Rotenturm, Schässburg, Baassen, Klausenburg (c. a.).
picus Weise (histrio Redtenb.). Siebenbürgen.

Seidlitz (F. transs. 1896, p. 767) führt diese Art für Siebenbürgen ohne nähere Fundortsangabe an.

- timbriolatus** Suffr. Hâtszeg, Gross-Scheuern, Girelsau, Marpol, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Stölzeneburg (Ormay); Hammersdorf, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
a. pteromelas Mars. Hammersdorf, Schässburg (c. a.).

Cyclica.

Lamprosomini.

848. *Lamprosoma Kirby.*

- concolor** Sturm. Kerzer Gebirge, Héviz, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Gyögy

(Ormay); Rotenturm, Hermannstadt (c. a.).

Eumolpini.

849 *Pachnephorus Redtenb.*

Die Arten leben am Ufer stehender und fließender Gewässer.

pilosus Rossi. Fogarasch, Nussbach, Schässburg (Bielz); Gyögy (Ormay); Marosujvár, Oláhsfalu, Kronstadt (c. a.); *tesselatus* Duft. Håtszeg, Hermannstadt, Fogarasch, Schässburg (Bielz).

a. *sabulosus* Gebl. Håtszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Porumbák, Reps, Mediasch, S.-Regen (Bielz).

villosus Duft (nec Redt. nec Fairm.). Schässburg, Hermannstadt (c. a.); Várhegy (Deubel).

850. *Bromius Redtenb.*

(Adoxus Baly.)

obscurus L. Nagyág, Fogarasch, Kronstadt, Sächs.-Regen, Gyergyó, Borgóer Pass (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Zibinsgebirge (Ormay); Schässburg (c. a.).

a. *vilosulus* Schrk. (vitis auct.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Szováta (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Sämtliche Tiere meiner Sammlung besitzen bei hellrötlichbraunen Flügeldecken ganz schwarze Beine.

851. *Chrysochus Redtenb.*

aselepiadeus Pall. (pretiosus F.). Retjezat, Mühlbach, Gross-Scheuern, Marpod, Gross Schenk, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen, Dees, Gyalu, Mező-ég (Zäh), Hasság, Schässburg (Wielberg (c. a.); Toroczkó, Zool (Ormay)).

852. *Eupales Leferve.*

ulema Gerin. Gross-Pold (Bielz); Vajda-Hunyad (c. a., Deubel).

Chrysomelini.

853. *Colaphus Redtenb.*

sophiae Schall. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

854. *Gastroidea Hope.*

viridula Dey. In unseren Gebirgen und im Bergland verbreitet.

polygoni L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

855. *Entomoscelis Chevr.*

adonis Pall. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Giresau, Fogarasch, Persaner Gebirge (Oberkomana). Kronstadt, Tartlau, Schässburg, Mezség (Gyeke, Zäh, Bielz); Klausenburg, Nagyenyel (c. a.); Buzd, Mirisló (Unterweissenburger Komitat). Toroczkó (Ormay).

sacra L. Fogarasch, Mediasch, Klausenburg, Mezség (Nagyenyel, Gyeke, Zäh, Czege, Bielz).

856. *Timarcha Latreille.*

T. *tenebricosa* F., welche von Bielz für Schässburg und Kronstadt angeführt wird, ist wohl aus unserem Verzeichniß zu streichen. In Schässburg ist sie von mir nie gesammelt worden, sondern nur *coraria* Laich., ebenso wenig hat Deubel das wegen seiner bedeutenden Grösse kaum zu übersehende Tier in Kronstadt aufgefunden.

pratensis Duft. Håtszeg, Schielthal, Stolzenburg, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Götzemberg, Rotenturm, Riu Sat, Remete (Nagyenyel), Szamosujvár (Ormay).

coraria Laich. (violaceonigra auct.). Hermannstadt, Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees, Mezség (Zäh, Bielz); Rakovica, Szamosujvár (Ormay).

rugulosa II. Schäff. Surul, Frecker Geb., Fogarascher Geb., Kronstadt, Schulergebirge Tömöser Pass, Tesla, Dongókő, Bozauer Pass (Bielz); Pilis (b. Nagyenyel), Schässburg, Rotenturm, Előpatak, Petrozsény, Håtszeg, Karlburg (c. a.).

var. *Lomnickii* Mill. Porumbach, Surul, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Hermannstadt, Baassen, Schässburg, Tordae Schlucht (c. a.).

metallica Laich. Retjezat, Zilinsgebirge, Präsbe, Gross-Scheuern, Kerzer Geb., Fogarascher Geb., Kronstadt, Schulergebirge, Piatra mare, Tesla, Dongókő, Bozauer Pass (Bielz); Götzemberg (Ormay); Balánbánya, Schässburg, Nagyenyel (c. a.).

gibba Hoppe. Kerzer Gebirge (Bielz).

T. *gibba* Hoppe, welche auch von Bielz nur vom Kerzer Gebirge angeführt wird, ist seither nicht mehr gesammelt werden; ihr Verkommen erscheint daher fraglich.

857. *Timarchida Ganglbauer.*

Deubeli Ganglb. Schulergebirge (Deubel, c. a.).

858. *Chrysomela Limné.*

timbrialis Küst. Håtszeg (Bielz).

var. *hungarica* Fuss. Mühlbach, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bucsecs, Tesla,

Csukás, Birthálm, Dees (Bielz); Hermannstadt, Grossau, Órményszékes (Unterweissenburger Komitat), Nagyenyed, Magyar-Forró (Unterweissenburger Komitat), Felső-Orhó (Unterwissenburger Komita), Szamosujvár (Ormay); Schässburg, Előpatak, Marosujvár, Szovátá (c. a.); Schulergebirge (Deubel). *eribrosa* Ahr. Mezőség (Gyeke, Bielz). *Weisei* Friv. Balánbánya (c. a.); Hâtszeg (Deubel). *coerulea* Oliv. Durch das ganze Gebiet verbreitet. var. *globipennis* Suffr. Präsbe, Előpatak, (Bielz); Kerzer Geb., (Ormay); Rodnagelirge (c. a.); Pietrosul, Nagyhagymás (Deubel). *lichenis* Richt. Fogarascher Geb., Bucsecs (Bielz); Schulergebirge (Deubel). a. *nigerrima* Weise. Fogarascher Geb., Kronstädter Gebirge (Bielz); Bucsecs (alpin, Deubel). var. *rhipaea* Wse. Rodnagebirge (c. a.); Bucsecs (Deubel). *carpathica* Fuss. Surul, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge (Bielz); Nagyhagymás, Bucsecs, Rodnagelirge (Deubel). var. *Hopfgarteni* Wse. Siebenbürgen. *rufa* Duft. (opulenta Suffr., menthae Duft.). Erzgelirge, Nagyág, Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Vistertal, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Dees (Bielz); Talmesch, Retjezal, Bistra, Rotenturm, Rodnagelirge (c. a.). *marcasistica* Germ. Retjezal, Zibinsgebirge, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Schulergebirge, Bucsecs, Oláhfalu, Borgöör Pass (Bielz); Porkovitzá (Zoodgebirge, Ormay); Bistra, Schässburg, Nagyenyed, Rotenturm, Rodnagelirge (c. a.); Kronstadt (Deubel). var. *turgida* Ws. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Nagyenyed, Schuler-Gebirge, Schässburg, Bucsecs, Borszék, Retjezal (c. a.). a. *pannonica* Ws. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Rodnagelirge (Deubel). *purpurascens* Germ. Bistra, Nagyenyed, Topánfalva (Erzgebirge). Alsó-Rákos (c. a.); Rodnagelirge, Nagyhagymás, Piatra mare (Tamina-Schlucht, Deubel). *erassimargo* Germ. Zibinsgebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz). a. *viridis* Ws. Siebenbürgen. *hemisphaerica* Germ. Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Rotenturm, Porkovitzá (Zoodgebirge, Ormay); Rodnagelirge (c. a.); Zernester Gebirge (Deubel). *crassicollis* Suffr. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Bistra (Ormay); Borszék, Ober-Kerz (Glas-

hütte), Zibinsklamm, Előpatak, Schässburg, Retjezal, Nagyenyed (c. a.). *olivacea* Suffr. Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Vistertal, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge, Rodnagelirge (Bielz); Schanta (Ormay); Klausenburg (c. a.); Marosgebirge (Müller). a. *umbritis* Wse. Rodnagelirge, Kronstadt (Deubel). *globosa* Panz. Zibins-Gebirge (Bielz); Schanta (Ormay). *vernalis* Brull. Fogarascher Geb., Kronstadt (Bielz). var. *Heeri* H. Schaeff. Hâtszeg, Fogarascher Gebirge (Bielz). *haemoptera* L. Hâtszeg, Petrozsény, Hunyad, Hermannstadt, Neppendorf, Gross-Scheuern, Holzmengen, Talmesch, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Oláhfalu, Dees (Bielz); Rotenturm, Salzburg, Zibins-Gebirge, Talmesch, Szamosujvár (Ormay); Puj (b. Hâtszeg, c. a.). var. *unicolor* Suffr. Kronstadt (Zinne, Deubel). *goettingensis* L. Durch das ganze Gebiet verbreitet. a. *Sturmi* Westhf. Fogarascher Gebirge, Kronstädter (?) Gebirge (Bielz). a. *polonica* Wse. Kerzer Gebirge (Bielz). *limbata* F. Salzburg, Hermannstadt, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf, Ober-Kerz, Mihályfalva (Grosskokler Komitat), Nagyenyed, Miriszlo (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Puj (b. Hâtszeg, c. a.). *lurida* L. Hâtszeg, Salzburg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf, Remete (Ormay); Alsó-Rákos (c. a.); Kronstadt (Deubel). *staphylaea* L. Hâtszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Unter-Kerz, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg, Oláhfalu, S.-Regen, Borszék, Bistritz, Dees, Mezőség (Záh, Bielz); Rotenturm, Tordaeer Schlucht (c. a.). *gypsophilae* Küst. Déva, Neudorf b. It. (Bielz); Schässburg, Nagyenyed (c. a.); Kronstadt (Deubel). *sanguinolenta* L. Hâtszeg, Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Orlat, Poplaka, Ober-Kerz (Ormay). *marginalis* Duft. Hâtszeg, Mezőség (Záh, Bielz). *carnifex* F. Hermannstadt, Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay). *marginata* L. Hâtszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Holzmengen, Márpod, Fogarasch, Kronstadt, Hosszuvalu, Nussbach, Mediasch, Schässburg, Oláhfalu, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Bielz); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

- orichalcea* Müll. (*bulgarensis* Schrnk.). Schässburg (c. a.); Bistritz (Müller).
 a. *lamina* F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Holzmengen, Sächs.-Liegen (Bielz).
morio Kryn. Neudorf b. H. (Bielz); Håtszeg (c. a.).
chaleites Germ. Alsó-Rákos (c. a., 4 Ex.).
geminata Payk. Gross-Scheuern, Maros-geligo (Bielz); Schanta, Bistra (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deutel).
 a. *cuprina* Duft. Klausenburg (Bielz); Kronstadt, Vidombák, Keresztenyhavas (Méhely); Schässburg, Retjezat (c. a.).
quadrigemina Sulfr. Kronstadt, Rosenau (Deubel).
hyperici Forst. (*gemellata* Geofr.). Håtszeg, Gross-Pold, Kerzer Gelirge, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Schanta (Ormay).
americana L. Klausenburg, Kronstadt (Bielz).
cerealis L. Salzburg, Gross-Scheuern, Zood, Fogarasch, Kronstadt (?), Mediasch (Bielz); Håtszeg, Pilis (b. Nagyenyed), Klausenburg (c. a.)
 a. *alternans* Panz (Megerlei F.). Hunyad, Salzburg, Hammersdorf, Zood, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay).
 a. *ornata* Alr. Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Håtszeg (Deubel).
 a. *mixta* Küst. (*violacea* Schall.). Fogarasch, Marosgebirge (Bielz); Talmesch, Rotenturm, Toroezkó, Remete (Nagyenyed, Ormay).
aurichalcea Mannb.
 var. *asclepiadis* Villa. Tordaer Schlucht (c. a.); Kronstadt, Schulergelirge, Håtszeg (Deubel).
coeruleans Scriba (*violacea* Panz.). Déva, Gross-Scheuern, Kronstadt, Mediasch, (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Pilis (b. Nagyenyed), Klausenburg (c. a.).
fastuosa Scop. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
 a. *speciosa* L. (*galeopsisidis* Schrk.). Kronstadt, Bodna-Gelirge, Schuler-Geb. (Deubel).
graminis L. Mediasch, Mezőség (Záh, Bielz); Hermannstadt (Ormay).
menthastris Sulfr. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
 a. *rugicollis* Weidb. Fogarasch, Kronstadt (Bielz).
varians Schaller. Håtszeg, Retjezat, Kerzer Gelirge, Fogarasch, Kronstadt, Hosszafalu, Tarltau, Mediasch, Schässburg (Bielz); Bodna-Gelirge, Ilamika (Naszól), Előpatak (c. a.).
 a. *centaura* Herbst (*centaurei* F.). Fogarasch, Kronstadt (Bielz).
 a. *pratinensis* Wse. Fogarasch, Kronstadt (Bielz).
 a. *aethiops* F. Rodnagebirge (Deubel).

- politá* L. Håtszeg, Schielthal, Unter-Kerz, Kerzer Gelirge, Szombat, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Retjezat (c. a.).

859. *Chrysanthia Hope.* (Orina Motsch.)

(Allorina.)

- tristis* Fabr. (*fluctuosa* Oliv.). Zibinsgeb., Galbina, Kerzer Gelirge, Kronstadt, Rodnagelirge (Bielz); Baassen, Schässburg, Malomvitz, Retjezat (c. a.); Schulergelirge (Deubel).

- rugulosa* Suffr. Retjezat, Zibinsgebirge, Galbina, Rodnagel. (Kuhhorn, Bielz); Götzenberg (Ormay); Iléviz, Baassen, Schässburg, Rodnagelirge (c. a.)

(Romalorina.)

- intricata* Germ. Kronstädter Geb., Schulergelirge, Iléviz, Schässburg, Borszék, Borgoer Pass (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rodnagebirge, Malomvitz (c. a.).

- var. *Anderschi* Duft. Retjezat, Zibinsgebirge, Resinar, Götzenberg, Surul, Kerzer Gelirge, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Margitta, Oláhfalu, Borgoer Pass, Rodnagelirge (Kuhhorn, Bielz); Bistra, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schulergelirge (c. a.).

- alpestris* Schumm. Kerzer Gelirge (Ormay); Schulergelirge, Borszék (c. a.); Nagyhagymás, Paringulgebirge (Deubel).

- a. *rivularis* Ws. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gelirge (Bielz); Schulergelirge (Deubel).

- a. *fontinalis* Ws. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gelirge (Bielz); Håtszeg (Deubel).

- a. *bicolora* Ws. Fogarasch, Kronstädter Gebirge (Bielz); Schulergeb. (Deubel).

- var. *punctatissima* Suffr. Surul (Bielz); Schässburg (c. a.); Håtszeg (Deubel).

- a. *anthrisci* Ws. Schulergelirge, Vargyas (Almásér Höhle, Deubel).

- a. *Bodemeyeri* Kr. Schulergeb. (Deubel).

- var. *polymorpha* Kr. Kronstädter Geb. (?), Bozauer Pass, Bihargebirge (Piatra arse, Bielz); Rodnagelirge (c. a.).

- var. *nigrina* Suffr. Håtszeg (Deubel).

- gloriosa* F. Fogarascher Gebirge (Bielz).
 a. *pretiosa* Suffr. Rodnagelirge (Kuhhorn, Bielz).

- a. *venusta* Suffr. Zibinsgebirge, Galbina, Kerzer Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz).

- variabilis* Wse. Fogarascher Geb., Kronstädter Gebirge (Bielz); Schulergelirge (c. a.).

- villigera* Suffr. Zibinsgebirge, Galbina, Rodnagelirge (Kuhhorn, Bielz).

bifrons F. (*monticola* Duft.). Bihargebirge (Bielz); Bucsecs (alpin, Deubel).

var. **decora** Richt. Arpascher Gebirge (Ormay); Rodnagebirge (Deubel).

viridis Duft. Zibinsgebirge, Dusch, Zibinsjäser, Kronstädter Gebirge (Bielz); Retjezat (c. a.).

var. **Merkli** Wse. Kronstadt (Deubel).

a. **transsylvania** Wse. Paringul, Rodnagebirge (c. a.); Hátszeger Gebirge (Deubel).

(Protorina.)

plagiata Suffr. Retjezat, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Schulergebirge, Bucsecs, Gyergyó, Marosgeb., Rodnagebirge (Koronjis), Borgoer Pass (Bielz); Schanta (Ormay).

var. **commutata** Suffr. Kronstädter Geb., Csíker Gebirge, Balánhánya (Öcsén, Nagyhagymás, Bielz); Rodnagebirge, Topánfalva (Erzgebirge, c. a.).

Jedenfalls bezieht sich Bielz's Ch. melanocephala Duft. (Peeroleri Bassi, *commutata* Suffr.) auf var. *commutata* Suffr. mit einfarbig roten Flügeldecken, während melanocephala Duft. aus unserem Verzeichnis zu streichen ist.

(Chrysocloea i. sp.)

virgulata Germ. Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Zeidner Berg, Héviz, Borgoer Pass (Bielz); Schanta, Bisztra (Ormay); Schulergebirge, Retjezat (c. a.). a. **serena** Ws. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Retjezat (c. a.).

a. **candens** Ws. Tesla, Keresztenyavas (Méhely); Kerzer Gebirge, Zoodgeb. (Ormay); Schulergebirge (Deubel).

a. **praefica** Ws. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Schulergebirge, Zernester Gebirge (Deubel).

cacalia Schrauk. Zibinsgebirge, Galbina, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Hargitta, Oláhfalu, Borszék, Borgoer Pass (Bielz); Rodnagebirge, Schulergebirge (c. a.).

a. **sumptuosa** Redt. (*tristis* Duft.). Retjezat, Galbina, Schulergebirge (Bielz).

var. **tussilaginis** Suffr. Hátszeg (Deubel). var. **senecionis** Schumm. Retjezat, Galbina, Kerzer Gebirge, Tesla, Hargitta, Borszék (Bielz); Zibinsgebirge, Bistra (Ormay); Rodnagebirge (c. a.); Pietrosul, Nagyhagymás (Deubel).

a. **iristicula** Ws. Fogarascher Geb., Kronstädter Gebirge (Bielz); Schulergebirge (Deubel).

a. **fraudulenta** Ws. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Schulergebirge (Deubel).

speciosissima Scop. Rodnageb. (Deubel).

a. **nigrescens** Letrn. Bucsecs (Deubel).

var. **juncorum** Suffr. Retjezat, Präsbe, Kerzer Gebirge, Vistertal, Fogarascher Gebirge, Hargitta, Oláhfalu (Bielz); Kronstadt (c. a.); Bistra, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rodnagebirge, Bucsecs (Deubel).

a. **carpathica** Kraatz. Fogarascher Geb., Kronstädter Gebirge (Bielz); Rotenturm, Rodnagebirge, Bistra (c. a.).

860. *Phytodecta* Kirby.

viminalis L. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Marosgebirge, Dees, Nagyenyed, Mezőség (Záh, Bielz); Szamosujvár, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

a. **10-punctatus** L. Kronstadt, (Méhely, c. a.); Schässburg (c. a.).

a. **Baaderi** Panz. Kronstadt (Méhely, Deubel).

rufipes Deg. Rotberg, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Dees (Bielz); Hermannstadt (Ormay, c. a.); Borszék (c. a.).

slavicornis Suffr. Marosgebirge (Bielz); Schässburg (Kokelußer, auf Weiden, c. a.).

Linnaeanus Schrank. (*triandrae* Suffr.). Freck (Rakovitza, Bielz); Alsó-Rákos, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Méhely).

fornicatus Brüggm. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

5-punctatus F. Rosenauer Gebirge (Deubel); Klausenburg (Müller).

a. **unicolor** Ws. Rosenauer Gebirge (Deubel); Ratosnya, Hermannstadt, Rotenturm (c. a.).

a. **padi** Penecke. Schulergebirge (Deubel).

a. **obscurus** Grimmer Piatra mare (Deubel).

pallidus L. Piatra Csaki, Gross-Scheuern, Götzenberg, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Iléviz, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg, Marosgebirge (Bielz); Rotenturm, Retjezat, Bistra, Bucsecs (c. a.); Zibinsgebirge (Ormay).

a. **nigripennis** Wse. Nagykőhavas (Méhely); Bistra (c. a.); Ilátszeg, Kronstadt (Deubel).

861. *Phyllodecta* Kirby.

(Chaetocera.)

vulgatissima L. Hátszeg, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Schässburg (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

(*Phyllodecta* i. sp.)

tibialis Suffr. (*viennensis* Wse.). Unter-Kerz, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

a. **Cornelii** Wse. Krizba, Kronstadt, Baróth (Méhely).

vitellinae L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

a. **brevicollis** Motsch. Kronstadt (Deubel).

laticollis Suffr. Kronstadt (Méhely); Előpatak, Retjezat, Schässburg (c. a.).

atrovirens Cornel. Kronstadt (auf Crataegus, Méhely); Retjezat, Unter-Kerz, Rodnagebirge (c. a.).

862. *Hydrothassa Thomson.*

aucta F. S.-Regen (Bielz).

- a. *glabra* Herbst. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Geb. (Bielz); Hammersdorf, Stolzenburg (Ormay); Előpatak, Schässburg, Baassen, Borszék, Szováta (c. a.); Kronstadt (Deubel)
- marginella* L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mezőség (Gyéke), Inter-Kerz (Altüfer, Bielz); Honigberg Altfluss, Deubel); Borszék, Ratosnya, Schässburg, Szováta (c. a.).

a. *germanica* Wse. Hermannstadt (Ormay); Balánbánya (c. a.).

863. *Prasocuris Latreille.*

phellandrii L. Hermannstadt, Reussener Teiche, Schässburg, S. Regen, Mezőség (Gyéke, Záh, Bielz); Hammersdorf (Ormay); Kronstadt, Szováta (c. a.).

junci Brahm. Hermannstadt, Grossscheuern, Hammersdorf, Neudorf b. H., Mediasch, S.-Regen (Bielz); Heitau, Michelsberg (Ormay); Előpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel).

vicina Luc. Michelsberg, Klausenburg (Bielz); Hátszeg, Kronstadt, Előpatak (c. a.).

864. *Sclerophaedon Weise.*

Kenderesyl Kiesenw. Retjezat, Hátszeger Gebirge (Bielz); Balánbánya (c. a.).

- a. *carpathicus* Wse. Rodnagelbirge, Borszék, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Schulergelbirge, Nagyhagymás (Deubel).

earniolicus Germ. Kronstadt, Paringul, Zibinsgeb., Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarascher Geb., Mediasch, Oláhfalu, S.-Regen, Bistritz (Bielz); Schulergelbirge, Frecker Gebirge (Serbota), Bistra, Balánbánya (c. a.).

- a. *franssylvanicus* Fuss. Kerzer Gebirge, Kronstädter Gebirge, Buesecs, Hargitta (Parajil), Oláhfalu (Bielz); Schanta, Porkovitza (Zoolgeb., Ormay); Rodnagelbirge, Balánbánya (c. a.).

orbicularis Suffr. Hátszeg, Iléviz (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Paringul (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

865. *Phaedon Latreille.*

(*Sornoplatus*.)

segnis Ws. Rodnagelbirge (Ganglbauer).

Deubeli Weise. Rodnagelbirge, Bucsecs (alpin, Deubel).

(*Neophaedon*.)

pyritosus Rossi. Gross-Scheuern, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay, c. a.); Schässburg (c. a.); Miriszló (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Kronstadt (Deubel).

(*Phaedon* i. sp.)

laevigatus Duft. (*galeopsis* Seidl., *sabulicola* Suffr.). Neudorf b. H., Schässburg? (Bielz); Brenndorf, Honigberg (Altfluss, Deubel).

grammieus Duft. Gross-Scheuern, Neudorf, Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Honigberg Altfluss, Deubel.

cochleariae F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Hátszeg, Marienburg b. Kr., Tordar Schlucht, Borszék (c. a.); Rodnagelbirge, Nagyhagymás (Deubel).

a. *neglectus* Sahlb. Klausenburg (Bielz).

armoraciae L. (*parvulus* Duft.). Götzenberg, Mezőség (Záh, Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Klausenburg (c. a.); Kronstadt, Schulergelbirge (Deubel).

var. *salicinus* Heer. Hermannstadt (Bielz).

866. *Plagioderma Erichson.*

Auf Erlen und Weiden.

versicolor Laich. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

867. *Melasoma Stephens.*

(Linaeidea.)

aenea L. Durch das Bergland verbreitet.

- a. *haemorrhoidalis* L. Kerzer Gebirge (Ormay); Retjezat, Schässburg, Bistritz, Rodnagelbirge (c. a.).

(Microdera.)

cupreum Hátszeg, Hermannstadt, Rothberg b. H., Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Gyögy, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schässburg, Hidegszamos (c. a.).

20-punctatum Scop. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Gyögy (Ormay); Borszék (c. a.).

collaris L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

alpinum Zett. Hátszeg (Bielz).

Das Vorkommen dieser Art bedarf der Bestätigung, zumal dieselbe nur von einem einzigen Fundorte angeführt wird; eher dürfte *M. lapponicum* L. bei uns vorkommen.

(*Melasoma* i. sp.)

populi L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

tremulae F. longicollis Suffr.). Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

saliceti Ws. Bodzaer Gebirge, Kronstadt, Baróth (Méhely); Klausenburg, Nagy-enyed (c. a.).

Galerucini.

Galerucae.

868. Agelastica Redtenb.

Auf Erlen.

alni L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

869. Phyllobrotica Redtenb.

quadrimaculata L. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Baassen (c. a.); Honigberg (Deubel).*adusta* Creutz. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuerl, Hammersdorf, Rotenturm, Holzmengen, Marjol, S.-Regen, Schässburg (Bielz, auf Malve); Kronstadt (Deubel).

870. Luperus Geoffroy.

(Calomierus.)

circumfusus Marsh. (nigrofasciatus Wse.). Hátszeg, Mühlbach (r. B.), Talmesch, Girelsau, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Stolzenburg, Gyögy (Bad, Ormay); Rosenauer Gebirge (Deubel, c. a.); Schässburg (c. a.); Bistritz (Müller).*pinicola* Duft. Hátszeg (Csópea, Bielz); Kronstadt (Deubel).

(Luperus i. sp.)

xanthopus Schrank (rufipes Scop., xanthopoda Schrank, Seill.). Gross-Scheuerl, Hammersdorf, Neulorff b. H., Holzmengen, Kerzer Gelirge, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Mező-éz (Gyeke, Záh, Bielz); Hermannstadt, Stolzenburg (Ormay); Szováta (c. a.).

L. rufipes Scop. kann zu xanthopus Schrank oder zu longicornis F. gezogen werden; in Schässburg habe ich bis jetzt nur longicornis gesammelt; welche Art Bielz mit seinen rufipes meint, kann ich nicht entscheiden; sein rufipes findet sich bei Hátszeg, Kronstadt und Sächsisch-Regen.

rugifrons Wse. Hermannstadt (Seidlitz); Schässburg (c. a.).*longicornis* Fabr. (rufipes Scop.). Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Kronstadt (Deubel).*niger* Goeze. Rotenturm (auf Erle, Alnus glutinosa, Ormay); Marosgeb. (Müller). *flavipes* L. Gross-Scheuerl, Kerzer Geb., Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Szurduk-Pass, Schulergebirge, Borszék (c. a.).*cyanipennis* Küst. Kronstadt (Deubel); Klausenburg (c. a.).*viridipennis* Germ. Paringul, Kronstadt, Tartlau (Bielz); Frecker Gebirge (Sorbota, c. a.).

871. Lochmaea Wse.

capreae L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.var. *pallidipennis* Küst. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).*suturalis* Thoms. Baróth (Méhely); Rotenturm (c. a.).var. *erataegi* Först. Neulorff b. H., Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm (Ormay); Klausenburg (c. a.).a. ♂ *binolata* Duft. Mit der Stammform.

872. Galerucella Crotch.

(Pyrrhalta.)

viburni Payk. Hátszeg, Gross-Scheuerl, Heltau, Götznerberg, Mediasch, Schässburg, Borszék (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Kronstadt, Noa (Deubel).

(Galerucella i. sp.)

nymphaea L. Kronstadt (Bielz).*lineola* F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.*luteola* Müll. (xanthomealaena Schrank). Kronstadt, Weidenbach, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Hátszeg (c. a.).*calmariensis* L. Gross-Scheuerl, Kerzer Gelirge, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Gyögy (Bad, Ormay); Bistritz (c. a.).*pusilla* Duft. Mezőség (Gyeke, Méhely); Karlsburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).*tenella* L. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuerl, Heltau, Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz); Tordaer Schlucht, Dees, Karlsburg (c. a.).

873. Galeruca Geoffroy.

(Galeruca i. sp.)

tanaceti L. Durch das Berg- und Hügelland, im Grase und an Wegen.*pomonae* Scop. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.*Dahli* Joann. Kronstadt (Méhely).

(Emarhopa.)

rufa Germ. Mühlbach, Mediasch, Kronstadt (Bielz); Nagy-Lak (Unterweissenburger Komitat, Ormay).

(Haptoscelis.)

melanocephala Ponza. Hátszeg, Gross-Scheuerl, Mediasch, Dees, Mezőség (Gyeke, Bielz); Örményszék (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Karlsburg (c. a.); Klausenburg (Müller).

874. Euluperus Weise.

xanthopus Duft. Gross-Scheuerl, Holzmengen (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay).

Schässburg ist vorläufig aus der Reihe der Fundorte zu streichen, ebenso Kronstadt.

major Wse. (*cyanescens* Bielz). Kronstadt, Rosenau auf Weide häufig (Deubel); Bucecs (c. a.).

Halticae.

875. *Podagrion Foudras.*

fuscipes L. Hâtszeg, Hermannstadt, Holzmengen (Bielz).

malvae Illig. Hermannstadt, Gross-Scheuerne, Salzburg, Fogarasch, S.-Regen (Bielz). Schässburg ist aus der Reihe der Fundorte vorläufig zu streichen.

a. *acenescens* Ws. Vajda-Hunyad (c. a.).

fuscoicorinis L. Hâtszeg, Neudorf, Tahniesch, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Gyöke, Záh, Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Karlsburg (c. a.).

876. *Derocrepis Weise.*

rufipes L. Gross-Scheuerne, Neudorf bei II., Fogarasch, Tarthau, Előpatak, Schässburg, Mezőség (Záh, Bielz); Gyögy (Bad, Ormay); Kronstadt (Deubel); Bistritz (Müller).

877. *Crepidodera Chevrolat.*

temorata Gyllh. Retjezat, Rodnagelgebirge (c. a.); Zernest, Kronstadt (Deubel).

transsylvaniaica Fuss. Präsbe, Kerzer Geb. (Bielz); Schulengebirge, Rodnagelgebirge (c. a.); Rotenturm (Ormay); Bodzagebirge (Deubel).

corpolenta Kutsch. Paringul, Präsbe, Porcsest, Surul, Frecker Gebirge, Kerzer Gelirge, Arpascher Gebirge (Bielz); Rotenturm, Schanta (Ormay); Retjezal, Bistra, Schulengebirge, Balánbánya, Szováta (c. a.); Bucecs, Nagyhagy-máis (Deubel).

a. **opaca** m. Frecker Gebirge (Serbota, 2 Ex., c. a.).

Cr. *corpolenta* a. *opaca* unterscheidet sich von der Stammform durch feiner punktierte streite Flügeldecken mit fast flachen, fein gerunzelten Zwischenräumen der Punktstreifen, wodurch die Flügeldecken ganz matt, glanzlos erscheinen.

melanostoma Redtenb. Klausenburg (Bisherer Gebirge, Bielz).

cyanescens Duft. Frecker Gebirge, Frecker Jäser, Kerzer Gebirge (Bielz); Bucecs (c. a.).

picea Petri. Kerzer Gebirge (Ufer des Bulea-See), aus Grasbüscheln gesiebt, c. a.).

Dr. Heldhaus hat (Unters. über die Zoogeogr. d. Karpathen, K. k. zool. bot. Ges. Wien VI. 1) *C. picea* m. schlechthin als Synonym der *Cr. cyanipennis* Kutsch. erklärt. Ich kann mich seiner Ansicht nach nochmäliger Überprüfung und Vergleichung der drei gegenwärtig in meiner Sammlung befindlichen Stücke vom Bulea-See mit *Crepidodera cyanipennis* Kutsch. sowohl, als mit der in der Gestalt ähnlicher *Crep. cyanescens* Duft, den ich aus Steier-

mark besitze, nicht anschliessen und erhalte das Artrecht der *C. picea* m. aufrecht aus folgenden Gründen:

1. Unter den 3 Stücken ist ein Weibchen vollkommen ausgefärbt und ganz pechbraun. Tibiæ, Tarsen und die ersten Fühlerglieder etwas heller; die beiden anderen Exemplare erinnern in ihrer Färbung mehr weniger an *C. ferruginea* Scop.; von Blau keine Spur.

2. Die Größe ist geringer als die der kleinsten *C. cyanipennis* Kutsch.

3. Der Körper ist gedrungen, erinnert mehr an den der *Cr. cyanescens*, mit der sie auch in der Halschildpunktierung mehr übereinstimmt. Ein Stück der *Cr. cyanipennis* von Balánbánya besitzt eine ähnliche Halschildpunktierung, aber viel gestrecktere Gestalt, anders geformten Halschild, viel längere Fühler und die normale Färbung der *C. cyanipennis*.

4. Die Fühler sind kräftiger, kürzer als bei *Cr. cyanipennis* oder irgend einer andern Art der Gruppe.

5. Der Halsschild ist am Seitenrande vor den Hinterwinkeln deutlich, wenn auch schwach ausgeschweift, wodurch die Hinterwinkel spitzer und fast rechtwinklig werden, was bei *Cr. cyanipennis* nie der Fall ist; auch die Schwiele in den Vorderwinkeln ist mehr-weniger obsolet und weniger lang.

6. Auch in der Punktiering der Unterseite finden sich kleine Unterschiede, denen ich jedoch weniger Gewicht beilege.

7. Die Fältchen an der Halsschildbasis sind viel weniger tief und scharf begrenzt, die Querfurche zwischen denselben wenig vertieft.

Ich glaube diese Merkmale genügen, um das Artrecht der *Cr. picea* aufrecht zu erhalten und sie von allen Verwandten der Gruppe zu unterscheiden.

Ich war früher geneigt, kleine Stücke einer blauflügeligen *Crepidodera* vom Bucecs auch für *Cr. picea* zu halten, und ich glaube zwei solcher Tiere auch als *Cr. picea* versendet zu haben, eines auch steckte noch als fraglich bei *Cr. picea* in meiner Sammlung. Bei nochmaliger Untersuchung dieses zweifelhaften Stükess stellte ich jedoch fest, dass es nicht zu *Cr. picea*, sondern zu *Cr. cyanescens* gehörte, nur ist es etwas kleiner als die Stücke meiner Sammlung.

cyanipennis Kutsch. Kerzer Gelirge (Ormay); Kronstadt, Schulengebirge, Balánbánya (c. a.).

nigrifrons Gyllh. Hermannstadt, Heltau, Gyögy (Bad, Ormay); Schässburg, Baassen, Topánsvalva, Unter-Kerz (c. a.); Szurdok-Pass (Deubel).

transversa Marsh. (*impressa* Duft.). Hâtszeg, Gross-Scheuerne (Bielz); Hermannstadt, Kronstadt (Deubel); Schässburg, Malomvitz, Hâtszeg, Ratosnya, Karlsburg (c. a. auf Disteln).

impressa F. Hermannstadt, Fogarasch (Bielz); Schanta, Gyögy (Bad, Ormay).

Ich habe nach Untersuchung meines Materials und Vergleichung desselben mit spanischen *impressa* den Eindruck erhalten, als ob *impressa* bei uns nicht vorkomme, indem Individuen der *transversa* nur mit einigen wenigen Punkten auf der Mitte des Halsschildes vor dem Quereindruck, die aber größer sind als die des *impressa*, irrtümlich als *impressa* bestimmt werden seien; solche Exemplare besitze ich aus Karlsburg, aber auch aus Ungarn und aus Süddeutschland (Pfalz).

ferruginea Scop. Hâtszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuerne, Marpod, Götzemberg, Fogarasch, Reps, Héviz, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Oláhfalu, Sächs.-Regen (Bielz); Baassen, Ratosnya,

Torda, Előpatak, Puj (b. Hátszeg, c. a.); Nagyhagymás, Schuler - Gebirge (Deubel).

878. *Lythraria Bedel.*

salicariae Payk. Neudorf b. H. (Bielz); Schässburg (Kokelufer, gekötschert, 16. Mai), Rotenturm (c. a.); Honigberg (am Altflossufer, Deubel).

879. *Epithrix Foudras.*

pubescens Koch. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Alsó - Rákos (c. a.); Bistritz (Müller).

atropae Foudr.

a. *4-maculata* Ws. Kronstädter Gebirge (Deubel).

880. *Chalcoides Foudras.*

Die Arten leben meist auf Weideu, auch auf Erlen- gebusch finden sie sich.

nitidula L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schanta (Ormay); Borszék (c. a.).

aurea Geoffr. (*metallica* Duft., *splendens* Wse.) Oláhfalu (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Papolez (Háromszék, Méhely).

a. *laeta* Ws. Kronstadt (Deubel).

a. *cyanæa* Marsh. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

tulvicornis F. (*helixines* Ws.). Schässburg, Előpatak, Ratosnya, Borszék (c. a.); Hátszeg, Hermannstadt, Grossscheuern, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Mező-ésg (Gyeké, Záh, Bielz); Götzemberg, Schanta, Szamosujvár (Ormay).

aurata Marsh. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

Plutus Latr. (*chloris* Foudr.). Nagyenyed, Karlsburg (c. a.).

881. *Hippuriphila Foudras.*

Modeeri L. Hátszeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Marpod, Kronstadt, Tartlau, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Petrozsény, Karlsburg, Rotenturm (c. a.).

882. *Orestia Germ.*

alpina Germ. Surian, Präsie, Kerzer Gebirge, Hargita, Borszék (Bielz).

arcuata Mill. Kerzer Gebirge (Bielz); Schulergebirge, Balánbánya, Bodzaer Gebirge, Schässburg, Rodnagebirge (c. a.); Bucsecs, Königstein (Deubel).

carpathica Reitter. Malomviz (Hátszeg), Rotenturm, Alsó-Rákos, Szováta, Schässburg (c. a.).

puncticollis Reitter. Kerzer Gebirge, Borszék (c. a.).

O. *puncticollis* Reitter fehlt im Catalogus col. Europae etc. 1906.

Aubei All. Schieithal, Kerzer Geb. (Bielz); Rotenturm (c. a.); Teppe bei Alsó-Rákos (Deubel).

883. *Minota Kutschera.*

(*Hypnophila Foudras.*)

obesa Waltl. Frecker Gebirge (Serbota), Paringul, Rotenturm, Kronstadt (Kapellenberg), Topánfalva (Erzgebirge), Rodnagelirge (c. a.).

a. *carpathica* Heikertinger. Ralánbánya, Frecker Gelirge (Serbota), Rodnagelirge (c. a.).

884. *Mantura Stephens.*

oblusata Gyll. Hátszeg (Bielz); Kronstadt, Ratosnya (c. a.).

chrysanthemi Koch. Hátszeg (Bielz).

rustica L. Hermannstadt, Neudorf bei H., Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).

885. *Chaetocnema Stephens.*

(*Tanoma.*)

semicoerulea Koch. Hátszeg, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Honigberg (Deubel).

concinna Marsh. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

tibialis Illig. Karlsburg (c. a.); Rodnagelirge, Kronstadt (Deubel).

(*Chaetocnema i. sp.*)

compressa Leitzn. Schässburg (c. a.); Honigberg (Altfloss, Deubel).

meridionalis Foudr. Hátszeg (Bielz); Grossau (Ormay); Honigberg (Altfloss, Deubel).

Mannerheimi Gyllh. Hátszeg, Gross-Scheuern, Girelsau (Bielz); Honigberg (Deubel).

aridula Gyll. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Marpod, Kronstadt, Előpatak, Schässburg, Oláhfalu (Bielz); Grossau, Orlat (Ormay); Unter-Kerz, Karlsburg, Petrozsény, Baassen (c. a.).

arida Foudr. Rosenau-Gebirge (von Weise bestimmt, Deubel).

hortensis Geoffr. (*aridella* Payk.). Gross-Scheuern, Marpod, Oláhfalu, S.-Regen, Mezőség (Gyeké, Záh, Bielz); Frecker Gebirge (Serbota). Unter-Kerz, Hátszeg, Rotenturm, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Rónha - Gebirge Kronstadt (Deubel).

886. *Psyllodes Berthold.*

(Psyllomima.)

cucullata Illig. Klausenburg (Bielz); Nagy Hagymás (Deubel); Schässburg (Breite, 12. August, c. a.).

(Psylliodes n. sp.)

Schwarzii Ws. Paringulgebirge? (c. a.); Rodnagelbirge, Schuler (Deubel).

Frivaldszkyi Ws. Schulergelbirge, Csukás, Paringul, Rodnagelbirge (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

subaenea Kutsch. Frecker Gebirge (Sorbota, Kerzer Gebirge (Bulea), Rodnagelbirge (c. a.); Bucecs, Königstein (Deubel)).

attenuata Koch. Hâtszeg, Gross-Scheuern, Holzmengen, Marpod, Girelsau, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Vajda-Hunyad, Nagyenyed, Baassen, Rodnagelbirge, Szováta (c. a.); Bucecs (Deubel).

chrysoccephala L. Hâtszeg (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Szamosuvjár (Ormay).

var. *nueea* Ill. Ratosnya (c. a.).

cyanoptera Illig. Götzenberg, Fogarasch (Bielz).

napl Fabr. Hermannstadt, Hammersdorf, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Borszék, Präsaka (bei Zalatna, c. a.); Varygas (bei der Almásér Höhle, Deubel).

thlaspis Foudr. Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).

picipes Redtenb. Kronstadt (Bielz).

cuprea Koch. Rotberg b. H., Freck, S.-Regen (Bielz).

pyritosa Kutsch. Vajda-Hunyad (c. a.).

affinis Payk. Hâtszeg, Neudorf bei H., Tardlau, Mediasch (Bielz); Kronstadt (Bielz, c. a.); Borszék (c. a.).

dulcamarae Koch. Gross-Scheuern (Bielz); Karlsburg, Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

hyoscyami L. Nagyhagymás (Deubel).
a. *chalcomera* Illig. Karlsburg, Hermannstadt, Schässburg, Balánbánya (auf Disteln, c. a.).

tuteola Müller. Hammersdorf, Előpatak Oláhsalu (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Baassen, Büdös (c. a., auf Weiden); Erösd (am Altfluss, Deubel).

picina Marsh. Klausenburg (Bielz); Oláhsalu (c. a.).

a. *melanophthalma* Dult. Götzenberg, Fogarasch, S.-Regen (Bielz).

887. *Haltica Geoffroy.*

quercetorum Foudr. (erucae Oliv.). Hermannstadt (a. B.), Kronstadt, Schässburg (Bielz); Hahnbach b. H. (c. a.).

lythri Aub. Hâtszeg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg, Schässburg (c. a.).

tamaricis Schrank. Hâtszeg, Mezőség (Gyéké, Záh, Bielz); Hermannstadt (Ormay); Unter-Kerz (c. a.).
fruticota Ws. Schässburg, Klausenburg, Dees, Rodnagelbirge (c. a.).
oleracea L. Durch das ganze Gebiet verbreitet, auch in allen Gebirgen.

888. *Hermaeophaga Foudras.*

mercurialis F. Schielthal, Götzenberg (Bielz); Topánfalva (Erzgebirge). Alsó-Rákos, Szováta (c. a.); Kronstadt (Deubel).

889. *Batophila Foudras.*

rubi Payk. Hermannstadt, Hammersdorf, Kerzer Gebirge, Fogarasch (Bielz); Zibinsgebirge, Zool (Ormay); Paringul, Rotenturm, Balánbánya, Alsó-Rákos, Schässburg, Zalatna, Rodnagelbirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

890. *Phyllotreta Foudras.*

armoraciae Koch. Mühlbach, Grossscheuern (Bielz); Ilya mica (Naszód, c. a.).

exclamationis Thunbg. (brassicae Illig.). Hâtszeg, Gross-Scheuern, Sácis-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt, Hammersdorf, Szováta (c. a.).

ochripes Curt. Hosszufalu, Tartlau, Schässburg (Bielz); Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

a. *cruciata* Ws. Schässburg (c. a.).

letrastigma Con. Kronstadt, Szováta, Borszék (c. a.); Bucecs (Deubel).

flexuosa Illig. Hammersdorf, Holzmengen, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel).

Schässburg ist irrtümlich unter die Fundorte der flexuosa aufgenommen worden also zunächst zu streichen.

a. *fenestrata* Ws. Kronstadt (Mit der Stammform Deubel).

sinuata Steph. Hâtszeg, Fogarasch, Schässburg (Bielz); Rotenturm, Rodnagelb. (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. *monticola* Ws. Hâtszeg (c. a.).

undulata Kutsch. Fogarasch, Mezőség (Záh, Bielz); Hâtszeg, Kronstadt (Gesprenge, Zinne, Schässburg, Borszék, Ilya mica (Naszód), Zalatna (c. a.); Rodnagelb., Bodzaer Gebirge (Deubel); Erzgebirge (Müller).

vittula Redtenb. Hâtszeg, Kronstadt (Gesprenge, Bielz). Schässburg, Ratosnya, Klausenburg, Bistritz, Rodnagelbirge, Tordaer Schlucht (c. a.).

nemorum L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

alra F. (aterrima Schrank, punctulata Marsh.). Hâtszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Holzmengen, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Baumgarten, Klein-Pold, Szamosuvjár (Ormay); Karlsburg (c. a.); Rodnagelbirge, Kronstadt (Deubel).

cruelferae Goeze (*obscurella* Illig.). Holzmengen, Mezőség (Gyeke, Bielz); Unter-Kerz, Kronstadt (Gespreng), Schässburg, Dees (c. a.); Rodnagelbirge, Bistritz (Müller).

aerea All. (*punctulata* Foudres.). Unter-Kerz, Schässburg (c. a., in Gärten jungen Pflanzen schädlich, Erdfloh), **diademata** Foudr. Unter-Kerz, Schässburg, Ilvamika (Naszód, c. a.); Schulergeb., Rodnagelbirge, Kronstadt (Deubel).

procera Redtenb. Retjezat, Hermannstadt, Klausenburg (c. a.).

nigripes F. Gross-Scheuern, Mezőség (Záh, Bielz); Vajda-Hunyad, Marosujvár (c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel).

891. *Aphthona Chevrolat.*

Aphthona cyprissiae, Koch, ist aus unserem Verzeichnisse zu streichen, da die Art durch seinen Irrtum meinerseits in dasselbe gekommen ist.

abdominalis Duft. (*albinea* Thoms.). Håtszeg (Bielz); Kronstadt (Deubel); Schässburg (c. a.).

pallida Bach. Kronstadt (Zinne, Méhely).

lutescens Gyllh. Schässburg (Fuchsloch, c. a.); Honigberg am Altfluss (Deubel).

violacea Koch. Gross-Scheuern, Marpod (Bielz); Honigberg am Altfluss (Deubel).

venustula Kutsch. Håtszeg (Bielz); Hermannstadt, Schässburg (c. a.); Schulergerlige, Rosenaugebirge, Tepe bei Alsó-Rákos (Deubel); Torda (Müller). **pygmaea** Kutsch. (*atrococerulea* Thoms.). Kronstadt, Tartlau (Bielz).

cyanella Redtenb. Vajda-Hunyad, Tordaer Schlucht (c. a.); Kronstadt (Deubel).

coerulea Geoffr. (*nonstriata* Harold). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Marpod, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel).

euphorbiae Schrank (*hilaris* All.). Håtszeg, Gross-Scheuern, Zood, Präsbe, Nussbach, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (c. a.); Erzgebirge (Müller).

ovata Foudr. Tartlauer Wald (Méhely); Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Bücsics, Schuler, Rosenau, Kronstadt (Deubel).

Stüssineri Ws. Schulergebirge (Deubel, c. a.).

atratala All. Kronstadt (Bielz); Vajda-Hunyad (c. a.).

herbigrada Curt. Schässburg (Bielz); Gyögy (Ormay); Rosenaugebirge (Deubel).

lacertosa Rosenh. Håtszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Rotberg b. H., Kronstadt, Tartlau, Előpatak, Mezőség (Gyeke, Záh), Stolzenburg, Gyögy (Bad, Ormay); Vajda-Hunyad, Zalatna, Schässburg, Baassen (c. a.).

892. *Longitarsus Latreille.*

echii Koch. Hermannstadt, Neppendorf, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Bielz); Schässburg (April, Wieteburg, c. a.).

Linnaei Duft. Schässburg, Kaißburg, Rotenturm (c. a.).

anchusae Payk. Håtszeg, Neudorf b. H., Meliasch, Schässburg, Mezőség (Záh, Bielz); Rotenturm (Ormay, c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel).

obliteratus Rosenh. Rosenau (Deubel).

niger Koch. Hermannstadt (Ormay, 2. Aug.); Rotenturm (c. a.); Schulergebirge, Kronstadt (Deubel).

parvulus Payk. (ater Laesh.). Håtszeg (Bielz); Schässburg (17. Mai, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel); Klausenburg (Müller).

holsticus L. Holzmengen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm, Schässburg (c. a.); Kroustadt (Deubel).

quadriguttatus Pontopp. Tartlau, Schässburg (Bielz); Reps (c. a.).

apicalis Beck. Gross-Scheuern, Iléviz, Oláhfalu (Bielz); Rotenturm (c. a., Ormay); Schulere-Gebirge, Kronstadt (Deubel); S.-Regen (Müller).

brunneus Duft. Retjezat (Bielz); Hermannstadt, Baumgarten bei H. (Ormay); Schässburg, Büdös (c. a.); Kronstadt (Deubel).

rubellus Foudr. (*gravidulus* Kutsch.). Kronstadt, Zinne (Deubel); Csukás (c. a.).

luridus Scop. Gross-Scheuern, Tartlau, Reps, Oláhfalu, S.-Regen (Bielz); Zibinsgebirge (Ormay); Büdös, Schässburg, Ratosnya (c. a.); Schulergebirge, Kronstadt (Deubel).

var. **cognatus** Ws. Kronstadt (Zinne), Dees (Méhely); Karlsburg (c. a.).
a. **4-signatus** Duft. Felsö-Venicze (Méhely).

stragulatus Foudr. Schässburg, Håtszeg (c. a.).

lateripunctatus Rosenh. var. **personatus** Ws. Schässburg (Wieteburg, 1 Ex. gesiebt, 11. April, Schrankel, 20. Mai, c. a.).

nasturtii F. Mühlbach, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schulergebirge (Deubel); Baassen, Szováta (c. a.).

suturalis Marsh. Kronstadt (Deubel).

atricillus L. Schässburg (Schulberg, 11. April, c. a.); Kronstadt, Honigberg (Deubel).

suturellus Duft. Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm (Ormay); Borszék, Balán, Schässburg (aus Kokelgeniste gesiebt 11. November); Schulergebirge, Rodnagelbirge, Rosenau (Deubel).

curtus All. (*pratensis* All.). Mezőség (Gyeke, Bielz).

- var. monticola** Kutsch. Kronstadt, Zinne (Deubel).
melanocephalus Deg. (atricaillus illus) Duft., Kronstadt (Bielz); Schässburg Fuchsloch, 16. Oktober. Szováta, Rotenturm (c. a.); Hermannstadt, Heitau, Michelsberg, Schanta (Ormay).
var. atriceps Kutsch (atricillus Foulr.). Håtszeg (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Banningarten (Ormay); Kronstadt, Zinne (Deubel).
nigrofasciatus Goëze (lateralis Illig.). Karlsburg, Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Kronstadt (Deubel).
tabidus F. (verbasci Panz.). Neudorf b. H., Holzmeingen, Fogarasch, Mediasch, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (Schulberg, 24. März), Håtszeg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
a. vulgaris Ws. (verbasci Illig.) Gross-Scheuern, Fogarasch, Meliasch, Schässburg, Oláhfalu, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Håtszeg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
lycopi Foulr. Schässburg (c. a.); Kronstadt, Wolkendorf (Deubel).
pratensis Panz. (pusillus Gyll.). S.-Regen (Bielz); Grossau (Ormay); Weidenbach (Méhely); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
var. medicaginea Ak. Schässburg, Borszék (c. a.).
exoletus L. (femoralis Marsh.). Hermannstadt, Grossau (Juni—August, Ormay); Puj (b. Håtszeg), Karlsburg, Schässburg, Balánbánya, Borszék, Ilva mica (Naszód, c. a.).
pectoralis Foulr. Håtszeg, Kerzer Gebirge, Mezőség (Záh., Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg, Schässburg (c. a.); S.-Regen (Müller).
pellucidus Foulr. Karlsburg, Klausenburg, Nagyenyed, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Håtszeg (Deubel).
aeruginosus Foulr. Schässburg (c. a.).
jacobaeae Waterh. (laevis Duft.). Borszék (c. a.); Kronstadt, Håtszeg (Deubel).
ochroleucus Marsh. Schässburg (Bielz, c. a.); Hermannstadt (Ormay); Håtszeg, Ober-Kerz (Glashütte), Baassen, Szováta (c. a.); S.-Regen (Müller).
eanesceens Foulr. Hermannstadt (Juni, Ormay).

893. *Dibolia Latreille.*

- Schillingi** Letzn. Håtszeg (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
femoralis Redtenb. Mezőség (Záh., Bielz); Schässburg (c. a.).
Försteri Bach. Håtszeg (Bielz); Hermannstadt, Karlsburg, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

- carpathica** Ws. Borszék, Schässburg (c. a.).
depressiuscula Letzn. Håtszeg (Bielz).
rugulosa Redtenb. Kronstadt (Zinne, Deubel).
cynoglossi Koch. Hermannstadt, Gross-Scheuern, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf, Stolzenburg, Gyögy (Bal., Ormay).
occultans Koch. Königstein (Crepatura, Deubel).

894. *Apteropeda Chevrolat.*

- globosa** Illig. Gross-Scheuern (Bielz).
orbiculata Marsh. Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (Deubel).
a. aurichalcea Ws. Malomvitz (Håtszeg), Baassen (c. a.).

895. *Mniophila Stephens.*

Lebt in Moos.

- muscorum** Koch. Schielthal, Zilinsgebirge, Kerzer Gebirge, Schässburg (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagel, Balánbánya (c. a.); Kronstadt (Deubel).

896. *Argopus Fischer.*

- (Dicherosis.)
Ahrensi Germ. Götzenberg, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Baassen (c. a.).
(Argopus s. str.)
bicolor Fisch. (discolor Bielz). Klausenburg (Heuwiesen, Bielz).

897. *Sphateroderma Stephens.*

- testaceum** F. (cardui Gyllh.). Mühlbach, Freck, Kronstadt (Bielz); Karlsburg, Schässburg (c. a.). Ich sammelte die Art auf Carduus acanthoides. Håtszeg, Zernest (Deubel).

Cryptostoma.

Hispini.

898. *Hispella Chapuis.*

- atra** L. Håtszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Giresau, Marjod, Fogarasch, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Gyöke, Záh., Bielz). Hammersdorf, Grossau (Ormay); Maros-ujvár, Baassen (c. a.); Várhegy, Törzburg, Persáner Gebirge (Deubel); Bistritz (Müller).

Cassidini.

899. *Hypocassida Weise.*

- subferruginea** Schrank. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Neudorf b. H., Kron-

stadt, Tartlau, Mediasch, Dees, Mezőség (Gyeke, Zäh, Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.).

900. *Cassida Linné.*

(Odontionycha.)

fastuosa Schall. Hátszeg, Mühlbach, Heltlau, Girelsau, Unter-Kerz, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg (c. a.).

(Odontionycha i. sp.)

canaliculata Laich. (austriaca F.). Mühlbach, Klausenburg (Bielz); Schässburg (c. a.); Mező-Zäh (Deubel).

vittidis L. (equestris F.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

hemisphaerica Herbst. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Talmesch, Schässburg (Bielz).

(Mionycha.)

azurea F. (ornata Creutz, lucida Suffr.). Gross-Scheuern, Tartlau (Bielz); Schässburg (c. a.); Vargyas, Mező-Zäh (Deubel).

splendidula Suffr. (subreticulata Suffr.). Hátszeg, Holzniengen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

margaritacea Schall. Hátszeg, Hermannstadt (a. B.), Talmesch (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Pnj (b. Hátszeg), Kronstadt, Schässburg (c. a.); Rotenturm (Deubel).

(Cassida i. sp.)

Murraea L. Retjezat, Mühlbach, Hammersdorf, Porcsest, Surul, Kerzer Gebirge, Szombat, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Bielz); Miriszlo (Unterwissenburger Komitat, Ormay); Karlsburg, Schässb., Baassen (c. a.); Hohe Rong, Babarunka-Tal (Deubel).

atrata F. Hátszeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf (Bielz); Hermannstadt, Rakovita (Ormay); Rotenturm, Baassen (c. a.); Bistritz (Müller).

denticollis Suffr. Zalaína, Schässburg (c. a.).

rufovires Suffr. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Girelsau (Bielz); Zalaína, Klausenburg, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

stigmatica Suffr. Mezőség (Gyeke, Bielz); Hermannstadt, Klein-Pold, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

sanguinolenta Müll. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mediasch, Schässburg S.-Regen (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Schässburg (c. a.).

prasina Illig. (chloris Suffr.). Hermannstadt, Schässburg (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

sanguinosa Suffr. Hátszeg, Holzmengen, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Zäh, Bielz).

rubiginosa Müll. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mediasch, Schässburg. S.-Regen, Mezőség (Zäh, Bielz); Hammersdorf, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt (Deubel).

ferruginea Goeze. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Girelsau, Freck, Előpatak, Schässburg, S.-Regen (Bielz).

vibex L. Mühlbach, Hermannstadt, Hammersdorf, Girelsau, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Schässburg, Oláhfalu, Dees (Bielz); Klein-Pold (Ormay); Reps (c. a.).

a. **pannonica** Suffr. Kronstadt (Deubel).

nebulosa L. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Hosszuhalu, Mediasch, S.-Regen, Dees, Mezőség (Gyeke, Zäh, Bielz); Kleinpold, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Marosujvár, Klausenburg (c. a.).

flaveola Thunb. Hátszeg, Gross-Scheuern, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

nobilis L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

vittata Villers (oblonga Illig.). Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Rodnagebirge (Deubel).

LXX. *Lariidae.*

Larinæ.

901. *Spermophagus Steven.*

sericeus Geoffr. (cardui Boh.). Durch das ganze Berg- und Hügelland, namentlich auf Disteln.

Küsteri Schilsky. Karlsburg (c. a.).

variolosopunctatus Gyll. Hermannstadt (Bielz).

902. *Laria Scopoli.*

(Mylabris Geoffr., Bruchus L.)

loti Payk. Hátszeg, Girelsau, Marpod (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Torda (Müller).

pallidicornis Boh. Hátszeg (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Alsó-Rákos (Tepe, c. a.).

tristicule Fahr. Gross-Scheuern (Bielz); Puj (b. Hátszeg, c. a.).

atomaria L. (seminaria Bach, granaria L.). Girelsau, Marpod, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Zäh), Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Schässburg, Szováta (c. a.).

rufimana Boh. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Girelsau (Bielz); Schässburg (c. a.).

affinis Fröhlich. Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel); Szováta, Nagyenyed, Hátszeg (c. a.).

pisorum L. (*pisi* L.). Hâtszeg, Hermannstadt, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Klausenburg (Bielz); Salzburg (Ormay); Nagyenyed (c. a.).

viciae Oliv. Mezőség (Gyeke, Záh). Kronstadt (Deubel). Hâtszeg, Baassen, Szováta, Schässburg (c. a.).

nubila Boh. (*rufipes* Baudl.). Grossscheuern, Holzmengen (Bielz); Kronstadt (Deubel); Hâtszeg, Klausenburg, Schässburg (c. a.).

luteicornis Illig. Hâtszeg, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).

903. *Bruchidius Schilsky.*

marginalis F. Gross-Scheuern, Girelsau, Marpod (Bielz); Hammersdorf, Kronstadt (Deubel); Szováta, Schässburg, Baassen, Borszék (c. a.); Maros-Vásárhely (Müller).

unicolor Oliv. (*olivaceus* Germ., *canus* Germ.). Neppendorf, Gross-Scheuern, Marpol (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

var. **debilis** Gyll. (*canus* Seidl.). Baassen (c. a.).

var. **misecillus** ♂ Boh. Hâtszeg (Deubel).

bimaculatus Oliv. (♀ *dispergatus* Gyll., *variegatus* Germ.). Fogarasch, Grossscheuern (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Bistritz (Deubel); Baassen (c. a.).

imbriocornis Panz. Gross-Scheuern, Girelsau, Marpod, Fogarasch (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Gyögy (Bal, Ormay); Kronstadt (Deubel); Schässburg, Baassen, Karlshurg (c. a.).

varius Oliv. Hâtszeg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hâtszeg, Rosenau, Kronstadt (Deubel).

pauper Boh. Talinenberg bei Kronstadt (Deubel); Baassen (c. a.).

cisti F. (*vilosus* Bach, *ater* Redtenb.). Girelsau, Fogarasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Zinne), Mezőség (Gyeke, Méhely); Schässburg, Borszék (c. a.); Rotenturm (Deubel).

Rhynchophora.

LXXI. Anthribidae.

Urodoninae.

904. *Urodon Schönh.*

suturalis F. Mühlbach (roter Berg, Bielz).
pygmaeus Gyll. Klausenburg (Bielz).

Anthribinae.

Tropiderini.

905. *Platyrhinus Clairville.*

resinosus Scop. (*latirostris* F.). Zibinsgebirge, Gölsenberg, Präsbe, Kerzer Gelirge, Kronstadt, Bükszál, Mediasch, Schässburg, Olálfalú, Maros-Gebirge (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Oler-Kerz (Glashütte), Rodnagelirge (c. a.).

906. *Tropideres Schönh.*

bilineatus Germ. Zibinsgebirge, Holzmen- gen, Frecker Gelirge, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Vajda-Hunyad (c. a.).

albirostris Herbst. In den Gebirgen und im Bergland verbreitet.

dorsalis Thnb. Kronstadt (an einer Hausmauer, Méhely).

marchicus Herbst. (*cinctus* Payk.). Kerz (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Bodna, Hâtszeg, Kronstadt (Deubel); Marosujvár, Schässburg, Borszék (c. a.).

niveirostris F. Gross-Scheuern, Präsbe, Mediasch (Bielz); Kronstadt, Hâtszeg (Deubel); Schässburg, Marosujvár (c. a.).

sepicola F. Hermannstadt, Kronstadt, (Deubel). (Ehredreutes.)

oxyacanthe Bris. Hermannstadt (Bielz).

Authribini.

907. *Platystomus Schneider.*

Macrocephalus Oliv., *Anthribus* auct.)

albinus L. Hâtszeg, Präsbe, Frecker Gelirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Marienburg b. Kr., Nussbach, Bükszál, Mediasch, Schässburg, Marosgebirge (Bielz); Hermannstadt, Botenturm (Ormay); Retjezat, Rodnagelirge (c. a.); S.-Regen (Müller).

908. *Anthribus Geoffroy.*

fasciatus Forst. Zibinsgebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Zinne (Deubel); Schässburg (c. a.).

variegatus Geoffr. (*varius* F., *nebulosus* Seidl.). Gross-Scheuern, Präsbe, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Schanta (Ormay); Parin-gul-Gebirge, Schulgergebirge, Kronstadt (Deubel); Frecker Gebirge (Serbota), Bistra, Schässburg, Borszék (c. a.).

tessellatus Boh. Klausenburg (Bielz); Zinne (Deubel).
nebulosus Küst. Hermannstadt (Bielz); Rosnau, Schlergebirge (Deubel); Klausenburg (Müller).

Choragini.

909. *Choragus Kirby.*

Sheppardi Kirby. Toroczkó, Baassen (c. a.); Kronstädter Gebirge (Deubel).

Unsere Art weicht von Ch. *piceus* Kirby der Beschreibung nach ab, ebenso nach der Vergleichung mit zwei Exemplaren von Nord-Ungarn (Brancsik), stimmt aber auch mit der Beschreibung des Sheppardi nicht ganz überein, so dass die Annahme einer neuen Art vorliegt. *piceus* Schaum. Zinne (Deubel).

LXXII. Curculionidae.

Otiorrhynchinae.

910. *Otiorrhynchus Germ*

(Dodekastichus.)

geniculatus Germ. Oláhfalu (Bielz); Karlsburg (c. a., am Fuss einer Erle unter Laub).

pulverulentus Germ. Schieltal, Hunyad, Fogarascher Gebirge, Kronstadt (Bielz); Schanta, Bistra (Ormay); Schlergebirge (Deubel).

a. **periscelis** Gyllh. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schuler-Gebirge, Hosszufalu (Bielz); Porkovitza (Zool.-Gebirge), Bistra (Ormay); Retjezat (c. a.).

a. **conspurcatus** Stierl. Zibinsgebirge, Toroczkó, Topánfalva, Bistra, Vajda-Hunyad (c. a.).

a. **rumeicus** Apfels. Ober-Kerz (Glashütte), Topánfalva, Schlergebirge, Bistra (c. a.).

contractus Stierl. Roberg b. II., Kerzer Gebirge (Bielz); Bucsecs, Bistra, Paringul (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

moldoviensis Apfels. Paring (c. a.); Schlergebirge, Bucsecs (Deubel). (Otiorrhynchus i. sp.)

^{1.} **latissimus** Stierl. Kronstadt (Bielz).

Aus der ersten Gruppe der Otiorrhynchus i. sp. führt Bielz auch O. *multipunctatus* Stierl. nec F. an, doch scheint dieser den Alpen eigentümliche Rüssler in Kronstadt nicht vorzukommen.

^{2.} **bisulcatus** F. Déva, Grosspold, Fogarasch, Kronstadt (Zinne), Schlergebr. (Bielz); Klausenburg (Bükwall), Toroczkó, Vajda-Hunyad (c. a.).

a. **longicollis** Gyll. Kronstadt (Bielz).

irritans Herbst. Toroczkó, Giresau, Talmesch, Rotenturm, Kronstadt, Mediasch, Görgöny-Tal, Dees (Bielz); Götzenberg, Nagyág (Ormay); Karlsburg, Klausenburg, Borszék, Hűtszeg,

Szurduk - Pass, Vajda-Hunyad (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

O. *griseopunctatus* Boh., den Bielz für Kronstadt anführt, scheint bei uns nicht vorzukommen.

hungaricus Germ. Déva, Vidra (Aranyos-Tal), Roberg b. H., Kerzer Gehirg., Fogarasch, Mediasch, Dees (Bielz); Magyar-Forró u. M. Bükkös (Unterwissenburger Konitat), Szamosujvár (Ormay); Klausenburg, Schässburg, Schlergebirge, Kronstadt (Zinne, c. a.).

Bielz führt auch O. *clavipes* Bonsd. (*tenebricosus* auct. non Herbst) für Kronstadt und Schlergebirge an; doch scheint diese Angabe auf einer Verwechslung mit O. *hungaricus* Germ. zu beruhen; bedarf jedenfalls einer neuerlichen Bestätigung, da mein Exemplar, das von der Zinne stammt, ein Weitchen des O. *hungaricus* ist.

niger F. Zibinsgebirge, Seliste, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Borszék, Maros-Gebirge, (Bielz); Bucsecs, Rodnagebirge (Koronjis, c. a.); Nagyhagymás (Deubel). a. **villosopunctatus** Gyll. Kerzer Gebirge (Bielz).

a. **montanus** Boh. Kerzer Geb., Schlergebirge (Bielz).

a. ♂ **coecus** Germ. Zibinsgebirge (Bielz). **haematopus** Boh. Bihargeb. (Bielz); Kronstadt (c. a.).

fuscipes Oliv. Schielthal, Mühlbacher Geb. (Verfu lui Petru), Zibinsgebirge, Seliste, Surul, Frecker Gebirge, Negoi, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schlergebirge, Rodnagelirge (Kuhhorn, Bielz); Borszék, Bucsecs (c. a., auf Fichten häufig); Nagyhagymás (Deubel).

a. **fagi** Gyllh. Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz).

laevigatus F. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Rodnagelirge (Koronjis, Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Előpatak, Schässburg (c. a.); Vargyas (Deubel).

^{3.} **morio** F. Schielthal, Kronstädter Gebirge, Königstein, Bucsecs, Tesla, Marosgeb. (Bielz); Paringul, Rodnagelirge (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

var. **ebeninus** Gyllh. Kronstadt, Schlergebirge (Bielz).

var. **memnonius** Gyll. Bucsecs (Bielz).

^{6.} **crinipes** Mill. Tömöscher Pass (Bielz).

^{7.} **raucus** F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

comatus n. sp. Zernester Gebirge (Deubel).

Otiorrhynchus *comatus* n. sp. Länge 5 mm. ohne Rüssel. Ein Weibchen.

Die Art gehört in die siebente Gruppe Stierlins in die Nähe des O. *lanuginosus*, von dem sie sich durch gedrungeneres Körperbau, kürzeren und dickeren Rüssel, kürzere Fühler, feiner punktierten Halsschild, deutliche Punktstreifen der Flügeldecken mit gewölbten Zwischenräumen, längeres, gröberes und anders gefärbtes Haarkleid usw. unterscheidet. Dunkelbraun, Fühler

und Beine rötlichgelb. Rüssel dick, kaum länger als der Kopf, konisch, kräftig gekielt, Augen klein wenig gewölbt, Stirne gewölbt, doppelt so breit als ein Auge, kaum breiter als der Rüssel zwischen der Fühlerinsertion. Fühler kurz, kräftig, der Schaft gegen die Spitze wenig verdickt, kaum kürzer als die Geissel, welche zur Spitze kaum merklich verdickt ist; die beiden ersten Glieder derselben gleich lang und dick, jedes etwa doppelt so lang als breit, das dritte Glied kurz, verkehrt konisch, so lang als breit, die folgenden quer, die letzten nahezu $1\frac{1}{2}$, so breit als lang. Halschild fast etwas länger als breit, an den Seiten schwach gerundet, nach hinten wenig, nach vorne stark verengt, stark konkav, massig fein und tief, dicht, fast runzlig punktiert, etwas glänzend, mit gelbbraunlichen, schwach metallisch glänzenden, anliegenden Haaren bedeckt, die sich nicht zu Längsbünden verdichten. Flügeldecken regelmässig oval; etwa anderthalbmal länger als breit, fein ehraniert, matt, deutlich punktiert gestreift, die Streifen vertieft, die Zwischenräume mässig gewölbt, mit heller und dunkler braunen, anliegenden, schwach metallischen Haaren etwas fleckig bekleidet. Beine kräftig, rötlichgelb, die Schienen gerade, die Vorderbeschien am Innenrande schwach zweibuchtig, an der Spitze nur nach Innen erweitert, an der Innenkante nicht gekerbt.

Deubel sammelte diese Art in einem Exemplar im Zernescher Gebirge.

Die Art hat im Habitus auch Aehnlichkeit mit der zweiten Gruppe des Subgenus Tournieria, da jedoch der Unterkörper verhältnismässig weniger gross, die Vorderbeine kaum kräftiger entwickelt und der Rüssel etwas länger als der Kopf ist, halte ich seine Stellung in der 7. Gruppe des Subgenus Otiorychynus für die natürlichere. In dieser Gruppe nähert er sich in Form, Grösse und Habitus am meisten dem *O. raneus* F., von dem er aber durch längeres, punktiertes Halsschild, dünnere und feinere Behaarung und kleinere Augen verschieden ist.

8.
perdix Oliv. Retjezat, Talmatschel, Rotenturm, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Arpascher Gebirge, Schanta (Ormay); Zibinsklamm, Retjezat (c. a.); Hätzeg, Szurduk-Pass (Deubel).

10.
banaticus Stierl. Zibins-Gebirge (Vlegyásza, c. a.).

chrysomus Boh. Klausenburg (Bielz).

remotogranulatus Stierl. (Peterfi Mallász); Delunala, Biharer Gebirge (Mallász).

12.
conspersus Germ. Gross-Scheuern, Birtählm (Bielz); Rotenturm (vidi).

13.
juglandis Apfell. Rotenturm (Deubel, c. a.).
Apfelbeck (Mit. Bosn. 1896, 548) bezeichnet die Schenkel als ungezähnt. Mein Exemplar aus dem Rotenturm und ein zweites von Rhodus besitzen an den Vorderschenkeln zwei dicht nebeneinander liegende, zwar sehr kleine, aber deutliche, scharfe Körnchen.

14.
ormayi Stierl (Schweizer ent. Ges. Bd. 8 II. 1.). Porumbacher Gebirge (Sereci, hochalpin, Ormay).

mandibularis Redtenb. Örkény (Unterwissenburger Komitat, c. a.).

var. *granulosus* Boh. Klausenburg (Bielz).

16.
dacicus Dan. (*costipennis* Stierl.). Zibinsgebirge (Zibinsjäser, Sterpu), Kerzer Gebirge (Bielz); Präße, Arpascher

Gebirge (Ormay), Retjezat, Bistra, Frecker Gebirge (Serbota), Ober-Kerz (Glasbüttel), Bucsecs, Rotenturm (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

Nach den Untersuchungen Dr. Daniels (Stnien 2) kommt *O. costipennis* Rosenh. bei uns nicht vor, da Stierlin denselben nicht gekannt hat. Es gehören also die Fundorte des *O. costipennis* Rosenh. bei Bielz zu *O. costipennis* Stierl = *O. dacicus* Dan.

albensis n. sp. Ompolyitzatal bei Zalatna (c. a.).

Otiorychynus albensis n. sp. Länge 6 mm. *O. dacicus* Dan. proximus et similis, satis tamen differt rostro tenuiore, longiore, subcylindrico, antenais longioribus, gracilioribus, funiculi articulis ultimis haud transversi, oculis paulo minoribus, prothorace haud sulcato, minus dense aequaliter granulata, granulis paulo majoribus, elytrorum intersticio 2° et 4° a sutura piano, ceteris omnibus costatis, setulis costarum subrectis, reclinatis, fere spatuliformibus, pedibus gracilioribus, longioribus.

I specimen. Habitat valle ompolyizense prope locum transsylvaniaicum Zalatna.

Einem kleinen *O. dacicus* Dan., der mir von verschiedenen Orten (Bucsecs, Retjezat, Kerzer Gebirge, Bistra, auch von den Banater Bergen (Merk)) vorliegt, recht ähnlich, aber meiner Ansicht nach wegen der obigen Unterschiede kaum als Varietät des *O. dacicus* anzusehen, wie Dr. Karl Daniel, dem ich ein Exemplar der Varietät dieser Art zur Ansicht vorlegte, vorgeschlagen hat.

Der Käfer ist pechschwarz, matt, die Fühler, Schienen und Tarsen rötlichgelb. Rüssel und Fühlerschaft sind mit kurzen, dicken Schuppenborsten nicht sehr dicht bedeckt, der letztere ausserdem mit ziemlich langen etwas abstehenden Borsten. Alle Geisselglieder der Fühler sind mindestens so lang als breit, das erste und zweite an Länge kaum verschieden, jedes von ihnen etwa doppelt so lang als breit, das dritte etwas kürzer als das zweite, aber nicht dicker und viel länger als breit, die folgenden etwas kürzer, aber nicht dicker werdend, abstehend behaart. Kopf und Rüssel sind weniger dick als bei *O. dacicus*, der letztere auch länger und von den Augen bis zu den Pterygien äusserst schwach konisch, sein Rücken flach gefurcht, in der ebenen Furche fein gekielt, die Seitenränder der Furche an den Seitenrand des Rüssels gerückt, so dass dieselbe dreikigig erscheint. Die Stirne ist schwach vertieft an der Rüsselbasis, wenig gewölbt und deutlich breiter als das flache Auge. Der Halsschild ist dem des *O. dacicus* ähnlich, aber etwas weitaufgerichtet mit etwas grösseren Körnern von gleicher Grösse bedeckt, eine Mittelfurche nicht erkennbar, jedes Korn trägt ein niedergedrücktes dickes Schuppenborstchen, die zusammen die schwarze Grundfarbe nicht beeinträchtigen. Die Flügeldecken sind mit vereinzelten runden grauen Schüppchen bedeckt, auf den erhobenen Zwischenräumen befindet sich eine einfache, regelmässige Körperreihe und jedes Körnchen trägt ein an der Spitze schwach spatelförmig erweitertes, rückwärts gebogenes Börstchen. Nur der zweite und vierte Zwischenraum (der Nahtzwischenraum mitgerechnet) ist vollkommen flach und vollkommen ungekrönt, die übrigen alle gleichmässig rippenförmig erhoben. Die Beine sind schlanker und deutlich länger als bei *O. dacicus*.

Ein zweites Exemplar aus Topánava im Erzgebirge, welches Dr. K. Daniel ebenfalls als Varietät zu *O. dacicus* stellte, betrachte ich als Varietät dieser Art. Durch die dichte, graue, äusserst schwach metallische Beschuppung der Oberseite gewinnt sie grössere Ähnlichkeit mit ähnlich beschupptem *O. dacicus*, aber in der Rüsselform, den schlanken Fühlern und Beinen dem kleinen Kopf und in dem Fehlen der Halschildmittelfurche stimmt sie mit der neuen Art vollkommen überein. Ich führe sie als Varietät *obductus* m. ein. Auch bei der Va-

rietät ist nur der zweite und vierte Zwischenraum der Punktstreifen auf den Flügeldecken flach, die übrigen gerippt, aber ausser der Körnchenreihe auf den Rippen sind Körnchen auch in den Punktstreifen, vereinzelt auch noch auf den flachen Zwischenräumen bemerkbar.

var. **obductus** n. Topánfalva (c. a.).

antennatus Stierl. Paringul, Surian, Mühlbacher Gebirge (V. I. Petru.), Zibinsjäser, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz).

var. **Rosenhaueri** Stierl. Frecker Gebirge (Serbota), Kerzer Gebirge (Vunetoare), Negoi (Schutzhütte, Deubel).

aratus Dan. Bucsecs (c. a.).

cosmopterus Dan. Zernestgebirge, Königstein (Deubel).

scaher L. (septentrionis Hbst.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

proximus Stierl. (taticus Reitter). Frecker Geh. (Serbota), Balánhánya, Schulergelände, Borszék, Paringul, Rodnageb. (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

Da Bielz den nahe verwandten O. carpathicus Daa. nicht kannte und daher Fundorte des O. carpathicus und proximus durcheinander geworfen sein dürfen, führe ich nur die seit Bekanntwerden der neuen Art festgestellten Fundorte für beide an.

carpathicus Dan. Bucsecs, Frecker Geh. (Serbota), Kerzer Gebirge (Bulea-Tal, c. a.); Bodzaer Gebirge, Schulergeb. (Deubel).

hypsicatus Ganglb. Rodnagebirge (Deubel, c. a.); die Art wird oberhalb der Baumregion aus Grashüscheln gesiebt; Schulergebirge (Deubel).

18. **dubius** Ström (maurus Gyll.). Schanta (Ormay); Rodnagebirge, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Bodzaer Gebirge, Schulergeb. (Negoi) (Schutzhütte), Bucsecs (Deubel).

19. **lithanthracus** Boh. Zibinsgebirge (Bielz); Hátszegi Gebirge (alpin, Deubel).

denigrator Boh. Zibinsgebirge (Zibinsjäser, Negovan, Bielz); Bucsecs, Paringul, Retjezat (c. a.).

var. **Oeskayi** Stierl. Siebenbürgen.

glabratus Stierl. Schielthal, Máda, Torda, Marosgebirge, Czibles, Surian, Zeidner Berg, Kronstadt, Rosenau, Bucsecs, Piatra mare, Tesla (Bielz); Zalathna, Topánfalva, Retjezat, Schuler-Gebirge, Alsó-Rákó (c. a.).

20. (Dorymerus.)

rotundatus Siebold (seductor Stierl). Schässburg (Schulberg, Siechhofwald, Fuchsloch unter Laub), Vajda-Hunyad, Alsó-Rákó (c. a.); Karlsburg (von Hauptmann Zellich, Deubel).

Die Vergleichung eines aus Danzig stammenden O. rotundatus mit dem siebenbürgischen O. seductor Stierl. hat die Identität der beiden Arten ergeben, da ich zwischen denselben keinen Unterschied auffinden konnte; die Art besitze ich auch aus Kärnten von Herrn Stierlin.

22. **Kollaris** Gyll. Zibinsgebirge, Kerzer Geb., Kronstadt, Csiker Geb. (Balánhánya),

Borszék (Bielz); Retjezat, Rotenturm (c. a.).

a. **Küsteri** Stierl. Kronstädter Gebirge (Bielz); Kerzer Geb. (Ormay); Bistra (c. a.).

a. **Bielzi** Küst. Präsbe, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge, Marosgeb. (Bielz).

Deubeli Ganglb. Rodnagelgebirge (Deubel, Ganglbauer, c. a.); der Käfer scheint im Juni nicht selten zu sein.

Kuenburgi Stierl. Kronstädter Gebirge, Köningstein (Bielz).

Schaumi Stierl. Kerzer Gebirge, Csiker Gebirge (Balánhánya, Öcsém, Bielz); Arpascher Gebirge (Ormay); Rodnagelgebirge, Schulergebirge (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

equestris Richter (aerifer Germ.). Nagyhagymás, Kronstadt (Deubel); Klauenburg, Borszék (c. a.).

austriacus F. Schielthal, Godinest, Csib, Vidra (Aranyostal), Zood, Kronstadt, Schulergebirge (Bielz); Rotenturm, Gyögy (Bad, Ormay).

var. **carinatus** Gyllh. Klausenburg (Bielz).

Méhelyi Stierl. (Schweizer Mitt. 1895, 300). Hermannstadt, Tordaer Schleucht, Szurdok-Pass (c. a., am letzteren Orte an den Steinen der Strassenstützmauern gesammelt).

O. Méhelyi Stierl. scheint sich von O. austriacus F. nur durch dickeren, kürzeren, nach vorne konisch verengten Rüssel und etwas bedeutendere Grösse zu unterscheiden; dann dürfte O. austriacus bei uns gar nicht vorkommen und die Fundorte des austriacus wären auf O. Méhelyi zu übertragen.

amplus Petri. Kronstadt (c. a.).

oblitus Boh. Rosenauer Geb. (c. a.).

Mein Exemplar wurde von Herrn Ganglbauer als O. graniventris Mill. bestimmt, dessen Beschreibung aber durchaus nicht passt.

graniventris Mill. Csiker Gebirge (Balánhánya, Öcsém, Nagyhagymás, Bielz).

23.

longiventris Küst. Zibinsgebirge (Zibinsjäser, Sterpu), Surul, Frecker Geb., Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge, Marosgebirge (Bielz, c. a.).

Schon K. Fuss stellte fest (Verh. u. M. S. V.), dass die subalpine Form des O. longiventris in der Regel mehr-weniger beschuppt sei, während die Tiere oberhalb der Baumregion in der Regel unbeschuppt seien, fand jedoch keine weiteren Unterschiede. Meine Untersuchungen ergaben zwar einige Unterschiede, die jedoch nicht bei allen Tieren in gleichem Masse zur Entwicklung gelangen, sondern einen deutlichen Übergang von der alpinen zur subalpinen Form erkennen lassen.

Überseite der alpinen Form in der Regel unbeschuppt, aber immer mit spärlichen, feinen Börstchenreihe auf den Zwischenräumen, ausserdem zuweilen mässig dicht behaart, gegen die Basis etwas sparsamer, aber die Haare kaum schuppenförmig, oder gegen die Spitze zerstreut schuppenförmig behaart, die Schuppen aber viel schmäler, sehr selten fast so gross (Paringul), wie bei der subalpinen Form.

O. Eine kürzer, kräftiger, stärker keulig verdickt, Hinterschienen breiter und kürzer. Innenrand im Basisviertel stark, im 2. und 3. Viertel

schwächer, aber deutlich gebuchtet, der Ausschnitt vor der Spitze wie bei der subalpinen Form.

♀. Kopf und Rüssel dicker, letzterer bis zu den Pterygien stärker verjüngt, Hinterschienen breiter, zur Spitze bald stärker, bald schwächer allmählich erweitert und bald deutlich bald schwächer gegen die Spitze nach hinten gebogen.

Csiki hat Weibchen mit stark gebogenen und erweiterten Hintertibien als O. Fussianus beschrieben, die allerdings grosse Ähnlichkeit mit den Hinterschienen des Weibchens von O. Riessi und O. graniventris besitzen, doch sind die Hinterschienen des ersten und die Beine überhaupt bei den Weibchen viel kürzer und kräftiger, die Fühler deutlich kürzer und kräftiger, die letzten Geisselglieder nicht länglich wie bei longiventris, sondern rundlich; doch ist immerhin die Unterscheidung der Weibchen beider Arten schwierig.

Die alpinen Tiere meiner Sammlung stammen vom Bulea-See und der Vunetare im Kerzer Gebirge und von Karsia im Paringulgebirge, die subalpinen aus der nächsten Umgebung der Kerzer Glashütte. Die alpinen Tiere wurden aus Grasbüscheln gesichtet oder unter Steinen gesammelt, während die subalpinen auf Bremeseln leben.

Riessi Fuss. Kronstädter Gebirge, Bucsecs, Csiker Gebirge (Bielz).

25.

corruptor Host. (giraffa Germ.). Kronstadt (Bielz).

polycoccus Gyllh. Balánhánya (Vigyázókő, 1 ♀, Méhely).

curvipes Stierl. Siebenbürgen (Stierlin).

rugosus Hummel. Kronstadt (Bielz).

26.

alpigradus Miller. Borszék, Czibles (Bielz); Rodnagebirge (c. a.).

granicollis Boh. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz).

a. **pictus** m. Retjezat.

O. granicollis a. pictus kommt mit der Stammform vor, ist aber an den Seiten der Flügeldecken, namentlich gegen die Spitze hin mit Gruppen oder einzelnen weissen, schmalen schuppenförmigen, anliegenden Haaren gezeichnet. var. **Paringii** n. Paringulgebirge (c. a.).

O. granicollis var. **Paringii** (♂♀) ist kleiner und schlanker als die Form von Retjezat, die Flügeldecken sind deutlicher gestreift und gegen die Spitze mit vereinzelten runden Schuppen gezeichnet, die breiter sind als bei a. pictus oder O. longiventris, in den Streifen gekörnt, die Hinterschenkel etwas stärker geziert. Von dem ♀ des O. longiventris, für welche Ganglbauer diese Form irrtümlich hielt und dem sie sich in der Skulptierung der Flügeldecken nähert, unterscheiden die Form und Skulptierung des Rüssels, kräftigere Fühler, viel kürzeres 2. Geisselglied, schwächere Bezahlung der Vorderschenkel, runzlig granuliertes Abdomen und der Mangel der sexuellen Auszeichnung der Hinterbeine. Die Form der weiblichen Hinterschienen nähert sich der des weiblichen O. Fussianus.

Krattereri Boh. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Rodnagebirge (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Bucsecs, Schulergeb. (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

var. **egregius** Mill. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge, Schuler-Gebirge (Bielz); Nussbach, Rodna-Gebirge, Bucsecs (c. a.).

corvus Boh. Siebenbürgen (Stierlin).

Mocsaryi Csiki (montigena Friv.). Görögény, Oláhfalu (c. a.).

asplenii Mill. Hargita (Mezőhavas, Bielz); Rodnagelgebirge (c. a.).

var. **seriepunctatus** m. Rodnagebirge (c. a.).

O. Asplenii var. **seriepunctatus**. Der an dem kurzen, konischen Rüssel und der rechtwinkligen Aussenecke der Vorderschiene am sichersten erkennbare O. Asplenii ist in der Skulptierung der Flügeldecken variabel. Bei unseren O. Asplenii ist die Stierlio-sche Skulptierung selten deutlich ausgeprägt. Besonders auffallend ist eine Form mit fast vollkommen ebenen, glatten Flügeldecken (♂ mit Reihen länglicher, tiefer, scharf begrenzter Punkte, deren Zwischenräume sehr breit und vollkommen eben sind. Ich habe sie mit dem obigen Namen belegt.

obsidians Boh. Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Persanyer Gebirge, Kronstadt, Schulergebirge, Tömöscher Pass, Pialra mare, Hosszuvalu, Dongök, Kelemengel., Borgoer Pass, Rodnagelgebirge (Koronijs), Laposcher Gebirge (Oláh-Laposbánya, Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Nagyhagyomás (Deubel).

27.

dives Germ. Retjezat, Zibinsgebirge, Galbina, Götzemberg, Präsbe, Surl, Freeker Gebirge, Kerzer Gebirge, Marosgebirge, Gyalu (Bielz); Rotenturm (Ormay); Bistra, Malomvitz, Girbova, Topánfalva, Puj (bei Hátzeg, c. a.).

Die 4 Arten der 27. Gruppe, welche durch Bielz wohl nur irrtümlich durch O. gemmatus Scop. vermehrt wurde, da diese Art dem Alpengebiet angehört, lassen sich als solche nicht, auch kaum als Varietäten aufrecht erhalten, da die Übergänge von der einen zur anderen so mannigfaltig sind, dass sich typische Stücke für die einzelnen Arten selten finden. O. cymophanus Germ. basiert wohl auf grösseren Weibchen des dives mit weniger gewölktem Rücken der Flügeldecken. Die Skulptur des Rüssel-, der Flügeldecken und des Abdomens variiert, ebenso die Stärke des Vorderschenkelzahns, welche beim ♀ immer schwächer ist als beim ♂; in der Penisform finde ich keine Verschiedenheit. Es wird sich wohl empfehlen, als Stammform O. dives Germ. anzunehmen mit mehr-weniger dicht beschupptem Halsschild- und Flügeldeckenseiten und mit undeutlich punktierten Flügeldeckenstreifen; dazu gehört als Synonym O. cymophanus Germ. Als Varietät kann O. Fussi Küster aufgefasst werden mit eparsam und gleichmässig beschupptem Halsschild, auf den Flügeldecken bilden die Schuppen zerstreute, kleine Flecken; die Streifen der Flügeldecken sind deutlicher und tiefer punktiert, die Vorderbeine etwas kräftiger und ihre Schienen beim ♂ zweibuchtig, so dass sie am Innerrande oft stumpf gezähnt erscheinen. Der Rüssel ist bald flach, bald gefurcht mit oder ohne Kiel. Ebenso beschuppte Stücke mit tieferen, fast vollständig isolierten, grubenartigen Punkten in den Streifen bilden die Subvariätat O. opulentus Germ., wie es scheint stets ♂♂ des O. Fussi. Nach den Vertretern meiner Sammlung findet sich O. dives Germ. mit seinen Varietaten an folgenden Orten:

dives Germ. (c. cymophanus Germ.). Retjezat, Malomvitz, Puj b. Hátzeg, Bistra, Szurduk-Pass, Rotenturm, Kerzer Gebirge, Topánfalva, Girbova (Zibinsgebirge).

var. **Fussi** Küster. Rotenturm, Zibinsklamm, Arpascher Gebirge, Kronstadt, Schuler Geb., Thordae Schlucht, Szováta, Borszék, Rodnagelgebirge.

a. **opulentus** Germ. Retjezat, Arpascher Geb., Szurdukpass, Malomvitz, Rodnagelgeb., Borszék.

cymophanus Germ. Zibinsgebirge, Kerzer gebirge, Oláhfalu (Bielz).

opulentus Germ. Alsó-Grohot, Oláhfalu (Bielz); Arpascher Gebirge, Rodnagéh., Retjezat, Borszék, Szurdúk-Pass (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

Fussi Küst. Schielthal, Kerzer Geb., Kronstadt, Schulergebirge, Piatra mare, Borszék, Marosgebirge, Borgoer Pass, Klausenburg (Bielz); Götzenberg, Schanta (Ormay); Szováta, Tordaer Schlucht, Zibinskáklamm, Rodnagébirge, Borszék (c. a.).

28. **populeti** Boh. Kerzer Gebirge (Bielz).

O. **sulcatus** F., der in diese Gruppe gehört, ist aus dem Verzeichnis zu streichen, da die Aufführung desselben für Schässburg auf einem Irrtum beruht.

auricapillus Germ. Bihargébirge (Bielz).

tristis Scop. (migrita F.). Klausenburg (Bielz); Mirisló (Unterweissenburger Komitat), Szamosujvár (Ormay).

32.

squamosus Mill.

a. **squamulatus** Stierl. Siebenbürgen (Stierlin).

salicis Stróm. (lepidopterus F.). Mühlbacher Gebirge (Slimor), Präsbe, Borgoer Pass (Bielz); Schanta, Bistra, (Ormay); Borszék, Retjezat (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

tenuicornis Mill. Siebenbürgen.

Dieser Käfer ist seit Bielz in Siebenbürgen nicht mehr konstatiert worden, so dass sein Vorkommen bei uns zweifelhaft erscheint.

33.

Reichei Stierl. Zood, Kronstadt (Salomons-Felsen, Bielz).

34.

fusciventris Fuss. Bucsecs (Bielz); Königstein (Deubel).

var. **Scribae** Klement. Bucsecs (scheint Katalogname zu sein, da mir eine Beschreibung dieser Varietät unbekannt ist).

rufomarginatus Stierl. Siebenb. (Stierlin).

35.

Hampei Stierl. Siebenbürgen (Stierlin).

37.

marmota Stierl. Paringul, Retjezat (c. a.); Bucsecs.

O. rugifrons Gyll.; welcher der 38. Gruppe angehört, ist aus dem Verzeichnis zu streichen, da er irrtümlich in dasselbe gekommen ist. (Tithonus.)

chrysocomus Germ. Präsbe, Kerzer Geb. (Bielz); Frecker Gebirge, Retjezat (c. a.).

(Cryphiphorus.)

Illestici L. (subrotundatus Stierl). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

a. **agnatus** Gyll. Unter-Tömös (Méhely).

edentatus Seidl. Schässburg, Előpatak, Schulergebirge (c. a.); Balánbánya (Deubel).

cuprifer Stierl. Előpatak, Schässburg.

bicostatus Boh. Kronstädter Geb. (Bielz).

orbicularis Hbst. Ilátszeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Neudorf b. H., Kronstadt, Schulergebirge, Königstein, Me-

diasch, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Bielz); Nagyenyed, Szamosujvár (Ormay); Schässburg, Marosujvár, Karlsburg (c. a.).

(Tournieria.)

velutinus Germ. Siebenb. (Bielz); Karlsburg (Zellich).

fullo Schrank. (Zebra F.). Schielthal, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Hermannstadt, Klausenburg (c. a.).

subsetulosus Stierl. Siebenb. (Stierlin).

coarctatus Stierl. Hermannstadt, Kronstadt, Schulergebirge (Bielz); Rotenturm (Ormay); Klausenburg, Alsó-Rákos, Topánfalva (c. a.).

scopularis Hochh. Alsó-Rákos (c. a.).

pauxillus Rosenh. In allen Gebirgen im Moos, namentlich unter Fichteneisig).

var. **rugirostris** Stierl. (Mazurae Formanek.) Reljezat (c. a.).

maxillosus Gyll. Klausenburg (Bielz).

Nicht zu deuten vermag ich den O. imitatus Tourn., den Bielz vom Kerzer Gebirge anführt.

transsylvaniaicus Stierl. Siebenbürgen (Stierlin).

ovatus L. Im ganzen Berg- und Hügelland verbreitet.

Schusteri Stierl. Schulergebirge (oberhalb der Baunregion an trockenen, sandigen Stellen unter Steinen, Deubel, c. a.); Bucsecs (Deubel).

911. *Stomodes Schönh.*

gyroscopicollis Boh. Schielthal, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., S.-S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Gyögy (Bad), Kakova (Ormay); Schässburg, Reps, Ilátszeg, Vajda-Hunyad (c. a.); Kronstadt (Deubel).

912. *Peritelus Germ.*

leucogrammus Germ. Hammersdorf, Klausenburg (Bielz); Kronstädter Gebirge (c. a.); Petersberg b. Kr. (Talinenberg, Deubel).

familiaris Boh. Kronstadt (Bielz).

913. *Mylaeus Schönh.*

seminulum F. Fogarasch, Reps, Kronstadt, Tarflau (Bielz); Nussbach (auf Himbeergresträuch, c. a.).

rotundatus F. Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Stolzenburg (Ormay); Petersberg b. Kr. (Talinenberg, Deubel).

914. *Argoptochus Weise.*

bisignatus Germ. Klausenburg (Bielz).

bifoveolatus Stierl. Schulergebirge (besonders auf einer Umbellifere, Deubel, c. a.).

subsignatus Boh. Mezőség (Gyöke, Méhely). (Henschia.)
peritelooides Fuss. Gross-Scheuern, Marjol, Mezőség (Záh, Bielz); Stolzenburg (Ormay); Schässburg (Scheuerenberg im Juni gekötschert (c. a.); Håtszeg (Deubel).

915. *Phyllobius Schönh.*

glaucus Scop. (calcaratus F.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.
urficae Degeer. Håtszeg, Retjezat, Kerzer Gebirge, Szombat, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Dees, Gyöke (Bielz); Hermannst. (Ormay); Schässburg, Malomvitz (c. a.).
var. **nudus** Westh. Kronstadt.
transylvanicus Stierl. Paringul, Frecker Gebirge (Serbota), Schuler-Gebirge, Bucsecs, Borszék, Balánbánya (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).
pilicornis Desbr. Rotenturm (Ormay, von Nussbäumen); Håtszeg, Schässburg c. a.).
hungaricus Stierl. Rotenturm, Schässburg (c. a.).
piri L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.
contemptus Stev. Fogarasch (Bielz).
incanus Gyllb. Gross-Scheuern, Mediasch (Bielz); Hermannst. (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
scutellaris Redtb. Klausenburg (Bielz); Hermannstadt (a. Bg., c. a.); Kronstadt (Deubel).
alpinus Stierl. Bucsecs, Rodnagebirge (Korronjis, c. a.).
maculicornis Germ. Kerzer Gebirge, Fogarasch (Bielz); Zalatna, Szováta (c. a.); Kronstadt (Deubel).
argentatus L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
a. **viridans** Boh. Hermannstadt (Ormay).
psittacinus Germ. Kronstadt (Deubel).
aurifer Boh. (breviatus Desbr.). Håtszeg, Schässburg, Marienburg bei Sch., Héviz (c. a.); Kronstadt (Deubel).
lateralis Reiche. Kronstadt (Zinne, Deubel).
betulae F. Håtszeg, S.-Regen, Dees (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
a. **irregularis** Boh. Schässburg (c. a.).
oblongus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, auf Obstbäumen, namentlich Zwetschen und Pflaumen, häufig.
pictus Stev. Klausenburg (Bielz).
sulcirostris Boh. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
viridicollis F. Präsbe, Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm, Schanta (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Borszék, Rodnagebirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

poronae Oliv. Rotberg, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Rotenturm (Ormay); Klausenburg (c. a.).
viridiaeris Laich. Zibinsgebirge (Bielz). (Pseudomyllocerus.)
cinerascens F. Zibinsgeb. (Bielz); Schässburg (c. a.).
sinuatus F. Klausenburg (c. a.).

Brachyderinae.

916. *Polydrosus Germ.*

Bielz führt einen *P. croaticus* Stierl., der sich in keinem Kataloge vorfindet, für Kronstadt an. (Metallites.)

impar Gozis. Rodnagebirge (Deubel, c. a.). (Chlorodrosus.)

amoenus Germ. Zool. Kerzer Geb., Hartigita (Bielz); Rodnagelbirge, Borszék, Paringul, Frecker Geb. (Serbota, c. a.); Bodzagebirge (Deubel). (Eupinus.)

mollis Stroem. Durch das ganze Berg- und Hügelland auf Gesträuch. (Thomsoneonymus.)

sericeus Schall. Håtszeg, Götzemberg, Rotenturm, Gross-Schenk, Bucsecs, Mediasch, Schässburg (Bielz); Kronstadt (Deubel). (Thomsonius.)

thalassinus Gyll. Fogarascher Gebirge (c. a.). (Eustolus.)

flavipes Deg. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay). (Thomsonius.)

confluens Steph. Neudorf b. H., Mediasch, Schässburg (Bielz); Hermannstadt, Stolzenburg (Ormay); Hammersdorf (auf Kleearten, c. a.).

Bielz führt auch *P. chrysomela* Oliv. für Klausenburg an, doch dürfte hier ein Irrtum vorliegen, da die Art dem westlichen und südwestlichen marinen Gebiete angehört.

cervinus L. Zibinsgebirge, Hosszuvalu, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Schässburg, Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel). (Polydrosus i. sp.)

tereticollis Deg. (undatus F.). Durch das ganze Berg- und Hügelland in Wäldern auf Gesträuch. (Tylodrosus.)

ruficornis Bonsd. Rotenturm (c. a.); Zernest, Kronstadt, Rosenau (Deubel). (Tylodrosus.)

picus F. Durch das ganze Gebiet auf Gesträuch. (Tylodrosus.)

pterygomalis Boh. Håtszeg, (Götzemberg?), Szombat, Kronstadt, Előpatak, Mediasch, Schässburg, Dees, Mezőség (Záh, Bielz). (Tylodrosus.)

subalpinus n. sp. Csukás, Rodnagebirge. Polydrosus (Tylodrosus) **subalpinus**. *P. pterygomali* Boh. simillimus, sed magis elongatus, angustior, magis parallelus, minus convexus, im-

primis antem forma clavae antennarum elongata diversus. Länge 4¹/₂ mm. 3 Exemplare.

Dem P. pterygomalis Boh. ausserordentlich ähnlich, aber deutlich flacher, gestreckter und mit mehr parallelen Seiten. Behaarung und Ebeschupfung wie bei diesem, erstere auf dem Kopfe und Halschilde weniger lang. Fühler und Beine gelb. Das sicherste Unterscheidungsmerkmal jedoch bildet die Fühlerkeule der schlanken Fühler, welche deutlich gegliedert und wesentlich gestreckter, etwa viermal länger als dick ist, während dieselbe bei P. pterygomalis höchstens dreimal länger als dick ist.

Die Punktstreifen der Flügeldecken sind bei zwei Exemplaren ebenso fein wie bei pterygomalis, beim dritten Exemplar erscheinen die Flügeldecken etwas stärker punktiert gestreift, wodurch sich die Art dem P. caucasicus nähert; doch ist bei allen drei Exemplaren die abstehende gelbweisse Behaarung ebenso lang und aufrecht wie bei P. pterygomalis.

corruscus Germ. Hátszeg, Grossscheuern, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Michelsberg (Ormay); Salzburg, Nagyenyed, Klausenburg (c. a.).

viridicinctus Gyllh. Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Baassen, Előpatak, Nussbach (c. a.).

917. *Stasiodes Gozis.*

parvulus F. Oberkomana (Méhely).

918. *Sciaphobus Daniel.*

barbatulus Germ. Hátszeg (Bielz, c. a., in einem Kleefeld gekötschert).

caesioides Hampe. Schässburg, Baassen, Präszaka (Zalatna, von Steinklee? geklopft, c. a.); Gyógy (Bad, Ormay); Dees (Aléhely); Kronstadt (Deubel).

var. **Merkli** Stierl. Karlsburg, Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

squalidus Gyll. Mediasch (Bielz); Karlsburg, Baassen, Schässburg (auf Obstbäumen, Ahorn, Schlehen etc. Schädling, c. a.); Nagylak (Unterweissenburger Komitat), Remete (Nagyenyed, Ormay).

919. *Scythropus Schönh.*

mustela Herbst. Zibinsgebirge, Talmatschel (Bielz).

920. *Chilouenus Schönh.*

setosulus Germ. Gross-Scheuern, Girelau, Marpod, Mezőség (Gyeke, Bielz); Hátszeg (Deubel).

921. *Sciaphilus Stephens.*

Bielz führt für Siebenbürgen auch Sc. costulatus Kiesenw. an, was wohl auf einem Irrtum beruht.

asperatus Bonsdorf (muricatus F.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, unter Laub.

922. *Paophilus Faust.*

Hampei Seidl. Hammersdorf, Hermannstadt, Marpod, Freck, Porumbach, Fogarasch, Schässburg, Klauseburg (Bielz).

afflatus Boh. Siebenbürgen (Besitzt gelbe Schienen und Tarsen, bei Hampei sind sie schwarz).

923. *Brachysomus Stephens.*

(*Platytaurus Schönh.*)

Unaufgeklärt bleibt Br. Hopffgarteni Tourn welchen Bielz für Siebenbürgen anführt.

transylvanicus Seidl. Hermannst., Heltau, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Rotenturm (Ormay); Schulergebirge, Alsó-Rákos, Schässburg, Előpatak (c. a.).

setiger Boh. Kronstadt, Kronstädter Gebirge (Bielz); Rotenturm (Ormay); Ilátszeg, Előpatak, Schässburg (c. a.).

villosulus Germ. Hammersdorf (Bielz); Kalán, Karlsburg, Schässburg, Vajdahunyad (unter den Weingärten aus alten Rebenhäufen gesiebt).

hirtus Boh. (setulosus Boh.). Gross-Scheuern, Marpod, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Gyógy (Bad, Ormay); Hammersdorf, Alsó-Rákos, Schässburg, Hátszeg (c. a.).

echinatus Bonsd. Gross-Scheuern, Fogarasch, Előpatak, Schässburg (Bielz); Alsó-Rákos (c. a.); Rotenturm (Ormay); Kronstadt (Deubel).

Zellichi Formanek. Karlsburg (c. a.).

hispidus Redtenb. Gross-Scheuern, Hammersdorf (Bielz); Hátszeg, Schässburg (c. a.); Schuler (Deubel).

924. *Pseudoptochus Formanek.*

aurohirtus Seidl. Hermannstadt (Ormay).

925. *Foucartia Duval.*

squamulata Herbst. Hermannstadt, Klausenburg (Bielz).

926. *Barypithes Duv.*

globus Seidl. (♂ sphaeroides Seidl.). Klausenburg (Bielz); Rotenturm (aus dem Wurzelwerk einer Labiate (Melissa) gesiebt, c. a., Ormay).

armiger Dan. Hammersdorf (unter Laub, c. a.); Wolkendorf b. Kr., Kronstädter und Rosenauer Gebirge, Alsó-Rákos (Tepe, Deubel).

Chevrolati Boh. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge (Bielz); Gyógy (Bad, Ormay).

Da Bielz und Ormay den nahe verwandten B. armiger Dan. nicht kannten, ist es sehr wahrscheinlich, dass B. Chevrolati bei uns gar nicht, sondern nur ersterer vorkommt.

molicomus Ahr. Kronstadt (Bielz).

927. *Orias Schönherr.*

Hanaki Friv. Schässburg, Rodnagelbirge (c. a.).

var. montanus n. v. Borszék, Ratosnya, Baláubánya (Egeskő, c. a.).

O. Hanaki v. **montanus** n. v. Bei der Varietät, die ich in etlichen 40 Exemplaren sammelte, sind an sämtlichen Tarsen zwei sehr ungleiche Krallen bald mehr, bald weniger deutlich zu beobachten. Da diese Varietät im Penistau mit Omias Brandisi Apfels. übereinstimmt, liegt die Vermutung nahe, dass letzterer nur eine Kasse des O. Hanaki sei, da meine Tiere sich im übrigen von der Stammform wenig unterscheiden.

mollinus Boh. Paringul, Rodnagelbirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

pyrorhinus Dan. Hermannstadt (Ormay).

maxillosus Petri. Schässburg, Karlsburg.

Szováta, Prászka (Zalatna), Topánfalva (c. a.).

928. *Strophosomus Stephens.*

melanogrammus Forster (coryli F.). Durch das ganze Gebiet auf Gebüsch und unter Laub.

(Neliocarus.)

lateralis Payk. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt (Bielz).

929. *Eusomus Germar.*

ovulum Germ. Durch das ganze Berg- und Hügelland.

930. *Mesagroicus Schönh.*

obscurus Boh. Hátseg, Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Holzmengen, Fogarasch, Meliasch, Schässburg (Bielz); Rotenturm, Stolzenburg (Ormay); Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

931. *Sitona Germar.*

cambricus Steph. Neudorf b. II. (Bielz).
regensteinensis Herbst. Reps, Bükszad (Bielz).

tibialis Herbst. Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Bükszad, Schässburg, Oláhsalu (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Előpatak, Rodnagel., Karlsburg (c. a.); Schulergebirge (Deubel).
a. **umbiguus** Gyll. Előpatak, Hermannstadt, Oláhsalu, Bükszad, Schässburg, Borszék, Rodnagelbirge (c. a.).

elegans Stierl. (nec Gyll. Flecki Csiki), Schässburg (Siechenberg, 2. April, c. a.).

Sitona elegans Stierl. (Flecki Csiki). Diese Art sammelte ich in fünf Exemplaren unter Laub. Sie ist sicher zu unterscheiden von S. tibialis Ilbst. Der Kopf ist stets wesentlich kleiner, schmäler, mit den Augen kaum breiter als der Halsschildvorderrand; die Stirne ist deutlich vertieft, bei tibialis flach und in einer Ebene mit dem oberen Augenrand, bei dieser Art überträgt der obere Augenrand deutlich die Stirne. Der Rüssel ist schmäler und

besitzt auf der Spitzenhälfte eine glänzende, in der Mitte fein punktierte und gekielte Area, welche bei tibialis kleiner, grob punktiert und ungekielt ist. Die Flügeldecken sind an den Seiten parallel oder (") schwach nach hinten verengt, die Schultern eckiger, schärfer vortretend, die Punktstreifen feiner, weniger vertieft und viel feiner punktiert, die Zwischenräume flach, die Schuppen der Flügeldecken wesentlich feiner, gleichmässiger und dichter verteilt, weisslich oder schmutzig weiss, schwach metallisch, auf dem vierten Zwischenraume und seitlich wenig dichter und heller. Die Beine gelb, die Schenkel wenig dunkler.

Der Vorderrand der Vorderschenkelhöhle ist nur undeutlich von der Halsschild einschnürung getrennt.

lineatus L. Gross-Scheuern, Fogarasch, Schässburg Bielz; Hermannstadt, Hammersdorf, Szamosujvár (Ormay); Előpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel).

suturalis Steph.

a. **elegans** Gyllh. Kronstadt (Deubel).

a. **lateralis** Gyllh. Hátseg, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak Bielz; Hammersdorf (Ormay); Unter-Kerz (c. a.); Zaizon, Vargyas (Deubel).

sulcifrons Thunberg.

Bei uns kommt S. sulcifrons Thunbg. in der Stammform mit flacheren Augen und vertiefter Stirne nicht vor; Herr Dr. Krauss aus Marburg hebt als Unterschied von sulcifrons nur die stärker gewölbten Augen hervor, erwähnt jedoch die ganz ebene Stirne nicht, welche bei belgischen, böhmischen, auch noch ungarischen Stücken tief ausgehölt ist und zur Benennung Anlass gegeben hat. Uebrigens halte auch ich die siebenbürgischen Tiere nur für eine scharf ausgeprägte Varietät. Unausgefärbte Stücke sind ganz rötlichgelb. Weissgefleckte Tiere, welche die a. campestris Herbst vertreten, kommen auch vor; ich schlage für diese den Namen a. pictus vor.

var. Deubeli Krauss. Fogarasch, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Gyógy Bal, Ormay; Petrozsény, Előpatak, Oláhsalu (c. a.).

a. **pictus** m. Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.).

puncticollis Steph. Gyéke (Méhely); Puj (Hátseg, c. a.); Kronstadt (Deubel).

flavescens Marsh. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

a. **cinnamomeus** All. Kis-széki tó (Méhely).

longulus Gyll. Puj bei Hátseg, Unter-Kerz, Zalatna (c. a.).

lineellus Bonsl. Gross-Scheuern, Bükszad, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Előpatak, Rodnagelbirge (c. a.).

Waterhousei Walton. Hermannstadt (Seiditz); Karlsburg (c. a.); Hátseg, Kronstadt (Deubel).

erinitus Ilbst. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt (Bielz); Karlsburg, Unter-Kerz (c. a.).

a. **albescens** Steph. Schässburg (c. a.).

hispidus F. Girelau, Kronstadt, Tarlau, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Hammersdorf, Tordaer Schlucht (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

- a. *tibielus* Gyll. Gross-Scheuern, Michelsberg, Holzmengen, Kronstadt, Reps, Schässburg (Bielz).
cylindricollis Fahr. Schässburg (Siechhofberg, c. a.).
a. *varians* Desbr. Unter-Kerz (c. a.).
humeralis Steph. Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, Oláhfalu, Gyéke, Záh, Előpatak (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hammersdorf (c. a.).
a. *maculatus* Motsch. Kronstadt (Méhely); Nussbach, Előpatak, Schässburg (c. a.).
inops Gyll. Gyéke, Záh (Bielz); Hermannstadt, Schässburg (c. a.).

932. *Trachyphloeus Germar.*

- parallelus* Seidl. Schässburg, Marosujvár (c. a.).
laticollis Boh. Schässburg (vidi).
alternans Gyll. (scaber Redtenb.). Schässburg, Toroczkó, Baassen (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Erösd, Kronstadt, Hátszeg (Deubel).
spinimanus Germ. Hermannstadt, Kronstadt, Birthálm (Bielz); Schässburg (c. a.); Talinenberg, Zinne, Deubel).
seabriulus L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Oláhfalu, Sächs.-Regen (Bielz); Michelsberg, Rotenturm (Ormay).
ventricosus Germ. Schässburg (3 Exempl. am Wieterberg, 1. März und im Juni. c. a.); Karlsburg (von Hauptmann Zellich, Deubel).
bifoveolatus Beck. (scaber aut., nec L.). Gross-Scheuern, Holzmengen, Reps, Schässburg, S.-Riegen (Bielz).
aristatus Gyll. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Porumbach (Bielz); Schässburg, Alsó-Rákos, Oláhfalu, Borszék, Előpatak, Unter-Kerz, Frecker Geb. (c. a.); Erösd, Kronstadt (Deubel).
Olivieri Bedel (squamulatus Oliv.). Hermannstadt (Bielz).

933. *Psalidium Illiger.*

- maxillosum* F. Déva, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Meliasch, Reps, Záh (Bielz); Nagylak (Unterweissenburger Komitat), Szamosujvár (Ormay); Hammersdorf, Hátszeg, Karlsburg, Kalán (c. a.).

Cneorrhiniinae.

934. *Liophlocus Germar.*

Die für Siebenbürgen angeführten Arten dieser Gattung bedürfen sehr der Revision. Um diese anzubahnen, gebe ich im folgenden eine kurze Uebersicht der mir bekannt gewordenen Arten:

Nach dem in meiner Sammlung befindlichen Material besitzen wir wohl nur drei Arten. Zunächst scheint L. Schmidtii Boh. unserer Fauna fremd zu sein, in Schässburg wenigstens kommt er nicht vor, und wenn nach Seidlitz L. Herbsti und obsequiosus Synonyme des L. gibbus sind,

was ich für wahrscheinlich halte, L. lento Germ. unseres Verzeichnisses aber mit L. liptoviensis Ws. identisch ist, den ich nur als die Gebirgsform des L. gibbus anffassen kann, da sich stichhaltige Unterschiede nicht vorfinden, so reduziert sich die Zahl unserer Liophloens-Arten, einschliesslich der neuen, vielleicht guten Art, auf drei Arten mit vier Varietäten. Dieselben lassen sich nach folgender Uebersicht aneinander halten:

1. Melasternum zwischen den Mittelhüften fast so breit wie die Mittelhüften, Körper gestreckt, länglich eiformig oder länglich, Flügeldeckenbasis stets gerade abgestutzt, Schultern fast rechtwinklig vortretend, aber abgestumpft. Oberseite dicht mit gelben und brauen, oft etwas metallischen ziemlich grossen Schuppen fleckig bekleidet. *tesselatus* Müll.

Oberseite etwas glänzend, mit kleinen, wenig bemerkbaren, grauen Schuppen, die nur ein Drittel so gross sind als bei tesselatus, ziemlich undicht gepunktet, so dass das matt glänzende Tegment überall sichtbar wird; Flügeldecken kürzer, seitlich weniger gerundet.

aquisgranensis Först. L. aquisgranensis dürfte identisch sein mit S. chrysopterus Friv. oder ihm sehr nahe stehen.)

Oberseite durchaus matt, fein und dicht granuliert, mit ebenso kleinen aber dunkelbraunen Schüppchen sparsam bekleidet.

var. *maurus* Marsh. Metasternum wesentlich kürzer als die Mittelhüften, Körper gedrungen, kurz eiformig.

2. Flügeldecken an der Basis mehr-weniger tief ausgerandet, Stirne stets deutlich dicht, oft runzlig punktiert, Halsschild quer, 1¹/₂ bis doppelt so breit als lang, an den Seiten stets deutlich gerundet, nach vorne stärker als nach hinten verengt, zuweilen mit seichter Mittelfurche, nie gekielt.

Stirne mit kleinem, strich- oder punktförmigem Grübchen, Flügeldecken dicht mit heller und dunkler brauen oder grauen, selten einfarbig grauen oder grauweissen Schuppen bekleidet, Rüssel mehr-weniger deutlich fein gekielt oder ungekielt, an der Spitze halbkreisförmig eingedrückt, der Eindruck kahl und ungebekt. Form des Berg- und Hügellandes.

gibbus Boh. Oberseite sparsam mit dunkelgrauen oder bräunlichen Schuppen bedeckt, so dass die Grundfarbe sichtbar wird, Halsschild im allgemeinen etwas schmäler, Gebirgsform. Die Tiere vom Retjezat haben in der Regel runzlig punktierte, matte, die vom Schnellgeorgfeige und Fogarascher Gebirge glänzender, aber stets dicht und deutlich punktierte Stirn. var. *Jiptoviensis* Weise.

Beschuppung und Punktierung der Stirne wie beim vorigen, aber letztere tief gefurcht. Rüssel mit glatter Mittellinie, die kaum erhoben ist, ♂ sehr robust, die Schienen der Vorderbeine sehr breit, am basalen Viertel plötzlich verengt, im breiten Teile innen gerade, Vordertarsen aussergewöhnlich stark erweitert.

Flügeldecken an der Basis gerade abgestutzt, breiter als der Halsschild. Die Schnitern seitlich ziemlich scharf vortretend, Rüssel kaum länger als der Kopf, der Länge nach mit der Stirne in einer Flucht gewölbt, die Stirne mit rödlichem Grübchen, wie lackiert glänzend, außerordentlich fein und ziemlich zerstreut punktiert, ebenso die Rüsselbasis. Augen vollkommen flach, aus der Wölbung des Kopfes nicht hervortretend. Halsschild quer, etwa 1¹/₂ breiter als lang, an den Seiten etwas gerundet, nach vorne wenig stärker als nach hinten verengt, hinter dem Vorderrande schwach eingeschnürt mit feiner seichter Mittelfurche. Flügeldecken mit wenig auffallenden gelbbräunen, etwas metallisch schimmernden Schuppen bedeckt. Im übrigen dem L. liptoviensis ähnlich.

laevifrons n. sp. *tessellatus* Müll. Hátszeg (Retjezat), Götzemberg, Hammersdorf, Kerzer Gebirge?, Kronstadt, Előpatak, Mediasch, Schäss-

burg, S.-Regen, Gyeke, Záh (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay).
 var. *aquisgranensis* Först. Schässburg, Tordaer Schlucht (c. a.).
 var. *maurus* Marsh. (^{c.} *amplipennis* Tourn.) Kronstadt (Zinne, Méhely).
Schmidti Boh. Ilomoród (Méhely).
Herbsti Gyllh. Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Schenk, Kerzer Gebirge (?), Fogarasch, Kronstadt, Hosszuvalu, Tartlau, Mediasch, S.-Regen, Borszék, Dees (Bielz); Rotenturm, Schanta (Ormay).
obsequulosus Gyll. Fogarasch (Bielz).
lentus Germ. Hátszeg, Retjezat (?), Neppendorf, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Dees (Bielz).
gibbus Boh. Malomvitz, Rotenturm, Hermannstadt, Schässburg (c. a.); Nagy-hagymás (Deubel).
 var. *liptoviensis* Weise. Kerzer Gebirge, Frecker Gebirge (Serbota), Schulergebirge, Borszék (c. a.).
 var. *suleifrons* n. Rodnagébirge (Deubel \circ , c. a.).
laevifrons n. sp. Bucsecs (c. a.).

935. *Barynotus Germar.*

obseurus F. (*murinus* Bonsd.). Hermannstadt, Tömiöcher Pass, Mediasch (Bielz); Schässburg (Fuchsloch, Hecke unter Blättern, 15. Mai, c. a.); Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay); Harrita, Zinne bei Kronstadt (Deubel).

Tanymacinae.

Amomphini.

936. *Thylacites Germar.*

pilosus F. Schässburg (Breite und Wietberg, 13. April, gesiebt, c. a.); Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Tahnenberg bei Petersberg (Deubel).

937. *Chlorophanus*.

gibbosus Payk. (*pollinosus* F.). Schässburg (auf Weiden, Kokelufer, c. a.).
viridis L. Hátszeg, Hermannstadt, Freck, Fogarasch, Kronstadt, Dees (Bielz); Malomvitz, Retjezat, Ujszékely (b. Sch.); Paringul (c. a.).
 a. *salieola* Germ. Hátszeg, Hermannstadt, Neppendorf, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Dees, Klausenburg (Bielz); Retjezat (c. a.).
gramineola Gyll. Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Nagy-Ajta, Baróth (Méhely); Unter-Kerz, Karlsburg, Ujszékely (b. Sch.), Hátszeg (c. a.).

Tanymecini.

938. *Tanymecus Schönh.*

pallatus F. Durch das ganze Berg- und Hügelland (auf Brennessel).

Brachycerinae.

939. *Brachycerus*.

foveicollis Gyll. Mezőség (Gyeke, Bielz).

Cleoninae.

Leprini.

940. *Lepyrus Germar.*

palustris Scop. (*colon* L.). Durch das ganze Berg- und Hügelland auf Weiden an süßen Gewässern.

a. *asperatus* Schauf. (Herbichi Zawodsky). Bolzaer Gebirge und Baróth (Méhely).

capucinus Schall (*binotatus* F.). Wie der vorige verbreitet.

Cleonini.

941. *Leucosomus Motschulsky.*

pedestris Poda (*l-punctatus* Schrank.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

942. *Coniocleonus Motschulsky.*

glaucus F.

a. *turbatus* Fahr. Fogarasch (Bielz). Schässburg ist irrtümlich als Fundort dieser Art angegeben.

exoriatus Gyll. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Fogarasch, (Bielz); Kronstadt (Rakadó, Deubel).

nigrosuturatus Goeze (*obliquus* F.). Mühlbach, Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Gyeke, Záh (Bielz); Maros-Ludas (Ormay); Karlsburg (c. a.); Alsó-Rákos (Deubel).

943. *Stephanocleonus Motschulsky.*

microgrammus Gyll. Klausenburg (Bielz).

Das Vorkommen dieser Art bei uns erscheint mir sehr fraglich, da sie dem südöstlichen Russland angehört; ich besitze dieselbe aus Uralsk.

944. *Pachycerus Schönh.*

madidus Oliv. (*segnis* Germ.). Gross-Scheuern, Gyeke, Záh (Bielz); Kronstadt (Deubel).

945. *Bothynoderes Schönherr.*

albieans Gyll. Klausenburg (Bielz, c. a.); S.-Regen (Zsabenitzta ?, Bielz).

punctiventris Germ. Déva, Salzburg, Dees Záh (Bielz).

946. *Mecaspis Schönh.*

- alternans** Herbst. Hermannstadt, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Kronstadt, Salzburg (Deubel).
caesus Gyll. Schässburg, Baassen, Hammersdorf (c. a.).
 M. alternans Herbst. und caesus Gyll. sind oft schwer von einander zu trennen. Nach der weitläufigen Punktfüllung der Flügeldeckenstreifen und der Zeichnung der Flügeldecken dürfte M. alternans Herbst bei uns gar nicht vorkommen.
striatellus F. (coenobita Oliv.). Hammersdorf (Bielz); Schässburg (c. a.); Persaner Gebirge, Zernest, Kronstadt (Deubel).

947. *Pseudocleonus Chevrolat.*

- cinereus** Schrank. (costatus F.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Gyeke, Záh (Bielz); Pilis (Nagyenyel), Karlsburg, Marosujvár (c. a.).
grammicus Panz. Kronstadt (Kreuzberg, 4. April, Deubel).
 Ps. grammicus Panz. kommt in Schässburg nicht vor; die Angabe beruht auf einer Verwechslung mit einem abgeriebenen Ps. cinereus.

948. *Chromoderus Motschulsky.*

- fasciatus** Müll. (affinis Schrank). Hászeg, Mühlbach, Hermannst., Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen, Záh (Bielz); Karlsburg (c. a.).

949. *Cyphocleonus Motschulsky.*

- tigrinus** Panz. Mühlbach, Gross-Schenk, Mediasch, S.-Regen, Klausenburg, Záh (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm, Nagyenyed, Szamosujvár, Örményszékes (Unterweissenburger Komitat, Orma); Kronstadt (Deubel).
achates Fahr. Siebenbürgen (Seillitz).
morbillosus F. Kronstadt (Bielz).
trisulatus Herbst. Kronstädter Gebirge, Königstein, Schässburg (Bielz); Szurduk-Pass (c. a.).

950. *Adosomus Faust.*

- coridus** Pall. (Fabricii Gemming). Hászeg, Reps (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).

951. *Cleonus Schönh.*

- piger** Scop. (sulcirostris L.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

952. *Lixus Fabricius.*

- Ormay führt für Siebenbürgen L. sanguineus Rossi und Bielz, L. elongatus Germ. = fasciculatus Boh. an; ersterer soll bei Remete (Nagyenyed), letzterer in Klausenburg gesammelt worden sein. Ich halte das Vorkommen beider Arten bei uns für nicht wahrscheinlich.

- paraplecticus** L. Reussner Teiche, Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Gyeke, Záh (Bielz, auf Wasserpflanzen).

- canescens** Fischer. Hammersdorf, Gross-Schenern (Bielz, auf crambe tartarica); Mező-Záh (Deubel).

- iridis** Oliv. Hászeg, Hermannstadt, Gross-Schenern, Hammersdorf, Fogarasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Klausenburg, Karlsburg (Larve lebt in den Wurzeln und Stengeln einer Umbellifere, c. a.); Mező-Záh, Honigberg (am Alftfluss, Denbel).

- myagri** Ol. Hermannstadt, Holzmengen (Bielz); Schässburg, Karlsburg (c. a.); Reps 1908 (Denbel).

- subtilis** Sturm. Schässburg, Dees (c. a.).

- difficilis** Cap. (costirostris Seidl., trans-sylvanicus Tourn., Bielz). Hermannstadt (a. B.), Hammersdorf (c. a.).

- cylindricus** L. Hermannstadt, Hammersdorf (Bielz).

- Ascanii** L. Déva, Gross-Schenern, Kronstadt, Dees (Bielz); Karlsburg, Schässburg (c. a.).

- flavescens** Boh. Karlsburg Deubel, c. a.); Klausenburg, Baassen, Schässburg (auf Melde, c. a.).

- punctiventris** Boh. Schässburg (am Scheuerenberg 1 ♀ gekötschert, 23. Mai, c. a.).

- algitrus** L. Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Dees, Gyeke (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg (c. a.); Torda (Deubel).

- elongatus** Goeze (filiformis F.). Auf Disteln durch das ganze Berg- und Hügelland.

- cardui** Oliv. Mit dem vorigen durch das ganze Berg- und Hügelland.

953. *Larinus Germar.*

- vulpes** Oliv.

- var. **orientalis** m. Baassen (c. a., 1 ♂). Mező-Záh (Denbel).

Als Stammform des L. vulpes Ol. sind Tiere aus Frankreich zu betrachten: Gyllenb. sind bei der Beschreibung seines L. reconditus Weibchen aus Frankreich vorgelegen (Schönh. 7. 2. 19), was hervorgeht aus „rostrum longitudine fere thoracis“, während er bei der Beschreibung seines L. maculosus (Schönh. III. 112) ♂ aus Frankreich, dem südlichen Russland und dem Kaukasus vor sich gehabt; dies beweisen die Worte „rostrum thorace brevis“. Die Vergleichung der französischen vulpes mit denen des südöstlichen Europa und aus Siebenbürgen ergeben einige erwähnenswerte Verschiedenheiten, welche mir genügend erscheinen für diese den Varietätsnamen L. v. orientalis in Vorschlag zu bringen. Durchschnittlich sind die osteuropäischen Tiere grösser, breiter, etwas weniger gewölbt, namentlich auf dem Halsschild; dieser ist etwas kürzer, stärker, runzlig punktiert und unebener; die Unebenheiten entstehen namentlich in der Mitte durch eine stark abgekürzte Mittelgrube hinter dem Vorderrande, die in der Regel im Grunde fein gekieft, oft aber auch obsolet ist, zwei Längsgruben zu beiden Seiten der Mittellinie auf der Scheibe, die aber auch undeutlich werden können. Die Flügeldecken sind an der Basis zu beiden Seiten des Schildchen tiefer quer eingedrückt und die Tomentierung ist weniger zusammenhängend und mehr in einzelne Flecken aufgelöst. Gyllenhal in seiner

Beschreibung des *L. maculosus* bezeichnet die Zeichnung desselben treffend: „Elytra — — tomento flavescente variegato, vittam valde flexuosa in sinuoso elytro formante.“ Die zusammenhängende, binenartige Zeichnung ist bei der Varietät undeutlich geworden durch Auflösung in Flecken.

brevis Herbst. Poresest, Szurul (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Nagyhagymás (Deubel).

var. *granicollis* Boh. Schässburg (c. a.).

Da diese Varietät auch in Dalmatien und Ilyrien vorkommt, ist es sehr wahrscheinlich, dass *L. pollinis* Germ. (Ins. spec. I. p. 388-533) und Laich. (Tyr. Ins. I. p. 220-21) identisch mit *granicollis* Boh. ist umso mehr, da Germar den *L. sturnus* Schall. kannte, die Worte „macula setulari grisea“ auch auf diese Art passte, und „rostro thoraci subaequali“ etwa auf ♀ dieser Varietät noch angewendet werden kann.

latus Herbst. Kronstadt, S.-Regen, Klausenburg, Fogarasch (Bielz).

L. cynarae F. wird von Bielz für Kronstadt, Sächs.-Regen und Klausenburg angeführt, jedenfalls irrtümlich; dafür dürfte *L. latus*, der oft schwer von *L. cynarae* F. zu trennen und im südöstlichen Europa verbreitet ist, auch in Siebenbürgen verbreitet sein, obgleich er mir aus Siebenbürgen nicht vorliegt. Ich beziehe die Fundorte des *cynarae* auf *latus*, bis das Vorkommen des *L. cynarae* erwiesen ist.

obtusus Gyllh. Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Girelsau, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Götzemberg, Oláhsfalu, Gyeké (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Puj (Hátszeg), Rotenturm, Frecker Geb. (Leita), Schässburg, Baassen (c. a.); Zernest (Deubel).

minutus Gyll. Siebenbürgen (Bielz).

Ich führe diese Art mit einem Zweifel an, obgleich Bielz keinen bestimmten Fundort angibt; doch halte ich ihr Vorkommen bei uns nicht für ausgeschlossen.

turbanatus Gyllh. Mezőség, Záh (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Schässburg, Baassen, Balánbánya Puj (Hátszeg, c. a.); Kronstadt (Deubel).

sturnus Schall. Hermannstadt, Hammersdorf, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Michelsberg (Ormay). Déva, Klausenburg, Dees, Bistritz, Rodnagelirge, Balánbánya (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

planus F. (carlinae Oliv.). Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Baassen (c. a.); Kronstadt, Zernest (Deubel).

jaceae F. Hermannstadt, Hammersdorf, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Maros-Décese (Torda), Szamosujvár (Ormay); Déva, Nagyenye (c. a.).

Beckeri Petri (ungulatus aut. nec Gyllh.). Karlsburg (von Herrn Major Zellich gesammelt, c. a.); Neuendorf, Mediasch, Dees Belz); Szamosujvár (Ormay).

L. longirostris Gyllh. kommt bei uns nicht vor, mir ist er nur aus den westlichen Mittelmeerlandern bekannt geworden, während *L.*

Beckeri nicht nur in Russland verbreitet ist, sondern mir seit dem Erscheinen meiner Bestimmungstabellen des Genus *Larinus* 1907 auch aus Ungarn (Acs) bekannt geworden ist (Vergl. Bestimmungstabellen des Gen. *Larinus* pag. 123 und 124).

954. *Lachnaeus* Schönh.

(*Stolatus* Mulsant.)

erinitus Boh. Karlsburg (von Hauptmann Zellich, Deubel).

955. *Rhinocyllus* Germ.

conicus Fred. (odontalgicus Oliv.). Hátszeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Fogarasch, Marktschelchen, Mediasch, Gross-Scheuern (Bielz); Karlsburg, Schässburg, Balánbánya (auf carduus acanthoides, c. a.); Kronstadt (Deubel).

Tropiphorinae.

956. *Tropiphorus* Schönherr.

micans Boh. Kronstadt (Bielz).

var. *obesus* Fauv. Szováta, Schässburg (c. a.); Tusnád, Alsó-Rákos (Deubel).

tomentosus Marsh. Zinne (Kronstadt, Deubel).

obtusus Bonsd. Fogarascher Geb., Kronstädter Gebirge, Bucees (Bielz).

earinatus Mull. Fogarascher, Frecker und Kronstädter Gebirge, Zibinsgebirge und Zilinsjäser, Götzemberg, Präsbe, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Tömöscher Pass, Mediasch, Birthälm, Rodnagelirge (Bielz); Retjezat, Topánfalva, Unter-Kerz (Klosterteich, c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

transsylvaniaicus Dan. (rotundatus Dan.). Frecker Gebirge (Serbota), Bucees, Schulergelbirge, Csukás (c. a.).

T. styriacus Bedel kommt in Siebenbürgen nicht vor, da das von Fauvel als *T. styriacus* bestimmte Männchen der Seiditz'schen Sammlung ebenfalls ein *T. transsylvaniaicus* ist.

Rhytiirrhininae.

Rhytiirrhiniini.

957. *Minyops* Schönherr.

carinatus L. Schässburg, Hermannstadt, Rotenturm (c. a.); Mezőség (Záh, Bielz), Hammersdorf, Honigberg, Kronstadt (Deubel).

var. *variolosus* F. Hátszeg, Hermannstadt, Marpod, Götzemberg, Predeal, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Rotenturm (Ormay, c. a.).

costalis Schönh. Hermannstadt, Schässburg, Pilis (Nagyenye), Kalán, Szurdok-Pass (c. a.).

958. *Dichotrachelus Stierlin.*

Unter Steinen, selten im Moos.

Kimakovicii Flach. Retjezat, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Paringul, Präsbe, Negoi, Bucsecs, Nagyhagymás (Deubel).

*Alophini.*959. *Alophus Schönh.*

triguttatus F. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

var. *vau* Schrank. Hammersdorf, Schuler, Crepatura bei Zernest (Deubel).

a. *Weberi* Penecke. Siebenbürgen.

a. *subcarinatus* Reitter. Schässburg, Rodnagebirge (c. a.).

a. *pseudelegans* Reitter. Schässburg, Karlsburg, Klausenburg. Hammersdorf (c. a.); Várhegy (Deubel).

Kaufmanni Stierlin. Retjezat, Hermannstadt, Hammersdorf, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

a. *Stierlini* Reitter. Porumbacher Geb. (Strunga dracului, Ormay).

a. *elegans* Stierl. Marosujvár (c. a.).

960. *Hylobius Schönherr.*

piceus Degeer. Biharer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Marosgebirge, Borgoer Pass (Bielz); Kronstadt (c. a.); Präsbe (bei dem Höhlenkloster), Bucsecs (Deubel).

abietis L. In unseren Gebirgen und im Bergland verbreitet.

pinastri Gyll. Kerzer Gebirge, Bistra, Szurduk-Pass (c. a.).

fatuus Rossi. Hermannstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Karlsburg (c. a.); Honigberg am Altfluss (Deubel).

var. *rugicollis* Mannh. Hermannstadt (Bielz, c. a.); Marosvásárhely (Bielz).

961. *Liparus Oliv.*

L. germanus L. wurde bis jetzt bei uns nicht gefunden, ebenso fehlt *L. dirus* Herbst; alles, was als *L. germanus* in den Sammlungen steckte, war *L. glabrirostris* Küst.; das, was als *L. dirus* Herbst angesehen wurde, war zum Teil *L. transsylvaniae* Petri. zum Teil abgeriebene *L. glabrirostris*.

glabrirostris Küster (carinaerostris Küster).

Durch das ganze Gebiet verbreitet.

coronatus Goeze. Zibinsgebirge, Schässburg (Bielz); Előpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel).

transylvanicus Petri. Karlsburg, Hosszufalu, Schässburg (c. a.); Hammersdorf, Vargas, Kronstadt (Deubel).

962. *Plinthus Germ.*

Meleus Lacordaire, Reitter.

In meiner Monographie der Gattung *Plinthus* habe ich nachgewiesen, dass unserer Fauna nicht angehören Pl. Megerlei, Pl. Findeli; dafür treten neu in unsere Fauna *Plinthus Parayssi* Boh. und Pl. Elekeschi Ormay.

Pareysyi Boh. Kronstadt, Rotenturm (c. a.).

Elekesi Ormay. Remete (Nagyenyed). Szamosujvár (Ormay); Schässburg, Dees (c. a.).

Sturmi Germ. In unsern Gebirgen und im Bergland verbreitet.

Tischeri Germar. In unsern Gebirgen und im Berglande verbreitet.

963. *Neopliuthus Bedel.*

figratus Rossi. Schässburg (c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel).

porcatus Panz. Zibinsgebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge, Schuleregebirge Bielz).

964. *Liosoma Stephens.*

Bielz führt auch *L. robustum* Seill. von der Hargita an, wo zu jedoch Seidlitz (F. tr. 672. Ann. 5) die Bemerkung macht, dass der Käfer nur aus Versehen in unser Verzeichniss gekommen sein könne.

deflexum Panz. (ovatum Clairv.). Retjezat, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen. Klausenburg Bielz.

oblongum Boh. Kronstadt, Schuleregebirge, Schässburg, Rodnagebirge (c. a.); Zernest (Deubel).

Bei den Vertretern dieser Art aus Siebenbürgen sind die seitlichen Punkt-Streifen der Flügeldecken schwach vertieft, während bei Exemplaren aus Görl die seitlichen Punkte der Flügeldecken nur gereift sind und nicht in Streifen liegen.

5 var. *Hopfgarteni* Stierl. Bistra, Malomiviz, Borszék (c. a.).

cribrum (yllh. Kronstadt Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Schässburg, Alsó-Rákos, Piatra mare (Méhely); Nagyhagymás (Deubel).

carpathicum Branae. Előpatak, Borszék (c. a.).

bosnicum K. Daniel. Csukás (c. a.); Rodnagebirge, Schuleregebirge, Zernester Gebirge, Zinne (Deubel).

965. *Aparopion Hampe.*

(*Stereus* aut. nec *Motschulskyi*.)

costatum Fahr. Michelsberg, Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm, Porumbacher Gebirge (Ormay); Hátseg, Karlshburg, Hammersdorf (c. a.).

966. *Adexius Schönh.*

scrobipennis Schönh. Kronstadt (Bielz); Rotenturm (Ormay); Hammersdorf, Szováta, Schässburg, Topánfalva (c. a.).

967. *Trachodes Germar.*

hispidus L. Präsbe, Holzmengen, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Borszék, S.-Regen Bielz; Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Retjezat, Hátseg, Schässburg, Alsó-Rákos, Büdös (c. a.).

Heydeni Stierl. Kronstadt (Bielz, c. a.); Retjezat, Schässburg (c. a.).

968. *Hypera Germ.*

H. oblonga Boh., die im Schieltal, segnis Cap., welche im Zibinsgebirge vorkommen sollen, die Stammform der *H. comata* Boh. sowie der *H. palumbaria* Germ. sind bei uns nicht nachgewiesen.

oxalidis Herbst. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

var. **ovalis** Boh. Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz); Kerzer Gebirge (Ormay); Schulergebirge, Balánbánya, Rodnaggeb. (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

intermedia Boh. Paringul, Schässburg, Rodnaggebirge (c. a.); Mediasch, Záh (Bielz); Kerzer Gebirge, Porumbacher Gebirge (Ormay); Bucecs (Deubel).

var. **marmorata** Cap. Karlsburg, Baassen, Rotenturm (c. a.); Zibinsgeb. (Bielz).

elegans Boh. Zibinsgebirge, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg (c. a.).

var. **Bonvouloiri** lap. Schässburg, Hammersdorf, Malomvitz, Bibargebirge (c. a.).

palumbaria Germ.

var. **coarcticollis** Krauss. Burzenländer Gebirg (Deubel); Borszék (c. a.).

comata Boh.

var. **biharica** Petri. Biharer Gebirge (c. a.).

var. **carpathica** Petri. Fogarascher Geb., Rodnaggebirge (c. a.).

velutina Boh. Schulergebirge, Borszék (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

rubi Krauss. Borszék (c. a.).

pusilla m. Kerzer Gebirge (Vunetoare), Rodnaggebirge (Kuhhorn, c. a.); Bucecs (Leonhardt, Blasewitz), Königstein, Nagyhagymás (Deubel).

H. pusilla n. sp. Länge ♂ 5 mm., ♀ 5.5 mm. Zur Vergleichung liegen mir vor 5 Stück des *H. rubi* Krauss vom Bachergebirge, von Dr. Krauss selbst determiniert.

Grösse konstant geringer als die des *H. rubi*, die Form schmäler und schlanker, der Halsschild stets und stärker nach hinten verengt, die Oberseite glänzender, die feine Punktierung nur schwach runzlig, besonders auf dem Halsschild, der Rüssel in beiden Geschlechtern kürzer, stärker gebogen und an der Basis durch eine tiefere Einsenkung von der Stürze getrennt, letztere merklich breiter, die punktiertgestreiften Flügeldecken sind in beiden Geschlechtern seitlich weniger stark erweitert, die Zwischenräume der Streifen gewölbt, gleichartig, der fünfte Zwischenraum bildet keine Schwiele vor der Spitze, während eine solche bei den steirischen Stückchen schwach, aber deutlich entwickelt ist.

Der Penis dieser Art ist fast symmetrisch, gleich hinter der Basis deutlich verengt, dann bis hinter die Mitte parallel, darauf gerundet verengt, der Apex ist abgerundet, nicht abgestutzt, der Seitenrand der Penisfurche an der Basis stärker und breiter nach innen umgebogen. Der Penis der *H. rubi* aus Steiermark ist von der Basis an allmählich zuerst schwächer, dann stärker verengt, deutlich asymmetrisch, der Apex schief abgestutzt, der Seitenrand der Penisfurche kaum eingebogen.

minuta Petri Rodnaggebirge (c. a.).

tessellata Herbst. Håtszeg (Bielz, c. a.); Hermannstadt (a. B.), Orlat (c. a.).

969. *Phytonomus Schönherr.*

(Antidonus.)

punctatus F. An Wasserpflanzen durch das ganze Gebiet.

fasciculatus Herbst. Máda (Erzgebirge, Bielz); Karlsburg (c. a.); Rothbach (Deubel).

(Eriirhinomorphus.)

adspersus F. (pollux F.). Talmatschel, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Szováta (c. a.); Honigberg (am Altfluss, Deubel).

rumicis L. Hermannstadt, Meiliach, Gyeke (Bielz); Stolzenburg, Kleinpold, Kerzer Gebirge (Ormay); Honigberg (am Altfluss Deubel).

arundinis Payk. Dobra (Bielz).

(Dapalius.)

striatus Boh. Fogarasch (Bielz).

contaminatus Herbst. Zibinsgebirge (Bielz).

Mir sind Ph. striatus Boh. und Ph. contaminatus Herbst aus Siebenbürgen nicht zu Gesicht gekommen, wohl verwechselt mit Ph. meles F. und denominandus Cap.

meles F. Durch das ganze Berg- und Hügelland auf Klee.

(Phytonomus i. sp.)

nigrirostris F. Håtszeg, Hermannstadt, Röberg b. H., Fogarasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf (c. a.); Nagyhagymás, Kronstadt, Vargyas (Deubel).

dentatus Petri. Rodnaggebirge (von Deubel gesammelt).

carinicollis Stierl. Kerzer Gebirge (Ormay); Paringul, Malomvitz (c. a.); Paj (Håtszeg, vidi).

a. **obscurus** Petri. Paringul (c. a.).

arator L. (*polygoni* L.). Unter-Kerz (c. a.).

pedestris Payk. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Mediasch, Sächs.-Regen, Gyeke (Bielz); Schässburg, Szováta, Bükszad (c. a.); Honigberg, Rosenau, Kronstadt (Deubel).

elongatus Payk. Schiedthal (Timpu micilui), Kronstadt (Bielz); Grossau (Ormay); Schässburg, Rodnaggebirge (Kuhhorn, c. a.).

denominandus Cap. Karlsburg, Bistritz Schässburg (Fuchsloch, 21. Mai gekötschert, c. a.).

murinus F. Héviz (Bielz); Honigberg (am Altfluss, Rosenau, Deubel).

Ich habe einen Ph. murinus F. aus Siebenbürgen noch nicht gesehen.

plantaginis Degeer. Håtszeg, Hermannstadt, Fogarasch, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Kronstadt, Karlsburg, Baassen, Rotenfurm (c. a.).

transylvanicus Petri. Durch das ganze Berg- und Hügelland, namentlich auf Klee.

Die in Siebenbürgen vorkommende, bisher allgemein als Ph. variabilis Herbst bezeichnete

Ptytonomus-Art weicht wesentlich von den südeuropäischen, namentlich den dalmatinischen Ptytonomus variabilis, die ich als Stammform betrachte, ab: der Halsschild ist in beiden Geschlechtern stark gerundet, der Rüssel stärker gebogen, die Flügeldecken kürzer beim ♂ von der Basis ab nach hinten verengt etc. Er erinnert oft stark an Ph. denominandus. Im übrigen siehe meine Monographie der Hyperiden p. 183.

viciae Gyllh. Neudorf b. H., S.-Regen (Bielz); Schässburg (vidi), Honigberg (am Altfluss, Deubel).

trilineatus Marsh. Hermannstadt, Fogarasch (Bielz); Hammersdorf, Grossau (Ormay); Nagyhagymás, Kronstadt (Deubel).

970. *Limobius* Schönherr.

borealis Payk. (dissimilis Herbst. Hampei Cap.). Gross-Scheuern, Zibinsgebirge, Szurul (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Honigberg am Altfluss (Deubel).

971. *Coniatus* Germar.

splendidulus F. Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

Erirrhininae.

Acentrini.

972. *Acentrus* Schönherr.

histrio Boh. Gross-Scheuern (Bielz).

Pissodini.

973. *Pissodes* Germ.

piceae Ill. Héviz (Bielz).

pini L. Kerzer Gebirge (Bielz); Retjezat (c. a.); Kronstadt (Deubel).

notatus F. Fogarascher Gebirge (Bielz); Kronstadt (Bielz, c. a.).

validirostris Gyllh. Talmalschel (Bielz); Bucecs (Deubel).

scabricollis Mill. Präsbé (Bielz).

harcyniae Herbst. Schuler (Deubel).

Erirrhiniui.

974. *Grypidius* Stephens.

equiseti F. Hátszeg, Hermannstadt, Marpol, Fogarasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes, Krizba (Deubel).

975. *Pachytychius* Jekel.

sparsutus Oliv. Mühlbach, Hammersdorf (Bielz); Hermannstadt, Michelsberg, Gyögy (Bad, Ormay); Hátszeg, Schässburg (auf einer Kleeart, c. a.); Kronstadt (Deubel).

976. *Erirrhinus* Schönh.

festucae Herbst. Gross-Scheuern, Zäh (Bielz); Baassen (auf Schilfrohr, c. a.)

Nereis Payk. Hermannstadt (Bielz).

scirrhosus Gyllh. Hermannstadt (Bielz).

977. *Notaris* Stephens.

bimaculatus F. Hammersdorf, Fogarasch, Zäh (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

scripi F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Gyeke (Bielz); Schässburg, Marosujvár (auf Wasserpflanzen, c. a.); Kronstadt (Deubel).

aceridulus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. *monilans* Tourn. Kerzer und Frecker Gebirge, Kronstadt, Rodnagebirge (c. a.).

Maerkeli Boh. Topánfalva, Schässburg, Tordaer Schlucht, Alsó-Rákos (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

aterimus Hampe. Frecker Gebirge (Sorbota), Balánbánya, Rodnagebirge (c. a.); Paringul-Gebirge, Nagy-Hagymás (Deubel).

978. *Icaris* Tournier.

sparganii Gyllh. Nussbach (Bielz).

Schässburg als Fundort des I. sparganii Gyllh. ist zu streichen.

979. *Dorytomus* Stephens.

longimanus Forster (vorax F.). Schässburg, Rotenturm (c. a.); Hermannstadt, Freck, Kronstadt, Klausenburg (Bielz).

a. *macropus* Redt. Hermannstadt, Gyeke (Bielz)

a. *ventralis* Steph. Siebenbürgen (Bielz).

Schönerri Faust. Schässburg (c. a.).

tremulae Payk. (variegatus Gyllh., armatus Petri). S.-Regen, Klausenburg, Zäh (Bielz); Kronstadt (Deubel).

tortrix L. (pectoralis Panz.). Hátszeg, Klausenburg (Bielz); Rotenturm, Büdös, Előpatak, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

validirostris Gyll. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

hirtipennis Bedel. Hermannstadt, Schässburg (c. a.).

var. *taeniatus* Faust. Karlsburg, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

llavipes Panz. (suratus Gyllh.). Hátszeg, Kronstadt, Hermannstadt, Fogarascher Gebirge, Dees (Bielz); Rotenturm, Marosujvár, Karlsburg (c. a.).

filirostris Gyll. Schässburg, Fogarasch (Bielz); Ujszékely b. Sch. (c. a.).

Dejeani Faust (*costirostris* Gyll.). Déva, Dees (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel). **taeniatus** F. (*bituberculatus* Zett.). Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Unter-Kerz, Karlsburg, Előpatak, Schässburg, Borszék (c. a.). **affinis** Payk. Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Előpatak, Törczkó, Schässburg (c. a.); Szamosuvárt (Ormay). **coalescens** Gyllh. Schässburg (c. a.). **melanophthalmus** Payk. (*punctator* Herbst, *agnathus* Boh.). Rotenturm, Schässburg, Kronstadt (c. a.); Hermannstadt, Sölzenburg, Gyergyó-Tölgyes (Ormay). **a. elilectarius** Boh. Hermannstadt (Bielz). **majalis** Payk. Schässburg (Kokelufer, c. a.); Kronstadt (Deubel). **salicinus** Gyllh. Schässburg (Kokelufer, c. a.) **villosulus** Gyll. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz). **rufulus** Bedel. Kronstadt (Zinne, Deubel)? **Reussi** Formanek. Rotenturm (c. a.). **dorsalis** L. Borszék (auf Sahlweide in grösserer Zahl und verschiedener Färbung, c. a.).

Das Männchen besitzt auf dem letzten Ventralsegment eine Grube, welche beiderseits von einem Höcker begrenzt wird. Diese sexuelle Auszeichnung finde ich nirgends erwähnt.

Smieronychini.

980. Smieronyx Schönh.

jungermanniae Reich. (eiusmodi Gyllh., *variegatus* Gyll.). Durch das ganze Gebiet verbreitet. **coecus** Reich (politus Boh.). Schässburg (Bielz, c. a.); Reps (c. a.).

Tanysphyrini.

981. Tanysphyrus Germar.

lemnæ Payk. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Schässburg (Weiher auf der Breite, 26. April, c. a.).

982. Bagons Schönh.

(*Lyprus*,)

cylindrus Payk. Hâtszeg, Hermannstadt (Bielz); Kronstadt (Deubel, c. a.).

Frivaldszkyi Tourn. Schässburg (Fuchslöch, c. a.).

(*Bagous* i. sp.)

nodulosus Gyllh. (*binodulus* Thoms. nec Herbst). Kronstadt (Gespreg, Deubel, Mélhely, c. a.).

frit Herbst (*subcarinatus* Bris.). Hermannstadt (Bielz).

tempestivus Herbst. Kronstadt (Gespreg, Deubel)

lutosus Gyll. Hermannstadt (Ormay); Baroth (auf feuchten Wiesen, Mélhely); Schässburg (Kokelufer, c. a.). **glabrirostris** Herbst (*collignensis* Herbst, *lutulentus* Gyllh.). Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Unter-Kerz, Karlsburg, Zalatna, Halvelagen b. Sch., Schässburg (Kokelufer, c. a.). **subcarinatus** Gyllen. Mezőség (Bielz).

983. Hydronomus Schönh.

alismalis Marsh. Hâtszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Kroustadt (Deubel).

984. Orthochaetes Germ.

setiger Beck. Schielthal, Gross-Scheuern (Bielz); Hâtszeg, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Bucecs (Deubel).

(*Styphlus* Schönh.)

subsetosus n. sp. Kerzer Gebirge (Buleatal, am Flussufer gesiebt, 2 Exempl.).

Orthochaetes (*Styphlus*) *subsetosus*. Lg. 1'8 mm. (sine rostro).

Forma et colore O. setigeri, sed dimidio minor. Fuscus, opacus, tibialis, tarsis, autennis testaceis. Rostrum valde arcuatum, crassum, thorace vix brevius, subcarinatum, apice nitidum. Antennæ funicolo septemarticulato, funiculi articulum I obconicum, latitudine dimidio longius, secundum gracilis, cylindricum, latitudine aequilongum, cetera transversa, clava ovalis, scapus oculum non attinges. Oculi distataes, vix prominentes, frons rostro aequilata. Prothorax subcylindricus quadratus, lateribus medio paulum rotundatus, pone apicem vix constrictus, dorso paulum convexus, opacus, squamulis dispersis minutis adpersus. Elytra oblonga, basi thorae latiora, truncaeta, humeris rotundatis, suleata, intersticiis convexis, tertio et quinto, praesertim basin versus, costatis, striis vix punctatis, intersticiis setis brevibus reclinatis seriatim obtectis. Pedes breves, femoribus clavatis, tibialis apicem versus ampliatis, rectis, apice truncatis, tarsorum articulum III transversum latum apice bipartitum, nagiucili liberi.

Der Käfer hat ganz die Gestalt des O. setiger, ist aber viel kleiner, der Rüssel kürzer, die Flügeldecken gerade abgestutzt, nicht wie bei jenem schwach ausgerandet, die Schultern abgerundet vorstretend, die Streifen der Flügeldecken kaum sichtbar punktiert, die Interstitionen derselben glanzlos. Es fehlen ihm ferner die langen abstehenden aufrechten Haare, statt deren er kurze, an der Spitze keulenförmig schwach verdickte, nach hinten geneigte Börstchen auf den Zwischenräumen zeigt. Auch auf dem Hals-schild befinden sich nur sehr schwer sichtbare, anliegende Schüppchen, an den Schienen anliegende längere Börstchen.

(*Paraphileraus*.)

alpinus Penecke. Bucecs, Honigberg (Deubel).

Cossoninae.

985. Dryophthorus Schönh.

corticalis Payk. (*lymexylon* F.). Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg (im mul-

migem Holze einer alten Eiche in grosser Anzahl); Kronstadt (Warte, Deubel).

986. *Cossonus Clairville.*

parallelepipedus Herbst. Klausenburg (Bielz); Schässburg (im Mulme einer hohen Weide, c. a.); Kronstadt (Deubel).

linearis F. Hermannstadt, Zibinsgebirge (Bielz); Marosujvár (unter der Rinde und an den Wurzeln einer abgestorbenen Zitterpappel in grosser Anzahl, c. a.); Kronstadt (Méhely).

cylindricus Sahib. Hászeg (Bielz); Schässburg (Bielz, c. a., im Mulme einer hohen Weide).

987. *Eremotes Wollaston.*

elongatus Gyll. Präsbe, Kerzer Gebirge, Borszék (Bielz).

ater L. Götzemberg, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Oláhfalú (Bielz); Bistra, Frecker Gebirge (Serbota); Rodnagebirge (unter Fichtenrinde, c. a.).

punctatulus Boh. Retjezal, Baassen, Schässburg (in Nussbaumholz, c. a.).

Uasere Art wurde mit Vertretern des E. punctatus aus Frankreich und Sizilien verglichen.

reflexus Boh. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz).

(Brachytemnus.)

porcatus Germ. Hermannstadt, Marosgebirge (Bielz).

988. *Rhynocerus Germar — Stephens.*

(Hexarthrum.)

culinaris Germ. Hászeg, Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.). (Stereocorynes.)

truncorum Germ. Hammersdorf, Fogarasch, Borszék (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Unter-Kerz (aus Weidenholz); Baassen, Schässburg (aus Eichenrinde, c. a.); Rosenau, Kronstadt (Deubel). (Rhinocerus.)

ligarius Marsh. Zibinsgebirge (Bielz); Kronstadt (Deubel).

cylindricus Boh. Kerzer Gebirge, Sächs.-Regen, Borszék (Bielz).

turbatus Schonh. Kronstadt (Bielz); Hászeg, Baassen, Schässburg (aus Lindenrinde, c. a.).

Cryptorrhynchinae.

989. *Camptorrhinus Schönh.*

statua Rossi. Csáki-Gorbó (Salomon, Bielz); Schässburg (auf Eichenholz von Prof. C. Höchsmann gesammelt, c. a.).

990. *Gasterocerus Laporte.*

depressirostris F. Hermannstadt (j. W., Bielz).

991. *Cryptorrhynchus Illiger.*

lapathi L. Hászeg, Hermannstadt, Michelsberg, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Borszék (auf Weiden nicht selten, c. a.).

992. *Acales Schönh.*

denlicollis Germ. Durch das ganze Gebiet verbreitet (unter Laub).

variolosus Stierl. Kronstadt, Tartlau, Bodzaer Pass (Kraszna, Bielz); Előpatak (Clement).

camelus F. Zibinsgebirge, Mediasch (Bielz); Büdös, Topánfalva (c. a.).

ptinoides Marsh. Zibinsgebirge (im Tale des Schanta-Baches, Ormay).

roboris Curtis. Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Borszék (Bielz); Schanta (Ormay); Előpatak, Alsó-Rákos, Toroczkó (c. a.).

pyrenaicus Boh. Rotenturm, Büdös (c. a.); Bucsecs, Schuler (Deubel).

hypocrita Boh. Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Piatra mare, Schässburg (Bielz); Rotenturm, Gyógy (Bad, Ormay); Ober-Kerz (Glasbüttel), Toroczkó, Prászaka (Zalatna), Büdös (c. a.).

ovalipennis n. sp. Rotenturm, 1 Exempl.

Acelles ovalipennis n. sp. Länge 3'8 mm. A. hypocrita Boh. similis, sed forma elytrorum ovali, elytris sulcatis, tuberculis quettuor prothoracis bene distinctus.

Die Art ist kleinen Exemplaren des Acales hypocrita Boh. auf den ersten Blick ähnlich, bei genauerer Vergleichung unterscheidet sie sich durch längere, regelmässig ovale Flügeldecken mit tiefen Furchen, welche auf dem Rücken weniger deutlich, an den Seiten aber grubig punktiert sind. Die ganze Oberseite ist dunkelbraun beschuppt, auf dem Halschildchen befinden sich zwei schmale, undeutliche hellere Seitenbinden, auf den Flügeldecken ähnlich wie bei A. hypocrita, eine gerade schmale Querbinde hinter der Mitte und vor derselben zahlreiche kleine, isolierte, bindenartig geordnete, hellere, gelblich-weiße Punkte. Auf dem Halschildchen fehlen die aufgerichteten Schüppchen des A. hypocrita, während je eine Reihe derselben auf den Zwischenräumen der Flügeldecken vorhanden sind, aber nicht so dicht gedrängt und undeutliche Büschel bildend wie bei A. hypocrita; dagegen bemerkt man auf der Mitte des Halschildes in einer Querreihe vier Höckerchen (zwei jederseits), welche aus solchen Schüppchen gebildet sind. Der Rüssel ist etwas dünner, weniger dicht und etwas feiner punktiert, glänzend, an der Basis ohne kielartige Runzeln. Der Halschild ist fast so lang als breit, von der Basis nach vorne verjüngt, die Seiten schwach gerundet und hinter dem Vorderende kaum bemerkbar eingeschnürt. Die Flügeldecken sind viel weniger robust, länglicher, oval, mit flachver rundeten Schultern. Die Beine ähnlich denen des A. hypocrita. Von A. caucasicus Reitter, der mir übrigens nur aus der Beschreibung bekannt ist, unterscheidet sich die Art durch die vier Borstenbüschel des Hals schildes und die gerade schmale Dorsalbinde.

varlegatus Boh. Kronstadt (Bielz).

Nachdem Deubel die Art bei Kronstadt nicht wieder gefunden bat, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihre Anführung bei Bielz auf einem Irrtum beruht, auf einer Verwechslung mit einem grossen A. validus Stämpe, der zuweilen eine Grösse von 3 mm. erreicht, während P. Meyer die Grösse nur auf 2-2¹/₂ mm. angibt.

validus Ilampe. Im ganzen Waldgebiet unter Laub.

lemur Germ. Kronstadt, Bükszár, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf, Röuenturm, Gyögy (Bad, Ormay); Büdös, Alsó-Rákos, Ratosnya, Schässburg (c. a.).

echinatus Germ. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

misellus Boh. (ptinoides Gyll.).

v. **turbatus** Boh. Gross-Scheuern, Holzmengen, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Michelsberg, Schanta, Porumbacher Gebirge, Gyögy (Bad, Ormay).

Papei Solari.

var. **balcanicus** Solari. Baassen (4 Exemplare), Alsó-Rákos (1 Exemplar c. a.).

Ceutorrhynchinae.**Ceutorrhynchini.****993. Mononychus Germar.**

punctum-album Herbst (pseudacori F.). Michelsherg, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

a. **salviae** Germ. Mező-Záh (Deubel).

994. Coeliodes Schönh.

rubricus Gyll. (Hoffmanni Weise). Elő-patak (c. a.).

ruber Marsh. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Honigberg (Deubel).

erythroleucus Gmel. (subrufus Herbst). Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.); Hátszeg, Kronstadt (Deubel).

dryados Gmel. L. (quercus F.). Hammersdorf, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Klein-Pold (Ormay); Maros-Víjár, Schässburg, Kronstadt, Előpatak (c. a.).

trifasciatus Bach. Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Honigberg (Deubel).

proximus Schultze. Hátszeg (Deubel).

rubicundus Herbst. Hermannstadt, Klausenburg (Bielz).

995. Stenocarus Thomson.

cardul Herbst. Hammersdorf, Schässburg, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Alsó Rákos (c. a.); Rosenau, Erösd (Deubel).

996. Craponius Leconte — Seidlitz.

epilobii Payk. Hermannstadt, Zitinsgeb. (Ormay); Borszék (c. a.); Hátszeg, Kronstadt (Deubel).

997. Ciduorrhinus Thomson.

4-maculatus L. (urticæ Scop.). Durch das ganze Gebiet auf Brennnesseln.

998. Coeliastes Weise.

lamii F. Kerzer Gebirge, Sächsisch-Regen (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Kleinpold (Ormay); Karlsburg, Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Kronstadt (Deubel).

999. Allodactylus Weise.

exiguus Ol. Gyll. Kalán, Alsó-Rákos (c. a.).

affinis Payk. (geranii Payk.). Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Előpatak, Schässburg, Baassen, Rodnagelirge (c. a.); Bistritz (Deubel).

1000. Pseudophytobius Desbrochers.

veronicae Friv. Karlsburg (von Zellich gesammelt, c. a.).

1001. Scleropterus Schönh.

serratus Germ. Ober-Seles, Kerzer Geb. (Bielz); Schanta (Ormay); Schuler-Gebirge, Balánbánya, Kalán, Parigulgebirge, Rodnagelirge (c. a.).

offensus Boh. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Bucsecs (c. a.).

1002. Rhytidosoma Stephens.

Rh. **globulus** Herbst fehlt unserer Fauna.
fallax Otto. Frecker Gebirge (Serbota); Schuler-Gebirge, Csukás, Balánbánya, Borszék (c. a.); Krepatura bei Zernest (Deubel).

monticola Otto. Hermannstadt, Előpatak, Schässburg (c. a.); Schuler, Nagy-Hagymás, Kronstadt, Erösd (Deubel).

1003. Brachyodontus Schultze.

Reitteri Weise. Rodnagelirge (c. a.). Deubel Ganglb. Bucsecs (c. a.).

1004. Amalus Schönherr.

haemorrhous Herbst (scortillum Herbst). Hermannstadt, Neppendorf, Gross-Scheuern, Girelsau, Kronstadt (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Schuler-Geb., Schässburg (c. a.).

1005. Rhinouens Stephens.

castor F. Hammersdorf (Ormay); Frecker Gebirge (Leitha), Schässburg (c. a.); Ober-Komana (Méhely); Hátszeg (Deubel).

a. **flavipes** Steph. Schässburg (c. a.).

bruchoides Herbst. Hermannstadt, Ilam-mersdorf, Schässburg, Sächsisch-Regen (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte); Elő-patak, Bistritz (c. a.); Hátszeg, Kron-stadt (Deubel).

inconspicetus Herbst. Giresau, Fo-arasch (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Schässburg (c. a.); Kron-stadt (Deubel).

Rh. inconspicetus Herbst ist im Katalog der europäischen Käfer von Heyden etc. wohl aus Verschen ausgeblichen.

pericarpus L. Hátszeg, Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Fogarasch, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Hammersdorf, Heltau (Ormay); Retjezat, Malomvitz, Schäss-burg, Szováta, Rodnagebirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

perpendicularis Reich. (guttalis Grav.). Hermannstadt, Schässburg (Bielz); Ham-mersdorf, Heltau (Ormay); Unter-Kerz, Reps, Bistritz (c. a.); Kronstadt, Schuler, Hammersdorf, Nagy-Hagymás (Deubel).

albincinctus Gyllh. Hermannstadt (Bielz).

1006. Phytobius Schönh.

canaliculatus Fabrs. Hermannstadt (Or-may); Kronstadt (Deubel).

Waltoni Boh. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.); Hátszeg, Kron-stadt (Deubel).

comari Herbst. Hermannstadt (Ormay, c. a.); Kronstadt (Deubel).

4-tuberculatus F. Zibinsgebirge (Bielz); Talmesch (Ormay); Schässburg (Ko-kelufer c. a.); Kronstadt (Deubel).

granatus Gyll. (Brisouti Seidlitz). Zibins-gelirge (Bielz); Hermannsta't (Or-may); Hátszeg, Schässburg (Kokelufer, c. a.); Honigberg (Deubel).

4-cornis Gyll. Hermannstadt, Kerzer Geb. (Bielz); Kronstadt (Deubel). (Litodactylus).

leucogaster Marsh. Kronstadt (Deubel). (Eubrychius.)

velatus Beck. Gross-Scheuern (Bielz).

1007. Marmaropus Schönh.

Besseri Gyll. Puj (bei Hátszeg, c. a.).

1008. Phrydiuchus Gozis.

toparius Germ. Gross-Scheuern (Bielz); Felső-Orbó (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Hátszeg, Schässburg (c. a.).

Spelseri Schultze. Schässburg (bei einer Ueberschwemmung der Kokel 1890, c. a.).

1009. Ceutorrhynchidius Duv.

horridus Panz. (spinosa Gemm.). Reps, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Schässburg c. a.); Kronstadt, Nagy-Hagymás (Deubel).

trogloides F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mediasch (Bielz); Karlsburg, Kronstadt, Alsó-Rákos, Schässburg, Baassen (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

1010. Ceutorhynchus Germ.

(Sirocalus.)

terminatus Herbst. Hermannstadt, Neppendorf (Bielz); Schässburg, Kalán (c. a.); Kronstadt, Törzburg (Deubel).

quercicola Payk. Crepatura bei Zernest (Deubel) det. von Formanek.

nigrinus Marsh. Kronstadt (Zinne, Méhely); Vajda-Hunyad (c. a.).

floralis Payk. Durch das ganze Gebiet ver-breitet.

pyrrhorhynchus Marsh. (achilleae Gyll.). Hermannstadt, Neppendorf (Bielz).

pulvinatus Gyll. Salzburg b. Hermannstadt (c. a.); Rodna, Kronstadt (Deubel).

rhenanus Schultze. Kronstadt (Zinne), Rosenau (Deubel), Hammersdorf (c. a.).

Hampei Bris. Reps (Seidlitz, 1864).

carniolicus Schultze. Schuler (Deubel). (Thamioculus.)

vittatus Gyll. Hermannstadt, Klausenburg Schässburg (c. a.).

pubicollis Gyll. Hermannstadt (j. W.); Baassen, Schässburg (c. a.).

Da es nicht sicher ist, welche von beiden Arten Bielz meint, C. pubicollis Gyllh. oder signatus Gyllh., die beide bei uns vorkommen, führe ich nur die mir bekannten Fundorte an.

virgatus Gyll. Honigberg am Altfluss (Deubel); Vajda-Hunyad (c. a.).

signatus Gyll. Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Kraatzi Bris. Hermannstadt (Bielz); Schäss-burg (Fuchsloch, 6. Mai, zusammen mit C. trimaculatus F. von Distel, c. a.).

(Ceutorhynchus i. sp.)

abbreviatulus F. Gross-Scheuern, Marpod, Kerz, Fogarasch (Bielz); Hammers-dorf, Hátszeg, Rolenturm, (c. a.); Honigberg (Deubel).

geographicus Goeze. Rotenturm, Hammers-dorf, Előpatak, Bükszad, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hátszeg, Puj (bei Hátszeg), Petro-zsény (c. a.).

radula Germ. Kronstadt, Klausenburg (Bielz).

erucifer Oliv. (cruciger Herbst). Hermann-stadt, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

Aubel Boh. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Marpod (Bielz).

Sollte C. Aubel Boh. vielleicht ein Druckfehler für Andrea Germ. sein, der sich im Verzeichnis nicht findet, obgleich er bei uns vorkommt? Es liegt diese Annahme um so näher, da Aubel nur aus dem südlichen Europa und dem Kaukasus nachgewiesen wurde.

angulicollis Schultze. Kalán (c. a.); Rosenau, Honigberg (Deubel).

ornatus Gyllh. (Andreae Germ. Seidl.). Karlsburg (c. a.); Rosenau, Kronstadt (Zinne, Deubel).

larvatus Schultze. Schässburg, Baassen, Szováta (c. a.); Rosenau, Kreptatura (Deubel).

gibbicollis Schultze. Kronstadt (Kapellenberg, Deubel, c. a.).

litura F. Hermannstadt, Sächsisch-Regen (Bielz).

trimaculatus F. Hammersdorf (Bielz); Schuler-Gebirge, Balánbánya, Schässburg (auf Distel, c. a.); Zernest, Kronstadt, Nagy-Hagymás (Deubel).

asperifoliarum Gyll. Héviz, Oálafalu (Bielz); Héviz, Schässburg, Kronstadt, Szováta (c. a.); Hammersdorf, Rosenau (Deubel).

cognatus Schultze. Siebenbürgen (Catalogus Col. Eur., 671).

pallidieornis Bris. Zibinskamm (c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel).

urlicae Boh. Kronstadt (Zinne, Deubel).

euphorbiae Bris. Schuler-Gebirge, Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

amplipennis Schultze. Schässburg (c. a.).

austriacus Bris. Hammersdorf (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

transylvanicus Schultze. Siebenbürgen.

symphyti Bed. (?raphani F.). Hermannstadt, Giresau, Freck (Bielz); Honigberg (Deubel).

angulosus Boh. Schässburg (c. a.).

suturalis F. Nendorf b. H. (Bielz); Schässburg, Előpatak (c. a.); Hammersdorf (Deubel).

arquatus Herbst. Rotenturm (c. a.); Bistritz, Rosenau, Kronstadt (Deubel).

campestris Gyll. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau (Bielz); Itátszeg, Szováta, Schässburg (c. a.).

chrysanthemi Germ. Kronstadt, Wolkendorf (Bielz); Schässburg (c. a.).

figuratus Gyll. Fogarasch (Bielz).

triangulum Boh. Schässburg, Borszék (c. a.); Schuler, Wolkendorf (Deubel).

rugulosus Herbst. Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Oálafalu (c. a.).

melanostictus Marsh. Karlburg, Schässburg (Türkenhill, 24. Oktober), Kokelusen oder im Böhricht einer sumpfigen Stelle, c. a.); Kreptatura, Kronstadt (Deubel).

macula-alba Herbst. Hermannstadt, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).

albovittatus Germ. Hátseg, Hermannstadt,

Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Záh (Bielz).

marginatus Payk. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Schässburg (Bielz); Stolzenburg (Ormay).

Mölleri Thoms.

a. **rotundatus** Bris. Kronstadt (Zinne, Deubel).

punctiger Gyllh. Puj (b. Hátseg). Karlsburg, Schässburg, Borszék (c. a.); Hermannstadt (Seidlitz); Kronstadt (Deubel).

pilosellus Gyll. Schässburg (c. a.).

inhumeralis Schultze. Rotenturm, Schässburg (c. a.).

pollinarius Forst. Gross-Scheuern, Gyeke (Bielz); Hammersdorf, Schässburg (Kroebberg, Mai, c. a.).

pleurostigma Marsh. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Schässburg, Kronstadt, Gyeke (Bielz); Hammersdorf, Klein-Pold (Ormay); Karlsburg, Schellenberg, Salzburg b. H. (c. a.).

Roberti Gyll. Hermannstadt (Bielz); Kalán (c. a.).

a. **alliaiae** Bris. Vargyas bei der Almásér Höhle (Deubel).

punctieollis Boh. Karlsburg, Schässburg, Vajda-Hunyad (c. a.); Vargyas b. d. Höhle (Deubel).

obsoletus Germ. Hermannstadt, Kronstadt (Bielz).

faeculentus Gyll. Karlburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

rapae Gyll. Záh (Mezősg, Bielz); Hermannstadt (Ormay).

borraginis F. Hermannstadt, Grossschenern, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

syrites Germ. Klausenburg (Bielz); Hammersdorf (Ormay, c. a., auf crambe tartaria); Stolzenburg (Ormay; Kronstadt (c. a.); Nagy-Hagymás (Deubel)).

arator Gyll. Gross-Scheuern (Bielz); Hammersdorf (Bielz, c. a.); Honigberg (Altfluss, Deubel).

assimilis Payk. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schässburg (c. a.); Zernest (Deubel).

constrictus Marsh. Kronstadt, Schuler, Vargyas bei der Höhle (Deubel); Schässburg (c. a.).

cochleariae Gyll. Előpatak (Bielz); Schuler-Gebirge, Schässburg (c. a.); Rodnagéb. (Deubel).

Schönherri Bris. Előpatak (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

similis Bris. Kronstadt (Zinne, Deubel).

parvulus Bris. Schässburg, Vajda-Hunyad (c. a.).

nanus Gyll. Kalán (c. a.); Hammersdorf, Kronstadt, Honigberg (Deubel).

angustulus Gyll. Kronstadt (Zinne, Deubel).

sophiae Stev. Kronstadt (Zinne, Deubel).

quereti Gyll. Hermannstadt (Bielz).
conspicuus Germ. Hátszeg (c. a.).
coarctatus Gyll. (*granulicollis* Thoms.). Siebenbürgen (Bielz).
quadridentis T. Panz. Hermannstadt, Gyeke, Záh (Bielz); Kronstadt (Deubel).
sulcicollis Payk. Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Kronstadt, Gyeke (Bielz); Schässburg (c. a.); Heltau, Kleinpold (Ormay); Alsó-Rákos (Deubel).
scapularis Gyll. Hermannstadt (Bielz); Hollnigberg (Altfluss, Deubel).
ignitus Germ. Schässburg, Alsó-Rákos, V.-Hungad (c. a.); Kronstadt (Deubel).
barbareae Suffr. Hermannstadt (Bielz). C. *barbareae* Suffr. ist irrtümlich für Schässburg angeführt.
pervicax Wse. Karlsburg (c. a.).
erysimi F. Im ganzen Gebiete verbreitet, auch im Gebirge (Retjezat).
 a. *subniger* Gerh. Schuler-Gebirge (c. a.).
contractus Marsh. Wie der vorige verbreitet.
hirtulus Germ. Schieltal (Bielz); Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
aeneicollis Germ. Hermannstadt (Bielz); Hammersdorf, Schässburg (c. a.).
canaliculatus Bris. Siebenbürgen (Catalogus Col. Europ., 677).

1011. *Poophagus Schönh.*

sisymbrii F. Hermannstadt (Bielz); Honigberg (Altfluss, auf Sumpfpflanzen, Deubel, c. a.).

1012. *Tapinotus Schönh.*

sellatus F. Hermannstadt (Bielz); Honigberg (Altfluss, Deubel).

1013. *Orobitis Germar.*

cyaneus L. Déva, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Klausenburg (Bielz); Hátszeg, Oláhfalu (Bielz, c. a.), Waldrand unter Moos; Hermannstadt (Ormay); Rosenaum (Deubel).

Coryssomerini.

1014. *Coryssomerus Schönh.*

capucinus Beck. Kronstadt (Zinne, Bielz); Schässburg, Szováta (c. a.).

1015. *Baris Germar.*

artemisiae Herbst. Hátszeg, Gross-Scheuern, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Hammersdorf, Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.).

Spitzi Hochh. Baassen (c. a.).

a. *nesapia* Faust. Baassen (c. a.).

sulcata Boh. Klausenburg (Bielz); Szamosuvárvár (Ormay).

analis Oliv. Hátszeg, Zeilner Berg (Bielz); Hammersdorf (Ormay).

taticollis Marsh. (*picina* Germ., *glabra* Bedel ol. nec. Herbst). Hammersdorf, Mediasch (Bielz); Schässburg (c. a.).
atramentaria Boh. Karlsburg (Zellich, c. a.).
carbonaria Boh. Gross-Scheuern (Bielz); Hammersdorf (Bielz, c. a., auf den Wurzeln des Crambe tatarica).

timida Rossi. Karlsburg (unter den Weinbergen gekötschert in 2 Exemplaren, c. a.); Mezőség (Gyeke, Bielz).

scolopacea Germ. Schässburg, Klausenburg (Bielz); Karlsburg (c. a.).

janthina Boh. Hátszeg (Bielz); Schässburg (c. a.).

lepidii Germ. Gross-Scheuern, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

coerulescens Scop. Mühlbach, Rothberg b. II., Michelsberg, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Gyeke, Záh (Bielz); Hermannstadt, Kakova (Unterweissenburger Komitat, Ormay).

abrotani Germ. (*picicornis* aut. nec Marsh.). Gross-Scheuern, Tartlau (Bielz).

Villae Comolli. Hátszeg, Gross-Scheuern (Bielz).

chlorizans Germ. Gross-Scheuern, Holzmengen, Fogarasch (Bielz); Elöpatak (c. a.); Rodnagebirge, Kronstadt (Deubel).

1016. *Limnobaris Bedel.*

T-album L. Hátszeg, Gross-Scheuern, Gyeke (Bielz); Kronstadt (Deubel).

pusio Boh. Baassen (Bachufer oberhalb des Bades, 14. Juni c. a.).

Calandrinae.

1017. *Spanophorus Schönh.*

piceus Pall. Záh (Bielz); Karlsburg (c. a.).

abbreviatus F. Hátszeg (Bielz); Karlsburg Baassen (c. a.); Szamosujvár (Ormay). (Ich sammelte den Käfer auf sumpfigem Boden zwischen Sumpfplänen.)

Offenbar hat Bielz nicht Sph. abbreviatus F., sondern wie Seidlitz ganz richtig bemerkt, Sph. abbreviatus Redt. = *striatopunctatus* Goeze gemeint, denn dieser kommt ziemlich häufig, jener sehr selten vor.

striatopunctatus Goeze (*mutilatus* Laich). Hátszeg, Hermannstadt, Mediasch, Birtählm, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Dees, Záh (Bielz); Klausenburg, Kronstadt (c. a.).

1018. *Calandra Clairville.*

granaria L. Durch das ganze Gebiet, oft in Scheuern und auf Fruchtböden.

orizae L. Hermannstadt (Bielz); Karlsburg, Klausenburg Schässburg (im Reis); Kronstadt (Deubel).

Tychiinae.

Tychini.

1019. *Balainus Samouelle.*

elephas Gyll. Hâtszeg, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

Im Bielz'schen Verzeichnis fehlt *P. pellitus* Boh., der bei uns vorkommt, wodurch die Vermutung begründet wird, dass *P. elephas* durch Irrtum in unser Verzeichnis gekommen sei.

pellitus Boh. Schässburg (c. a.); Schuler, Kronstadt (Deubel).

venosus Grav. (*glandium* Desbr.). Hâtszeg, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay).

villosus F. Hâtszeg, Neudorf b. H., Kronstadt (Bielz); Schässburg (auf Eichen im Frühjahr, c. a.).

nucum L. Hermannstadt, Sächsisch-Regen, Klausenburg (Bielz); Schässburg, Szurduk-Pass, Hammersdorf, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

glandium Marsh. (*turbatus* Gyll., *tesselatus* Desbr.). Hâtszeg, Fogarasch, Kronstadt, Oláhfalu (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Kerzer Gebirge (Ormay); Schässburg, Baassen, Alsó-Rákos (c. a.).

cerasorum Herbst. (Herbsti Gem.). Hermannstadt (Ormay); Rotenturm (c. a.).

rubidus Gyll. Kronstadt (Gespreng, von Sumpfpflanzen gekötschert, Deubel).

1020. *Balanobius Jekel.*

crux F. Durch das ganze Berg- und Hügelland auf Weiden.

salicivorus Payk. Wie der vorige.

pyrrhoceras Marsh. Hâtszeg, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

1021. *Anthonomus Germar.*

varians Payk. Hâtszeg (Bielz); Retjezat (c. a.); Bucecs (Deubel).

a. *perforator* Herbst. Gyögy (Bad, Ormay); Kronstadt (Deubel).

rubi Herbst. Hâtszeg, Hermannstadt, Kronstadt, Oláhfalu, S.-Regen (Bielz); Puj (Hâtszeg), Karlsburg, Schuler-Gelirge, Alsó-Rákos, Schässburg, Borszék, Rodnagbirge (c. a.).

pubescens Payk. Schanta (Ormay, Fichten); Retjezat, Balán (c. a.); Schuler (Deubel).

cinctus Kollar. (piri Boh.). Schässburg, Hâtszeg (c. a.).

inversus Bedel (*ulmi* Desbr.). Karlsburg, Schässburg (c. a.); Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Resinar (Ormay); Kronstadt, Zernest (Deubel).

pedicularius L. Hermannstadt, Stolzenburg (Ormay, auf Crataegus); Hâtszeg, Bucecs, Schässburg, Rotenturm, Balánbánya (c. a.); Kronstadt (Zinne, Mélhely).

rufus Gyll. Baassen (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

pomorum L. Hâtszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Neudorf b. H., Ober-Sebes, Kerzer Geb., Schässburg, S.-Regen (Bielz); Heltau, Michelsberg (Ormay); Kronstadt (Deubel). Grosser Schädling auf Apfelbäumen (Apfelpflütenstecher).

(Furcipes.)

rectirostris L. (*druparum* L.) Gyögy, Nagyág (Ormay); Kronstadt (Mélhely); Malomvitz, Schässburg (von Zwetschkenbäumen, c. a.).

1022. *Bradybatus Germar.*

Creutzeri Germ. Heltau (Ormay); Hammersdorf (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

Kellneri Bach. Hammersdorf, Schässburg (c. a.).

tomentosus Desbr.? Rotenturm, Kronstadt (c. a.).

Dieser langgestreckte Bradybatus, dessen Beschreibung ich nicht kenne, hat vollständig ungeähnigte Schenkel, der Rüssel ist nach vorne verengt, die Flügeldecken sind dicht grau behaart, nur eine Querbinde hinter der Mitte beinahe unbehaart, glänzend; auf den Zwischenräumen der Punktstreifen erheben sich längere weisse Börstchen, die in einer Reihe angeordnet und nach rückwärts geneigt sind. Der Halschild ist gleichmässig grau behaart. Sollte diese Art mit *tomentosus* nicht identisch sein, so schlage ich für sie den Namen *Bradybatus seriesetus* vor.

1023. *Acalyptus Schönh.*

carpini Herbst. Fogarasch, Schässburg (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Kronstadt (Deubel).

a. *sericeus* Gyll. Schässburg (Bielz).

a. *alpinus* Villa (*rufipennis* Gyll.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Holzmenge, Marpod, Schässburg, Fogarasch (Bielz); Vargyas, Kronstadt (Deubel).

1024. *Ellescus Stephens.*

scanicus Payk. Schässburg (Bielz, c. a.); Budös (c. a.); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay).

a. *pallidesignatus* Gyllh. Schässburg, Előpatak (c. a.).

bipunctatus L. Schässburg (Bielz, c. a.); Stolzenburg (Ormay); Budös, Borszék (c. a.); (Schässburg im April von Sahlweiden geklopft); Rosenau (Deubel).

salicis Petri. Schässburg (Kokelufer auf Weiden, nicht selten); Rosenau (Deubel).

Diese Art hat mit *E. infirmus* Herbst (Schönh. III. 300) grosse Ähnlichkeit, ist aber durch ungezähnte Schenkel und ganz schwarzen Rüssel von ihm verschieden. Desbrochers scheint ebenfalls eine andere, aus Südrussland stammende Art vorgelegen zu haben, wenigstens passt nicht auf unsere Art, dass die zwei ersten Geisselglieder der Fühler verlängert seien, ferner, dass die Flügeldecken nach hinten nicht erweitert und die vorderen Tibien schwach gebogen seien.

1025. *Liguyodes Schönh.*

enucleator Panz. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (Schulberg, c. a.).

1026. *Tychius Germar.*

quinquepunctatus L. Durch das ganze Gebiet.

v. **tauni** Frick. Dees (Méhely); Honigberg am Altfluss (Deubel).

polylineatus Germ. Hammersdorf, Girelsan, Rotenturm (Bielz); Hátszeg, Schässburg (c. a.).

lineatus Steph. (Schneideri Gyll.). Hátszeg, Schässburg, Baassen (c. a.).

Schneideri Herbst (lineatus Boh.). Hammersdorf (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

flavocollis Steph. (squamulatus Gyll.). Schässburg (c. a.); Boncz-Nyires (Méhely).

venustus v. **genistae** Boh. Schässburg (Bielz) ist aus unserem Verzeichnis zu streichen, da ihre Aufführung auf einer Verwechslung mit *Sibinia* vittata Germ. beruhte.

Kiesenwetteri Tourn. Schässburg (c. a.).

crassirostris Kirsch. Schässburg (c. a.).

aureolus Kiesenw. Kronstadt. Schässburg (c. a.).

v. **medicaginis** Bris. Zalatna, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

haematopus Gyll. (junceus Boh.). Hátszeg, Schässburg (c. a.); Zinne (Deubel).

femoralis Bris. Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Kronstadt (Deubel).

junceus Reich (curtus Bris.). Gross-Scheuern, Mediasch, Záh (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Gyógy (Ormay); Schässburg, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

meliloti Steph. Schässburg (Bielz, c. a.); Reps, Előpatak (c. a.); Kronstadt, Hátszeg (Deubel).

tomentosus Herbst. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

(Micotrogus.)

picirostris F. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

cuprifer Panz. Hátszeg, Gross-Scheuern, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Grossau, Stolzenburg (Ormay); Előpatak, Alsó-Rákos, Schässburg (c. a.); Alsó-Rákos, Kronstadt (Deubel).

1027. *Sibinia Germar.*

Beckeri Tourn. Karlsburg (c. a.).

fugax Germ. Schässburg (Fuchsloch, 3. Juni, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

signata Gyll. (?primita Herbst). Gross-Scheuern (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

vittata Germ. Schässburg, Karlsburg (c. a.).

cana Herbst (?pellucens Scop.-Bedel). Hermannstadt, Hammersdorf (Bielz); Baassen, Rotenturm, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Méhely); Zinne (Deubel).

viscariae L. (var. Roelofsi Desbr., var. Emeryi Tournil). Hermannstadt (Bielz); Schässburg (auf einer Silene, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

Orchestini.

1028. *Anoplus Schönh.*

plantaris Naezen. Hátszeg, Michelsberg, Kerzer Gebirge, Büdös, Schässburg (Bielz); Rotenturm, Schanta (Ormay); Malomivz (c. a.); Rosenau (1 Exempl., Deubel).

roboris Suffr. Rosenau (häufig, Deubel).

1029. *Orchestes Illiger.*

Die Arten leben auf Bänken und Sträuchern.

quercus L. Fogarasch, Kronstadt, Brenndorf, Előpatak (Bielz); Hermannstadt, Klein-Pold (Ormay); Hátszeg (Deubel).

pilosus F. (ilicis F.). Präsbe (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Bistritz, Kronstadt (Deubel).

sparsus Fahr. Hátszeg (Bielz).

fagi L. In Buchenwäldern durch das ganze Gebiet.

testaceus Müller (scutellaris F.). Zibinsgebirge, Fogarasch, Tartlau, Schässburg (Bielz); Rotenturm, Kerzer Gebirge (Ormay); Bucsecs (c. a.); Szurduk-Pass, Hátszeg (Deubel).

v. **semirufus** Gyll. Rotenturm (c. a.); Kronstadt, Ober-Venice (Méhely).

lonicerae Herbst. Schässburg (c. a.).

rusci Herbst. Hátszeg, Zibins-Gebirge (Bielz); Bükszad (c. a.).

avellanae Donov. Kronstadt, Hammersdorf (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (Breite, 2. Mai, Haselnussstrauch, c. a.).

(Pseudorchestes.)

pratensis Germ. Hermannstadt, Oláhfalu (Bielz); Schässburg, Szováta (c. a.).

cinereus Fahr. Schässburg (Scheureberg, 23. Mai, gekötschert, c. a.); Hátszeg (Bielz).

(Tachyerges.)

decoratus Germ. Hátszeg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Borszék, Schässburg (Kokelufer, auf Weiden, 12. Mai); Kronstadt, Rosenau (Deubel).

rufifarsis Germ. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Rosenau (Deubel).
salicis L. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Salzburg (Ormay); Schässburg, Borszék (auf Weiden, c. a.).

stigma Germ. Mühlbach, Héviz, Schässburg, Oláhfalu (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Borszék, Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(Isochrous.)

populi F. Hátszeg, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Sächsisch-Regen, Gyöke, Záh (Bielz); Hermannstadt, Nagyenyed, Kakova (Unterwissenburger Komitat, Ormay); Nagy-Hagymás (Deubel); Borszék (c. a.).

foliorum Müll. (saliceti F.). Schässburg, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf, Rosenau, Bucsecs (Deubel).

1030. *Ramphus Clairville.*

pulicarius Herbst (flavicornis Clairv.). Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Röthberg b. II. (Bielz); Schässburg (c. a.); Rosenau (Deubel).

Mecinini.

1031. *Mecinus Germar.*

Die Arten leben auf Wiesenpflanzen, von denen sie gekötschert werden.

collaris Germ. Hátszeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf (Bielz); Stolzenburg, Rotenturm (Ormay); Schässburg, Gross-Alisch b. Sch. (c. a.); Karlburg, Nagy-Hagymás, Kronstadt (Deubel).

pyraster Herbst. Hátszeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Talmesch, Kerzer Geb., Fogarasch (Bielz); Hermannstadt, Stolzenburg, Szamosujvár (Ormay); Karlburg, Baassen, Schässburg, Elöpatak, Kronstadt (c. a.).

circulatus Marsh. Hammersdorf (Bielz).

1032. *Gynnetron Schönh.*

Die Arten leben auf verschiedenen krautartigen Pflanzen.

(Gynmetron s. str.)

fabile Herbst. Hátszeg, Gross-Scheuern, Giresau, Marpod, Fogarasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm, Schässburg (c. a.).

latiusculum Duv. Siebenbürgen (Catalog. col. Eur. Heyden, 1906, col. 690).

rostellum Herbst. Kronstadt (Zinne, Deubel).

melanarium Germ. Schässburg (Fuchsloch, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

villosum Gyll. Hátszeg (Bielz); Hermannstadt (a. B. Ormay); Kronstadt (Deubel).

beccabungae L. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Fogarasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Kronstadt (Deubel).
v. veronicae Germ. Kronstadt, Hátszeg (Deubel); Ratosnya (c. a.).

(Rhinausa.)

aseillus Grav. Rotenturm (Ormay); Kronstadt, Vajda-Hunyal Gyalarer Tal auf Verbascum, c. a.); Sósmező, Ghyme-scher Pass (Méhely).

v. plagiatum Gyll. Hátszeg, Neudorf b. II., Holzmengen (Bielz).

tetrum F. Hermannstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Gyögy Bal, Ormay; Hátszeg, Nagyenyel (c. a.); Kronstadt (Deubel).

a. plagiellum Rosensch. Kronstadt (Zinne, Deubel); Vajda-Hunyad (c. a.).

v. subrotundatum Reitter (antirrhini Germ.). Schässburg (Bielz); Hermannstadt, Gyögy (Bad, Ormay); Thordær Schlucht, Zalatna, Kronstadt (c. a.).

antirrhini Payk. noctis auct.). Elöpatak (c. a.); Kronstadt (Zinne); Erösd (Deubel).

hispidum Brullé (pilosum Gyll.). Hermannstadt, Elöpatak, S.-Regen (Bielz).

melas Boh. Kronstadt (Deubel).

netum Germ. Neudorf, S.-Regen (Bielz); Kronstadt, Rosenau (Deubel).

G. colinum Gyll. ist aus dem Verzeichnis zu streichen, da der Käfer irrtümlich aufgenommen wurde.

bipustulatum Rossi. Gross-Scheuern, Neudorf, Schässburg, Záh (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

a. fuliginosum Rosenh. Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel); Schässburg, Szováta (c. a.).

linariae Panz. Neudorf b. H., Schässburg (Bielz).

1033. *Miarus Stephens.*

longirostris Gyll. Fogarasch, Tartlau (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

graminis Gyll. Hátszeg, Neppendorf, Neudorf bei II., Fogarasch, Reps, Sächs.-Regen (Bielz); Hammersdorf, Gyögy (Bad, Ormay); Klausenburg, Elöpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel).

distinctus Boh. Borszék (c. a.).

campanulae L. Hátszeg, Gross-Scheuern, Neudorf b. II., Fogarasch, Mediasch, Elöpatak, S.-Regen, Gyöke, Záh (Bielz); Götzemberg, Kerzer Gebirge (Ormay); Malomvitz, Puj (bei Hátszeg); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

a. ursinus Ab. Puj bei Hátszeg, Schässburg (c. a.).

v. rotundicollis Desbr. Puj bei Hátszeg (c. a.).

v. *monticola* n. v. Bucsecs, Frecker Gebirge (Serbota); Borszék, Balánbánya, Schässburg (c. a.).

Miarus campanulae v. *monticola* lässt sich nur im männlichen Geschlecht vom typischen *Miarus campanulae* unterscheiden. Während beim ♂ des letzteren das letzte Abdominalsegment tief eingedrückt ist und die seitlichen Ränder der Grube sich in Form zweier kräftigeren, nach abwärts gerichteten und durch eine im Grunde gerundete, tiefe Ausbuchtung von einander getrennten Zähne erheben, ist bei der Varietät *monticola* das letzte Abdominalsegment nur seicht eingedrückt und die Seiten des Eindruckes hinten in ein wenig über das Niveau des Segmentes erhobenes, schwaches Zähnchen erweitert. Bei der Stammform ist die Grube geglättet, glänzend, wenig dicht, grob punktiert, bei *monticola* ist die Punktierung etwas feiner und dichter, der Glanz geringer. Da sich keine sonstigen konstanten Unterschiede vorfinden, geschlechtliche Unterschiede auch sonst sehr verschieden stark ausgeprägt sind, halte ich *monticola* nur für eine lokale, vielleicht auch nur individuelle Abweichung, die ich jedoch erwähnen zu müssen glaubte.

Clonini.

1034. Cionus Clairville.

Die Arten leben namentlich auf Verhascnm.

tuberculosus Scop. (verhasci F.). Håtszeg, Retjezat, Gross-Scheuern, Neulorff bei H., Fogarasch, Kronstadt, Hosszuvalu, Tartlau, Mediasch, Schässburg (Bielz); Zibins-Gebirge, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

scrrophulariae L. Retjezat, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Hosszuvalu, Tartlau, Mediasch, Schässburg, Oláhfalu (Bielz); Zibinsgebirge, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

thapsi F. (similis Gemm.). Håtszeg, Neudorf bei H., Tartlau, Bükszák, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Rotenturm, Ober-Porumbach, Zibinsgebirge, Gyógy (Bad), Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Retjezat, Puj (bei Håtszeg). Nagyenyel, Karlsburg (c. a.).

Olivieri Rosensch. (Clairville Boh.). Hermannstadt, Fogarasch, Bükszák, Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Håtszeg (c. a.).

horstianus Geoffr. Hermannstadt, Fogarasch, Bükszák, Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Zibinsgebirge (Ormay); Håtszeg, Oláhfalu, Reps, Rodnagebirge (c. a.).

olens F. Holzmengen (Bielz); Schässburg (Schulberg, c. a.).

alauda Herbst (Blattariae F.). Håtszeg, Hermannstadt, Schässburg, Oláhfalu, S.-Regen (Bielz); Zibinsgebirge (Ormay); Kronstadt (Deubel).

(Cleopus.)

solani F. Schässburg (Schulberg April, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

Nanophynial.

1035. Nanophyes Schönherr.

circumscriptus Aubé. Schässburg (Scheureberg, 23. Mai, gekötschert).

globulus Germ. Håtszeg, Hermannstadt (j. W.), Fogarasch (Bielz); Hammersdorf (Deubel).

gracilis Redtenb. Håtszeg (Bielz).

marmoratus Goeze (lythri F.). Durch das ganze Gebiet an sumpfigen und feuchten Orten auf Lythrum).

Magdalini.

1036. Magdalis Germ.

(Tanmophilus.)

phlegmatica Herbst. Birthälm (Bielz); Kronstadt (c. a.).

nitida Gyll. Hermannstadt (Bielz); Bucsecs, Schulergebirge, Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel).

violacea L. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ornay, auf getrockneten Fichtenästen); Frecker Gebirge (Serbota); Elöpatak, Karlsburg (von Eiche), Schässburg (Scheureberg von Ulmen, 23. Mai, c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

frontalis Gyll. Klausenburg (Bielz); Zernest (Coltin Chitilor, Méhely); Kronstadt (Deubel).

duplicata Germ. (?punctipennis Küster). Kronstadt, Rosenau (Deubel).

Weisei Schreiner. Honigberg (am Altfluss, Deubel, det. Formanek).

striatula Desbr. Siebenbürgen (Bielz).

armigera Geogr. (aterrima F.). Dobra, Schässburg (Bielz); Hahubach b. H. (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

carbonaria L. Szurdukpass (c. a., von Fichten geklopft).

asphaltina Boh. Klausenburg (Bielz).

(Panus.)

cerasi L. Håtszeg, Hermannstadt, Holzmeingen, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

barbicornis Latr. Schässburg (Birnbaum, Juni, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

(Edo.)

ruficornis L. (pruni L.) Håtszeg, Gross-Scheuern, Giresan, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Szováta, Baassen (c. a., auf Birnbaum); Kronstadt, Alsó-Rákos (Deubel).

(Panopsis.)

flavicornis Gyllb. Hermannstadt (Ormay).

quericola Weise. Håtszeg, Kronstadt (Deubel).

Aplonlnt.

1037. Apion Herbst.

(Onyehapion.)

tamarisci Gyll. Siebenbürgen (Bielz).

A. tamarisci Gyll. gehört dem Süden Europas an. Ihr Vorkommen bei uns bedarf noch der Bestätigung, zumal Bielz keinen näheren Fundort angibt und die Art seit Bielz nicht gesammelt wurde. Auch Seidlitz (F. transs.) äussert seinen Zweifel. (Ceratopion.)

sulcifrons Herbst. Déva, Gross-Scheuern (Bielz); Talinenberg bei Petersberg (Deubel).

confluens Kirby. Hâtszeg, Marpol (Bielz); Schässburg (c. a.).

stolidum Germ. Hâtszeg, Gross-Scheuern, Fogarasch, Oláhfalu (Bielz); Kronstadt, Alsó-Rákos (Deubel).

armatum Gerst. Schässburg (c. a.).

carduorum Kirby (basicorne Illig.). Hâtszeg, Gross-Scheuern, Marpol, Fogarasch, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

onopordi Kirby. Hâtszeg, Mühlbach, Gross-scheuern, Neppendorf, Hammersdorf, Mediasch, Schässburg, Reps, Oláhfalu, S.-Regen, Gycke (Bielz); Rotenturm, Elöpatak, Déva (c. a.); Kronstadt, Alsó-Rákos (Deubel).

penetrans Germ. Hâtszeg, Neppendorf, Elöpatak (Bielz); Schässburg, Borszék (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

transylvanicum Schilsky. Siebenbürgen (Schilsky).

(Exaplon.)

compactum Desbr. (genistae auctorum). Hâtszeg, Mühlbach (r. B.), Torda (Bielz); Hermannstadt, Schässburg (c. a.).

Hilfi v. Deubeli Wagner. Hâtszeg, Kronstadt (Zinne, Deubel). Ent. Mitt. I. 1, p. 19.

corniculatum Germ. (difficile auctorum nec Herbst). Schässburg (c. a.); Erösd, Kronstadt (Deubel).

hungaricum Desbr. Schässburg, Alsó-Rákos, Elöpatak, Borszék (c. a.); Schuler, Kronstadt, Rosenau (Deubel).

difficile Herbst. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Torda (Bielz); Schässburg, Hâtszeg (Bielz, c. a.); Kronstadt, Keisd (Deubel).

(Oxystoma.)

ochropus Germ. Hâtszeg (Bielz).

A. **ochropus** Germ. ist bis jetzt in Schässburg nicht gefunden worden.

pomona F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

eraccae L. Hâtszeg, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Gross-Schenk, Fogarasch, Mediasch, Schässburg, Sächsisch-Regen (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Malomvitz, Retjezal, Karlsburg, Borszék (c. a.); Kronstadt.

cero Gerst. Hâtszeg, Freck, Héviz, Nussbach, Elöpatak (Bielz); Hermannstadt,

Hammersdorf, Kerzer Gebirge, Szamosuvár (Ormay); Malomvitz, Schässburg, Klausenburg, Zalatna (c. a.); Hâtszeg, Kronstadt (Deubel).

opeticum Bach. Elöpatak, Schässburg, Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel).

subulatum Kirby. Kronstadt (Bielz); Malomvitz, Hermannstadt, Schässburg (c. a.); Rotenturm (Ormay).

(Aspidapion.)

aeneum F. Hermannstadt, Fogarasch (Bielz).

radiolus Kirby. Hâtszeg, Gross-Scheuern, Neudorf (b. H.); Fogarasch, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Reps (c. a.); Kronstadt (Deubel).

validum Germ. Neudorf b. H., Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Gycke (Bielz). (Synapion.)

ebeninum Kirby. Fogarasch, Reps (Bielz); Heltau (Ormay); Hermannstadt, Elöpatak, Schässburg, Vajda-Ilynyad (c. a.); Rotenturm-Pass, Zernest (Deubel). (Alacentron.)

curvirostre Gylh. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Hâtszeg, Déva, Schässburg (c. a.); Algyógy (Ormay). (Omphalapion.)

laevigatum Payk. Hermannstadt, Fogarasch (Bielz).

A. **laevigatum** Payk. ist dem A. Hookeri Kirby sehr ähnlich und wahrscheinlich beziehen sich auch die Bielz'schen Fundorte auf letztere Art, da erstere nicht mehr aufgefunden wurde.

Hookeri Kirby. Grossau (Ormay); Kronstadt (Zinne, Königstein), Baróth (Méhely); Héviz, Elöpatak, Alsó-Rákos, Schässburg (c. a.); Hammersdorf (Deubel).

(Taeniapion.)

urticarium Herbst. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

(Kalcaption.)

flavofemoratum Herbst. Gyógy (Ormay); Hâtszeg (c. a.); Keisd (Deubel).

pallipes Kirby. Hâtszeg, Fogarasch (Bielz); Porumbacher Gebirge (Ormay). (Rhopalapion.)

(Pseudapion.)

rufirostre F. Hâtszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Sächs.-Regen, Gycke (Bielz); Vajda-Ilynyad (Gyaláter Tal, c. a., auf Malven und Lavatera in Gärten); Karlsburg, Hâtszeg (Deubel).

(Catapion.)

pubescens Kirby. Hâtszeg, Hermannstadt, Mediasch, Reps, Oláhfalu (Bielz); Schässburg (Bielz, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

(Catapion.)

seniculus Kirby. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Rotenturm, Kronstadt, Elöpatak, Oláhfalu, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Grossau (Ormay); Schässburg, Borszék (c. a.).

vicinum Kirby. Hátszeg, Gross-Scheuern, Fogarasch (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Kronstadt (Deubel).
atomarium Kirby. Gross-Scheuern, Héviz, Bükszás, Oláhfalu (Bielz); Zalatna, Ratsonya, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Schuler (Deubel).
serpylicola Desbr. Schässburg (c. a., vidit Schilsky).
millum Bach. (annulipes Wenck.). Ratsonya (3 Exemplare, ♂♂, c. a.).
flavimanum Gyll. Oláhfalu (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Talmesch, Szamosujvár (Ormay).
elongatum Germ. (millum Gyll. nec Bach.). Nagyenyed (c. a.).
(Erythrapion.)

sanguineum Deg. Bodzaer Gelirge, Ober-Komana (Méhely); Kronstadt (Deubel).
frumentarium Payk. Gross-Scheuern, Kerzer Geb. (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Puj (bei Hátszeg), Schässburg, Baassen, Ratsonya (c. a.); Zernest, Kronstadt (Deubel).
v. **cruentatum** Wall. Kronstadt, Bükszás, Schässburg, Rodnagelirge (c. a.); Bucsecs (Deubel).
miniatum Germ. Hátszeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm, Kerzer Geb., Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg (Fuchsloch auf rumex pratensis), Klausenburg (Bielz); Karlburg, Szováta (c. a.); Zernest, Schuler (Deubel).
Bükszás ist zu streichen.

(Podapion.)
filirostre Kirby. Reps (Bielz); Schässburg (c. a.).
Oláhfalu ist zu streichen.
nigritarse Kirby. Hátszeg, Gross-Scheuern, Rotenturm, Fogarasch, Nussbach, Schässburg, Oláhfalu, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Grossau, Gyógy (Ormay); Kronstadt (Deubel).

flavipes Payk. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
v. **Lederi** Kirsch. (♂ apicirostre Desbr., ♀ coxale Desbr.). Schässburg (c. a.); Nagy-Hagymás, Keisd, Rotenturm, Rosenau (Deubel).

dissimile Germ. Ilátszeg (Bielz).
ononicola Bach. Schässburg, Frecker Gebirge (Serbota? Leita? c. a.); Ober-Komana (Méhely).
assimile Kirby. Hátszeg, Hermannstadt, Fogarasch, Schässburg (Bielz); Topánfalva, Borszék (c. a.); Kronstadt, Tothán (Deubel).

apricans Herbst. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Mediasch (Bielz); Gyógy, Michelsberg, Szamosujvár (Ormay); Előpatak, Schässburg, Dees, Karlburg (c. a.); Kronstadt, Vargyas bei der Höhle, Nagy-Hagymás (Deubel).

varipes Germ. Hátszeg, Hermannstadt, Fogarasch, Reps, Héviz, Előpatak, Schässburg, Oláhfalu, S.-Regen, Záh (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Rotenturm, Alsó-Rákos (Deubel).

aeotivum Germ. (trifolii Bach.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

v. **rufierus** Germ. Mit der Stammform. (Apion i. sp.)

malvae F. Déva, Hermannstadt, Schässburg (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

curtiostre Germar (humile Germ.). Hermannstadt, Girelsau (Bielz). Előpatak ist zu streichen.

simum Germ. Hermannstadt, Neppendorf, Schässburg (Bielz); Előpatak, Borszék, Oláhfalu (c. a.); Kronstadt (Deubel). sedi Germ. Salzburg (Ormay).

brevirostre Herbst. Hermannstadt, Neppendorf (Bielz); Schässburg, Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

marchicum Herbst (? aterrimum L.). Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Ratsonya, Schässburg (c. a.); Keisd (Deubel).

violaceum Kirby. Hátszeg, Neudorf b. H., Girelsau, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm, Schässburg, Nagyenyel, Topánfalva, Rodnagelirge (c. a.).
Reps ist zu streichen.

hydrolapathe Marsh. Hátszeg, Fogarasch (Bielz).

minimum Herbst. Hátszeg, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Schässburg, Oláhfalu (Bielz); Hermannstadt, Talmesch (Ormay); Ratsonya (c. a.).

holosericum Gyll. Kleinpold, Gyógy (Ormay); Rotenturm, Schässburg (c. a.); Ilátszeg (Deubel).

Gyltenhali Kirby (unicolor Kirby). Hátszeg, Fogarasch (Bielz); Kronstadt (Zinne, Méhely); Hermannstadt (c. a.); Várhegy (Deubel).

Spencei Kirby. Hátszeg, Fogarasch (Bielz); Nagy-Hagymás (Deubel).

vorax Herbst. Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt (c. a.).

amethystinum Mill. Hermannstadt (c. a.).

viciae Payk. Gross-Scheuern, Fogarasch (Bielz); Schässburg (c. a.); Bucsecs, Tohán (Deubel).

var. **Griesbachi** Steph. Hammersdorf, Ilátszeg, Retjezal, Schässburg, Ratsonya, Borszék (c. a.).

pisi F. Rotenturm, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

aestimatum Faust. Hermannstadt, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

punctigerum Payk. Gross-Scheuern, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Reps, Dees (c. a.); Hátszeg (Deubel).

aethiops Herbst. Hermannstadt, Fogarasch (Bielz); Hermannstadt, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

immune Kirby. Keisd (Deubel).

pavidum Gér. Hátszeg (Bielz); Zalatna, Kronstadt, Schässburg, Nagyenyed (c. a.).

A. **striatum** Kirby ist durch Irrtum in unser Verzeichnis gekommen und daher zu streichen.

ervi Kirby. Hátszeg, Gross-Scheuern, Előpatak (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Thörlaer Schlucht (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

simile Kirby. Retjezat (c. a.).

melancholicum Wenck. Kronstadt (Deubel).

ononis Kirby. Marpod (Bielz); Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Gyögy (Ormay). Nussbach und Előpatak sind als Fundorte des A. ononis zu streichen.

elegantulum Germ. Hátszeg, Gross-Scheuern, Előpatak, Oláhfalu (Bielz); Hermannstadt, Schässburg, Zalatna, Borszék (c. a.); Kronstadt, Tohán (Deubel).

astragali Payk. (saeculare Gozis). Hátszeg, Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Előpatak (c. a.); Örkény (Zellich, Deubel).

virens Herbst. Hátszeg, Poresest, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Előpatak, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Balánbánya, Reps, Ratosnya, Borszék, Rodnaberg (c. a.).

tenue Kirby. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Hátszeg, Bükszák, Kronstadt, Schässburg, Előpatak (c. a.).

meliloti Kirby. Marpod, Reps (Bielz); Hermannstadt, Schässburg, Oláhfalu (c. a.).

loti Kirby (angustatum Kirby). Hermannstadt, Előpatak (Bielz); Hátszeg, Nussbach, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Alsó-Rákos, Nagy-Hagyomás, Rotenturm (Deubel).

columbinum Germ. Hátszeg, Gross-Scheuern, Fogarasch, Mebiasch, Schässburg, Oláhfalu (Bielz); Hermannstadt, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

punctirostre Gyll. (Schmidti Bach.). Hátszeg (Bielz).

reflexum Gyll. (livescerum Gyll.). Reps (Bielz); Hermannstadt (c. a.).

Rhynchitinae.

1038. Auletes Schön.

basilaris Gyll. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

1039. Rhynchites Schön.

(Deporaus.)

betulae L. Götzemberg, Holzmengen, Gross-Schenk, Iléviz, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Stolzenburg, Rotenturm (Ormay, auf Gesträuch in lebenden Hecken, an Waldrändern, auf Waldblößen und in Holzschlägen).

Mannerheimi Hummel (megacephalus Germ.). Hermannstadt (Bielz).

Schässburg war irrtümlich als Fundort dieser Art angegeben, doch ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich noch wird auftinden lassen.

(Pselaphorhynchites.)

nanus Payk. (planirostris F.). Gross-Scheuern, Neppendorf, Hammersdorf, Neudorf b. H., Michelsberg, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Bükszák (c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel).

tomentosus Gyllh. Schässburg, Unter-Kerz, Borszék (c. a.); Bodzaer Gebirge, Prázsmár (Méhely).

(Lasiorhynchites.)

Rh. **coeruleocephalus** Schall. (cyanoecephalus Herbst) ist in unser Verzeichnis irrtümlich hineingekommen. Da sich die Art in den Nordkarpathen findet, ist ihr Vorkommen bei uns nicht ausgeschlossen.

olivaceus Gyll. (comatus Gyll.). Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

cavifrons Gyll. (pubescens Herbst, Seidl.). Gross-Scheuern, Marpod, Sächs.-Regen (Bielz); Nagyenyed (Ormay); Schässburg (Wieleberg, c. a.); Hátszeg, Alsó-Rákos (Deubel).

sericeus Herbst. Déva, S.-Regen, Schässburg (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Hátszeg (c. a.).

(Coenorrhinus.)

germanicus Herbst. Hátszeg, Déva, Gross-Scheuern, Giresan (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

aenovires Marsh. Hátszeg, Gross-Scheuern, Schässburg, Dees (Bielz); Hermannstadt (Ormay, c. a.); Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

interpunctatus Steph. (Alliariae Seidl.). Gross-Schenk, Marpod, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Salzburg, Szamosujvár (Ormay).

pauxillus Germ. Hermannstadt, Neudorf b. H., Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Hammersdorf, Kronstadt (Deubel). (Ein Schädling, namentlich auf Aepfelbäumen, sticht junge Triebe ab).

aequatus L. (purpureus Goeze). Hátszeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Sächs.-Regen, Gycke (Bielz); Klausenburg (c. a.); Alsó-Rákos (Deubel).

(Invalvulus.)

aethiops Bach. Hermannstadt, Reps (Seidlitz, 1864); Kronstadt (Zinne, Deubel); Schässburg (c. a.).

cupreus L. Neudorf, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Hátszeg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

coeruleus Degéer (conicus Gyll.). Gross-Scheuern, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Stolzenburg (Ormay).

pubescens F. (parellinus Gyll.). Rothberg (Bielz); Honigberg (Altfluss, Deubel). (Merhynchites.)

hungaricus Herbst. Klausenburg (Bielz). (Rhynchites s. str.)

auratus Scop. Hátszeg, Neppendorf, Gross-Scheuern, Unter-Kerz, Kronstadt, Mediasch, Dees (Bielz); Klausenburg, Nagyenyed, Schässburg (c. a.).

versicolor Costa. Mező, Záh (Deubel).

Bacchus L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt, Hosszuvalu, Mediasch, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Stolzenburg, Nagylak (Unterweissenburger Komitat), Szamosújvár (Ormay); Hátszeg, Schässburg, Szováta (c. a.); Várhegy (Deubel).

1040. *Byctiseus Thomson.* (*Rhinomacer* Geoffroy)

popull L. Hermannstadt, Hammersdorf, Reps, Kronstadt, Mediasch, Gyeke, Záh (Bielz); Schässburg (c. a.).

betulae L. (alni Müll., betuleti F.). Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz). Rebenstecher, sticht die Blätter von Reben und Birnbäumchen an und rollt die Eier in dieselben ein.

1041. *Attelabus* Linné. (*Cyphus* Thunberg.)

nitens Scop. (curculionoides L.). Hátszeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Neudorf b. II., Girelsau, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Oláhfalu (Bielz); Magyar-Bükkös (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Schässburg (c. a.).

1042. *Apoderus Oliv.* (*Attelabus* auct.)

coryli L. Durch das ganze Gebiet verbreitet auf Gesträuch.

a. **collaris** Scop. Kronstadt (Pojana, Méhely).

erythropterus Zschach. Kerzer Gebirge, Fogarasch, Oláhfalu, Oláh-Laposhány (Bielz).

LXXIII. Nemonychidae.

1043. *Nemonyx Redtenb.*

lepturoides F. Klausenburg (Bielz); Karlsburg (von Sumpfpflanzen gekötschert, Juli, c. a.); Gyeke (Méhely).

1044. *Rhinomaeer Fabricius.* (*Cimberis* Gozis.)

attelaboides F. Kerzer Gebirge (Bielz); Rodnagelbirge (Deubel); Borszék (c. a.).

LXXIV. Ipidae.

Eccoptogastrini.

1045. *Eccoptogaster* Herbst. (*Scolytus* auct.)

scolytus F. (Ratzeburgi Seidl., Geoffroy Goeze.). Kronstadt (Bielz); Schässburg (Mai, am Stamme einer abgestorbenen Ulme in grosser Anzahl, c. a.).

laevis Chap. Baassen (11. Juni, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

pygmaeus F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kronstadt, Bodzaer Pass (Bielz). Soll auf Ästen der Ulme hausen.

mali Bechst. (pruni Ratzeb.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Nendorf, Fogarasch, S.-Regen (Bielz); Bistritz, S.-Regen (Müller).

carpini Ratzeburg. Schässburg, Klausenburg (in der Rinde gefällter Hainbuchenstämmen, Bielz); Kaisd, Kronstadt (Zinne, Deubel).

intricatus Ratzeb. Hermannstadt, Neppendorf (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

rugulosus Ratzebg. Hátszeg, Hermannstadt, Holzmengen, Hosszuvalu, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg (gefällter Stamm eines Apfelbaumes, c. a.).

multistriatus Marsh. Hermannstadt, Schässburg (Bielz); Unter-Kerz (c. a.).

Hyleslnini.

1046. *Phloeophthorus Wollaston.*

rhododactylus Marsh. (spartii Nördl.). Kerzer Gebirge (Bielz).

1047. *Phthorophloeus Rey.*

spinulosus Rey. Retjezat, Kronstadt (c. a.); Schulergebirge, Bucecs (Deubel).

1048. *Hylesinus Fabricius.*

- crenatus* F. Zibinsgebirge (Bielz).
oleiperda F. Karlsburg (Deubel, von Hauptmann Zellich gesammelt).
fraxini Panz. Hermannstadt, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (21. April auf frisch abgeschnittenen Syringenstangen in ausserordentlich grosser Zahl anschwärmed).

1049. *Pteleobius Reitter.*

- vittatus* F. Zibinsgebirge, Sächs.-Begen, Bistritz (Müller); Schässburg (Bielz). In der Rinde kranker und gefällter Ulmen, im Zimmer oft schon im Februar schwärmed.

1050. *Myelophilus Eichhoff.*

- piniperda* L. Talmatschel, Kronstadt, Ma-rosgebirge (Bielz).

1051. *Dendroctonus Erichs.*

- micans* Kugelann. Frecker Gebirge (Ser-bota, c. a.); Propäste (bei Zernest, Deubel).

1052. *Kissophagrus Chapuis.*

(Xylechinus.)

- pilosus* Ratzebg. Schanta (auf gefälltem Fichtenholz, Ormay); Schuler, Kronstadt (Deubel).

1053. *Polygraphus Erichs.*

- polygraphus* L. Frecker Gebirge (Ser-bota); Rodnagelbirge (c. a.); Bistra (Ormay); Schuler, Bucecs (Deubel).

Hylastini.

1054. *Hylastes Erichs.*

Die Arten leben in der Rinde von Nadelholzern.

- ater* Payk. Retjezat, S.-Regen, Borszék, Gyéke (Bielz); Frecker Gebirge (Ser-bota). Schulergelände, Balánbánya (c. a.); Erzgebirge (Müller).

- cunicularius* Er. Zibinsgebirge, Kerzer Ge-birge, Kronstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Retjezat, Schässburg (c. a.); Rodnagelbirge, Schuler, Nagy-Hagymás (Deubel).

- var. *brunneus* Er. Zibinsgebirge (Bielz).

- angustatus* Herbst. Kronstadt (Bielz). v. *attennatus* Er. Talmatschel (Bielz); Kronstadt (Deubel). (Hydurgops.)

- glabratus* Zettel (decumanus Er.). Präsbe, Kronstadt (Bielz); Schuler-Gebirge, Rodnagelbirge, Frecker Gebirge (Ser-bota, c. a.); Kerzer Gebirge, Schanta (Ormay); Nagy-Hagymás (Deubel).

- palliatus* Gyll. Präsbe, Kronstadt, Bor-szék (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schulergelände, Balánbánya (c. a.).

1055. *Crypturgus Erichs.*

- pusillus* Gyll. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg, Oláhsfalu, Borszék (Fichtenrinde, c. a.); Marosgebirge (Müller).

- cinereus* Herbst. Kronstadt, Bodzaer Pass (Bielz); Frecker Gebirge (Ser-bota, c. a.); Rodnagelbirge, Bucecs (Deubel).

1056. *Thamnurgus Eichhoff.*

- varipes* Eichh. Rosenau, Alsó-Rákos (Deu-bel).

Ipini.

1057. *Cryphalus Erichs.*

(Cryphalus s. str.)

- piceae* Ratzeb. Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (c. a.); Schuler (Deubel).

- abietis* Ratzeb. Zibinsgebirge (Bielz); Schuler, Bucecs (Deubel).

- saltuarius* Weise. Bucecs (Deubel). (Ernoporus.)

- fagi* F. Schuler, Kronstadt (Zinne, Deu-bel).

- tiliae* Panz. Gross-Scheuern, Birthälm (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Klausenburg (Müller). (Tryptophloeus.)

- asperatus* Gyllh. Kerzer Gebirge (Bielz). (Hypothenemus.)

- Hampei Ferrari. Siebenbürgen (importiert).

1058. *Pityophthorus Eichhoff.*

- micrographus* L. Zibinsgebirge, Kerzer Ge-birge (Bielz); Frecker Gebirge (Ser-bota, c. a.); Schuler, Bucecs (Deu-bel).

1059. *Pityogenes Bedel.*

chalcographus L. In unseren Gebirgen ver-breitet.

- v. *sexdentatus* Oliv. Kronstadt (Deubel).

- bidentatus* Herbst. Zibinsgebirge, Negovan, Kronstadt, Marosgebirge (Bielz).

- quadridens* Hartig.

- v. *bistridentatus* Fichl. Håtszeger Geb. (alpin, Deubel).

1060. *Ips Degeer.*
(Tomicus Latreille.)

- americinus* Eichh. Kerzer Gebirge (Bielz); Schuler, Krepatura bei Zernest (Deu-bel).

- lycographus* L. In unseren Gebirgen ver-breitet.

laricis F. Borszék, Borgoer Pass (Bielz).
suturalis Gyll. Talmatschel (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay).
curvidens Germ. Zibinsgebirge, Mediasch (Bielz); Borszék (c. a.).
Verontzowi Jakobs. Kronstadt (Deubel).

1061. *Taphrorychus Eichhoff.*

bicolor Herbst. Götzenberg, Kronstadt (Bielz); Hászeg, Schässburg (c. a.); Rotenturm (Ormay).

1062. *Xylocleptes Ferrari.*

bispinus Duft. Gross-Scheueru, Talmatsch, Birthálm, Schässburg (Bielz); Michelsberg, Hammersdorf (Ormay); Kronstadt (Zinne, Deubel); Bistritz, S.-Regen (Müller).

1063. *Dryocoetes Eichhoff.*

autographus Ratzebg. In unseren Gebirgen verbreitet.

villosus F. Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Balánbánya, Frecker Gebirge, Oláhfalu (c. a.); Klauseenburg (Müller). (Limantor.)

coryli Perris. Kronstadt (Zinne, Deubel).

1064. *Xyleborus Eichhoff.*

eurygraphus Ratzebg. Kronstadt (Méhely). *Saxeseini* Ratzeburg. Gross-Scheueru, Hammersdorf, Holzmengen, Poresest, Kronstadt, Schässburg (vom Nussbaum, Bielz); Alsó-Rákos, Rosenau (Deubel); S.-Regen (unter Rotbuchenrinde, Müller).

dryographus Ratzeburg. Schässburg (c. a.); Rosenau, Neustadt (Deubel).

monographus F. Hermannstadt, Neudorf b. H., Brenndorf, Marosgebirge (Bielz); Retjezat, Schässburg, Oláhfalu (c. a.); Honigberg (Deubel); Klauseenburg, S.-Regen (Müller). (Anisandrus.)

dispar F. Talmatschel, Marosgeb. (Bielz); Hammersdorf, Schässburg, Grossalisch bei Sch., Karlsburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel); Bistritz (Müller).

1065. *Xyloterus Erichs.*

(*Trypodendron* Stephens. pars.)

domesticus L. Retjezat, Zibins-Gebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Retjezat, Schässburg (c. a.); Zernest, Schuler (Deubel).

signatus F. Hászeg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

lineatus Oliv. Hászeg, Retjezat, Hermannstadt, Zood, Präsbe, Kerzer Gebirge (Bielz); Frecker Gebirge (Sarolta), Schässburg, Balánbánya, Borszék, Schulergelirge, Rödnagebirge (c. a.); Kronstadt (Deubel); Bistritz (Müller). v. *melanocephalus* Eichh. Kronstadt, Zernest, Schuler (Deubel).

Platyplui.

1066. *Platypus Herbst.*

cylindrus F. Hászeg, Petrozsény, Hermannstadt, Neudorf b. H., Kronstadt, Brenndorf, S.-Regen, Csákigorbó (Salamon, Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rotenturm, Schässburg (im Holze absterbender Eichen, c. a.).

Lamellicornia.

LXXV. Lucanidae.

Lucanini.

1067. *Lucanus L.*

cervus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland, wo Eichenwälder vorhanden sind.

Die Larve, welche im Mulme alter Eichen lebt, macht sich einen Cocons von Eigrösse aus lehmiger Erde, in welchem sie sich verpuppt.

v. *capreolus* Fuessl. Zusammen mit der Stammform.

1068. *Dorcus.*

parallelepipedus Mac. Leay. Durch das ganze Gebiet im Mulme alter Bäume und Baumstümpfe, auch in vermoderndem altem Holz.

1069. *Systemocerus Weise.* (*Platycerus* auct.)

caraboides L. In Eichen- und Buchenwäldern durch das ganze Gebiet.

v. ♀ *rufipes* Herbst. Zusammen mit der Stammform.

Sinodendrini.

1070. *Ceruchus Mac. Leay.*

chrysomelinus Hochw. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Bodzaer Pass, Görgényer Gebirge, Marosgeb. (Bielz); Rödnagebirge, Bucsecs, Borszék (c. a.); Negoi (Albrecht); Marosgebirge (Müller).

1071. *Sinodeudron Hellwig.*

cylindricum L. Durch das ganze Gebiet, namentlich in den Buchenwäldern der Gebirge in mulmigem Rotbuchenholz.

*Aesalini.*1072. *Aesalus Fabr.*

scarabaeoides Panz. Hermannstadt, Götzengberg, Kronstadt, Schässburg, Marosgebirge, S.-Regen (Bielz); Rotenturm (Ormay). Im mullmigen Holze alter Eichen.

LXXVI. Scarabaeidae.

Troginae.

1073. *Trox Fabr.*

Die Arten leben unter verwesenden Tierstoffen.

sabulosus L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Schässburg (c. a.).

hispidus Laichert. Hâtszeg, Hermannstadt, Mediasch, Schässburg, Zâh (Bielz); Hammersdorf (Ormay).

scaber L. Hâtszeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Kronstadt, Schässburg, Gyuke, Zâh (Bielz); Klausenburg, Thorndorfer Schlucht (c. a.).

Coprophagi.

Aphodilini.

Psammoblini.

1074. *Prammobius Heer.*

sulcicollis Illig. Hâtszeg, Törzburger Pass, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Karlsburg (c. a.); Honigberg (Altfluß, Deubel). Ich sammelte die Art in Schässburg am Kokelufer in feuchtem Sande.

laevipennis Costa. Schässburg (einmal im Fluge gefangen, c. a.); Honigberg (Deubel).

1075. *Rhyssemus Mulsant.*

asper F. (germanus auct.). Hâtszeg, Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Héviz, S.-Regen, Dees (Bielz); Kalán, Unter-Kerz, Schässburg (Kokelufer im Geniste, Fuchsloch. Witeberg unter Laub); Krenstadt (Deubel).

1076. *Diastictus Mulsant.*

vulneratus Sturm. Hermannstadt, Hösszafalu, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf (c. a.); Rosenau (Deubel).

1077. *Pleurophorus Mulsant.*

caesus Panz. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

(Platytomus.)

sabulosus Muls. Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz).

Aphodilina.

1078. *Oxyomus Laporte.*

silvestris L. Durch das ganze Gebiet in verwesenden Tier- und Pflanzenstoffen, auch in Exkrementen.

1079. *Aphodius Illiger.*

Die Arten leben in tierischen Excrementen. (Coprimumorphus.)

scrutator Herbst. In den Gebirgen und im Bergland verbreitet.

(Colobopterus.)

erraticus L. Hâtszeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Kronstadt, Mediasch, Oláhfalu (Bielz); Hammersdorf, Nagyenyed (Ormay); Malomvitz, Schässburg, Csukás, Halvelagen b. Sch., c. a.).

(Eupleurus.)

subterraneus L. Neudorf b. H., Persány, Kronstadt, Mediasch, Sächsisch-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg, Schässburg, Marosujvár, Kerzer Gebirge (c. a.); Alsó-Rákos (Deubel).

(Teuchestes.)

fessor L. Im Berg- und Hügelland verbreitet.

a. *sylvaticus* Ahr. Paringulgebirge (Deubel).

(Otophorus.)

haemorrhoidalis L. Neudorf, Mediasch, Reps, Oláhfalu, Dees (Bielz); Nagyenyed, Intra-Gáld (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Előpatak (c. a.); Bistriz, S.-Regen (Müller).

a. *sanguinolentus* Herbst. Krepatura, Schuler (Deubel).

(Amoeius.)

brevis Er. Hammersdorf, Talmatsch, Gyuke (Bielz); Hermannstadt, Kakova (Ormay); Kronstadt (c. a.); Klausenburg (Müller).

Schässburg ist als Fundort dieser Art zu streichen.

(Aphodius.)

conjugatus Panz. Déva, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Thalheim, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Klausenburg (c. a.); Krizba (Deubel).

foetens F. Hermannstadt, Hammersdorf, Kronstadt, Tartlau (Bielz); Kerzer Gebirge, Rodnagelgebirge (c. a.).

timetarius L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

(Loraspis.)

suleatus F. Hâtszeg, Rotenturm (Bielz).

(Calamosternus.)

granarius L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

(Bodilns.)

sordidus F. Baróth (Méhely).**rufus** Moll. Kerzer Gebirge, Mediasch, Hargita, Kelemegebirge, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Klausenburg, Kronstadt, Malomvitz, Paringul (c. a.); Zernest (Deubel).**nitidulus** F. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Nagyenyed (Ormay); Schässburg (c. a.).**immundus** Creutz. Hátszeg, Hermannstadt, Marienburg b. Kr. (Bielz); Marosujvár, Schässburg (c. a.).

(Agrilinus.)

gibbus Germ. (transsylvaniaicus Küst.). In unseren Gebirgen verbreitet.**ater** Deg. Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Gross-Schenk, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Schanta, Remete (b. Nagyenyed, Ormay); Kronstadt (Deubel).

Schässburg ist als Fundort dieser Art zu streichen.

constans Duftsch. Déva, Erzgebirge (Vörmága, Bielz); Szováta (c. a.).**putridus** Herbst. Hermannstadt (Bielz); Ratosnya (c. a.).

(Oromus.)

alpinus Scop. Zibins-Gebirge, Surul, Fogarascher, Kerzer, Arpascher Gebirge, Bucsecs (Bielz); Paringul-, Rodnagabirge, Retjezat, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).**corvinus** Er. Bucsecs (Deubel).

(Nialus.)

lividus Oliv. Hátszeg, Hammersdorf, Giresau, Hosszuvalu (Bielz); Bistra, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).**Sturmi** Harold. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz).**varians** Duft. (bimaculatus F.). Hátszeg, Ober-Sebes, Kronstadt, Mediasch, Gyeke, Záh (Bielz); Bistra, Schässburg, Marosujvár, Oláhfalu (c. a.); Hermannstadt, Hammersdorf, Szamosujvár (Ormay); Dees (Deubel).a. **ambiguus** Muls. Alsó-Rákos, Kronstadt (Deubel).**plagiatus** L. Zibins-Gebirge (Bielz); Petroszény (c. a.); Schuler (Deubel).**niger** Panz. Hátszeg, Neudorf b. H., Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Hosszuvalu, Mediasch (Bielz).

(Plagionotus.)

Kronstadt, Schässbnrg (c. a.).

rhododactylus Marsh. (arenarius Oliv.).

(Esimus.)

merdarius F. Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schuler (Deubel).

(Trichonotus.)

scrofa F. Mediasch (Bielz).

(Orodalus.)

tristis Panz. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg, Pilis (bei Nagyenyed), Karlsburg (c. a.); Gyergyó-Tölgyes (Ormay).**pusillus** Herbst. Ober-Sebes, Mediasch, Gyeke, Záh (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt (Deubel); Szováta (c. a.).v. **rufulus** Muls. Kronstadt, Schuler (Deubel).**quadriguttatus** Herbst. Ober-Sebes (Bielz); Marosujvár (c. a.).**quadrinaculatus** L. Rotenturm, Ober-Sebes, Marktschelken (Bielz).**biguttatus** Germ. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz).

(Amidorus.)

obscurus F. Kerzer Gebirge, Bucsecs (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Paringul, Balánbánya (c. a.); Schuler, Bodzaer Gebirge (Deubel).**thermicola** Er. Neudorf b. H. (Bielz).**porcus** F. Thalheim, Mediasch (Bielz).

(Volinus.)

pictus Sturm. Rotenturm (Bielz, c. a.); Kronstadt (Méhely).**sticticus** Panz. Neudorf, Holzmengen, Mediasch (Bielz); Rotenturm (Ormay); Hermannstadt, Schässburg (c. a.); Hammersdorf, Keisd, Kronstadt (Deubel).**melanostictus** Schmidt. Neudorf b. H., Tömöseher Pass, Predeal (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hammersdorf, Klausenburg, Karlsburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).**inquinatus** Herbst. Im Berg- und Hügelland verbreitet.**tessulatus** Payk. Neudorf b. H. (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt, Schässburg (c. a.); Rotenturm (Deubel).

(Nimbius.)

obliteratus Panz. Hermannstadt, Neudorf b. H., Mediasch (Bielz).

(Melinopterus.)

prodromus Brabm. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.**punctatosulcatus** Sturm. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.**consputus** Creutz. Mediasch (Bielz); Rotenturm (c. a.).**serotinus** Panz. Hátszeg, Thalheim (Bielz).

(Metaphodius.)

limbatus Germ. Siebenbürgen (Seidlitz).

(Limarius.)

maeulatus Sturm. Zibinsgebirge, Sterpu (Dealu negru), Kerzer Gebirge, Kelemengebirge (Bielz); Retjezat (c. a.).

(Agolius.)

mixtus Villa. Kerzer Gebirge, Porumbacher Gebirge, Prásbe (Ormay); Retjezat, Paringul, Freeker Gebirge (Serbota), Rodnagabirge (c. a.); Schuler, Bucsecs (Deubel).

(Biralus.)

montanus Er. (Deubeli Reitter). Schulergebirge (Deubel).

(Acressus.)

satellitus Herbst. Reps, Marienburg bei Kr., Bistritz (Bielz); Marosujvár (c. a.).**rufipes** L. Im Gebirge und im Bergland verbreitet.**luridus** F. Im Berg- und Hügelland verbreitet.a. **nigripes** F. Kronstadt (Ziune, Méhely); Marosujvár (c. a.).a. **variegatus** Herbst. Klausenburg, Pilis, Marosujvár (c. a.).**depressus** Kugel. Surul, Zibinsgebirge, Hermannstadt, Gr.-Schenern, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge (Bielz); Parangulgebirge (c. a.); Rosenau (Deubel); Marosgebirge (Müller).a. **atramentarius** Er. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

1080. Heptaulacus Mulsant.

villosus Gyll. Kronstadt (Deubel).**sus** Herbst. Zood (Bielz).

Aegialini.

1081. Aegialia Latreille.

(Psammoporus.)

sabuleti Payk. Bucsecs (Deubel).

Hybosorini.

1082. Ochodaens Serville.

chrysomeloides Schrank. Schässburg (c. a.).

Geotrupini.

1083. Bolboceras Kirby.

unicornis Schrank. Nagyág, Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Schässburg (c. a.); Bistritz (Müller).

1084. Odontaeus Klug.

armiger Scop. Mediasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (Fuchslöch, bei Sonnenuntergang schwärzend, 30. Juni), Wench (August, Sepsi-Köröspatak (von Direktor Both gesammelt, c. a.); Kronstadt (Méhely); Kaisd, Kronstadt, Bodzaer Gebirge, Zernest (Deubel); Bistritz, Sächs.-Regen (Müller).

Die Tiere, welche im Juni schwärzend gesammelt wurden, sind ganz rötlichgelb gefärbt, während das im August gesammelte, ebenso das aus Sepsi-Köröspatak stammende Thier ganz schwarz ist.

1085. Geotrupes Latreille.

Die Tiere leben im Dünger, schwärmen nach Sonnenuntergang.

mutator Marsh. Hammersdorf, Iléviz, Kronstadt, Tarlau (Bielz); Hermannstadt, Talmesch (Ormay); Schässburg (c. a.).**spiniger** Marsh. Kronstadt (Bielz); Schässburg, Karlsburg (c. a.); Hermannstadt (Albrecht).**stercorarius** Scriba. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

(Anoplotrupes.)

stercorosus Scriba (silvaticus Panz.). Durch das ganze Gebiet verbreitet, namentlich in Gebirgswäldern.

(Typecepris.)

vernalis L. Retjezal. Hermannstadt, Götzemberg, Kronstadt, Mediasch, Marosgebirge, Bistritz (Bielz); Poplaka, Remele (b. Nagyenyed), Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Klausenburg, Hidegszamos, Balánbánya (c. a.).

Nach Bielz soll auch G. alpinus Hagenb. auf dem Kerzer Gebirge, Bucsecs, Schulergeb., Tömöscher Pass und Piatra mare vorkommen, was mir nicht wahrscheinlich vorkommt; vielleicht ist der Irrtum durch die geringe Grösse des an diesen Lokalitäten vorkommenden G. vernalis veranlasst werden. Jedenfalls ist eine Feststellung notwendig.

a. **autumnalis** Heer. Kronstadt, Tömöscher Pass, Bodzaer Pass, Hargita, Csíker Gebirge, Nagyhagymás (Bielz).

Coprinii.

1086. Scarabaeus Linne.

pius Illig. Oláh-Laposbánya (Bielz).

1087. Gymnopleurus Illiger.

Mopsus Pall. (Geoffroyi Fuessl.). Hâtszeg, Déva, Gross-Scheuern (Bielz); Elisabethstadt (Ormay); Hahnbach (Albrecht).**Sturmii** Mac Leay. Kronstadt (Bielz); Puj (b. Hâtszeg, c. a.).

1088. Sisyphus Latreille.

Schaetteri L. Déva, Hermannstadt, Gross-Schenern, Mediasch, Záh (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Klausenburg (c. a.).

1089. Oniticellus Latreille.

fulvus Goeze flavipes F.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

1090. Onthophagus Latreille.

Die Arten leben in tierischen Exrementen.

Amyntas Oliv. Hâtszeg, Déva, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hosszuvalu, S. Regen, Dees (Bielz); Szamosujvár (Or-

- may); Pilis (bei Nagyenyed), Karlsburg, Klausenburg (c. a.); Honigberg (Deubel).
taurus Schreber. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
ovatus L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.
furcatus F. Hâtszeg, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Holzmengen, Marpod, Mezőség, S.-Regen (Bielz); Unter-Kerz (c. a.); Salzburg (Albrecht).
semicornis Panz. Hâtszeg, Déva, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Nagyenyed (Ormay); Klausenburg (c. a.).
verticicornis Laich. Hâtszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Reps, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S.-Regen, Dees (Bielz); Marosujvár (c. a.).
vitulus F. (camelus F.). Hermannstadt, Schässburg, Zäh (Bielz); Klausenburg (c. a.).
fracticornis Preyssl. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
coenobita Herbst. Michelberg, Götzenberg, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Klausenburg (c. a.); Bistritz (Müller).
austriacus Panz. Hermannstadt, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen, Dees (Bielz); Pilis (bei Nagyenyed, c. a.); Klansenburg (Müller).
lemur F. Hâtszeg, Hammersdorf, Gross-Scheuern (Bielz); Rotenturm (Ormay); Pilis (b. Nagyenyed), Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
vacca L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.
 v. **medius** Panz. Hermannstadt, Mediasch, S.-Regen, Dees (Bielz); Marosujvár (c. a.).
nuchicornis L. Dusch, Zibinsgebirge (Bielz); Intra-Gáld (Unterweissenburger Komitat, Ormay).

1091. *Caccobius Thoms.*

Schreeberi L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

1092. *Copris Geoffroy.*

lunaris L. Durch das ganze Berg- und Hügelland in Rinderdüniger.

Sericinae.

Sericini.

1093. *Serica Mac. Leay.*

brunnea L. Schielthal, Hermannstadt, Michelberg, Rotenturm, Kronstadt, Hosszuval, Mediasch (Bielz); Schässburg, Balánbánya, Rodnaberg (Hochalpin, c. a.); Nagy-Hagymás (Deubel).

1094. *Maladera Mulsant.*

holosericea Scop. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet. Ich sammelte den Käfer oft in Maulwurfshaufen.

1095. *Homaloplia Stephens.*

ruricola F. Gross-Scheuern, Kerzer Geb., Kronstadt, Hosszuval (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Ratosnya (c. a.); S.-Regen (Müller).

erythroptera Friv. (transsylvania Bielz). Schielthal, Déva, Reussner Teiche, Gross-Scheuern, Marpod, Szombat, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Hâtszeg (c. a.).

v. **carbonaria** Blanch. Mit der Stammform.

Melonthinae.

1096. *Rhizotrogus Latreille.*

(Miltotrogus.)

aequinoctialis Herbst. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

vernus Germ. Kronstadt, Schässburg (Bielz); Bozdaer Gebirge (Deubel).

(Rhizotrogus s. str.)

maculicollis Villa. Talmatsch, Rotenturm (Bielz).

aestivus Oliv. Hammersdorf, Birthälm (Bielz).

1097. *Amphimallus Latreille.*

solstitialis L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

ruficornis F. Fogarasch (Bielz).

assimilis Herbst. Déva, Götzenberg, Porcsest, Kronstadt (Bielz); Präsbe, Elöpaták, Rotenturm (c. a.); Bodzaer Gebirge (Deubel); Marosgebirge (Müller).

1098. *Melolontha Fabr.*

hippocastani F. Hermannstadt, Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Borszék (auf Saliweide). Klausenburg (c. a.); Talmesch (Landskrone), von Csiki erhalten (Deubel).

melolontha L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

pectoralis Germ. S.-Regen (Bielz).

1099. *Polyphylla Harris.*

fullo L. Hâtszeg, Karlsburg, Mühlbach, Reussmarkt, Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Zäh (Bielz); Salzburg, Nagyenyed (Ormay).

1100. *Anoxia Laporte.*

orientalis Kryn. Karlsburg, Hermannstadt (Bielz).
pilosa F. Klausenburg, Mediasch, Tartlau (Bielz).

Hoplinae.

1101. *Hoplia Illig.*

praticola Duft. Fogarasch, Mediasch, Birt-hälm, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Klausenburg (c. a.).
philanthus Füssl. Zibinsgebirge (Bielz).
farinosa L. Michelsberg, Götzenberg, Krizba, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Talmesch (Ormay); Kalán, Vajda-Hunyad (c. a.); Hászeg (Deubel).
graminicola F. Rotenturm, Mediasch, Dees (Bielz); Nagyenyed, Szamosujvár, Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).
hungarica Burm. Schässburg (c. a.); Kronstadt, Bucsecs (Méhely).

1102. *Anomala Samouelle.*

aurata F. (auricollis Lap.). Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Mediasch (Bielz); Rotenturm (Ormay).
aenea Deger. Auf Weidengebüsch durch das Berg- und Hügelland verbreitet.
 a. *bicolor* Torre. Retjezat (c. a.).
 a. *maculata* Schilsky. Nagyenyed (c. a.).
 a. *cyanæa* Torre. Retjezat (c. a.).
oblonga F. Hermannstadt, Mediasch (Bielz); Rotenturm (Ormay, c. a.); Fogarascher Gebirge, Schässburg (c. a.).
 a. *bicolor* Schilsky. Rotenturm (c. a.).
vitis F. Kovászna (Méhely).

1103. *Phyllopertha Kirby.*

horticola L. Durch das Berg- und Hügel-land verbreitet.

1104. *Anisoplia Serville.*

segetum Herbst. Szombat, Fogarasch, Kronstadt (Bielz).
agricola Poda (villosa Geoffr.). Gross-Scheuern, Mediasch (Bielz); Hászeg, Rosenau (Deubel); S.-Regen (Müller).
bromicola Germ. Kerzer Gebirge, Gyeke, Záh (Bielz); Rotenturm (Ormay, c. a.); Retjezat (c. a., auf Roggenähren).
austriaca Herbst. Kerzer Gebirge, Szombat, S.-Regen (Bielz).
graminivora Dufour (tempistica Er.). Salzburg (Ormay).
cyathigera Scop. Hammersdorf, Gross-Scheuern, Bükszad, S.-Regen (Bielz);

Salzburg, Stolzenburg (Ormay);
llosszufalu (c. a.).

lata Er. Hosszufalu? (Bielz); Karlsburg (c. a.); Gyeke (auf Hafer, Mélely). Ich besitze vier Exemplare aus Hosszufalu, welche aber cyathigera sind; daher erscheint mir das Vorkommen des A. lata in llosszufalu fraglich.
flavipennis Brull. Mezőség, Gyeke (Bielz).
dispar Er. Salzburg (Ormay).

Dynastinae.

1105. *Oryctes Illig.**nasicornis* L.

var. *grypus* Illig. Hászeg, Karlshurg, Hermannstadt, Neudorf bei H., Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Nagyenyed (Ormay); Grosspolj (Albrecht).

1106. *Pentodon Hoppe.*

idiota Herbst. Bistritz, Magyar-Lapos (Bielz).

Valginae.

1107. *Valgus Scriba.*

hemipterus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland, auf Blüten, aber auch nicht selten an Hausmauern.

Trichiinae.

1108. *Osmoderma Serville.*

eremita Scop. Hászeg, Déva, Hermannstadt, Girelsau, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Orlat (Ormay).

1109. *Gnorimus Serville.*

variabilis L. Karlsburg, Hermannstadt, Gross-Schenk, Tartlau, Mediasch, Csíker Gebirge, S.-Regen (Bielz); Tartlau (Deubel).

nobilis L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

1110. *Trichius Fabr.*

fasciatus L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

abdominalis Mén. Götzenberg, Girelsau, Vistertal, Héviz, Kronstadt, Hosszufalu, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf, Schanta, Kerzer Gebirge (Ormay); Ilaszág bei Kleinkopisch (c. a.).

Cetoniinae.

1111. *Tropinota Mulsant.* (*Epicometis* Burmeister.)

hirta Poda. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, namentlich auf Leontodon taraxacum.

1112. *Oxythyrea Mulsant.* (*Leucoscelis* Burmeister.)

funesta Poda. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

1113. *Cetonia Fabr.*

aurata L. Durch das ganze Gebiet auf verschiedenen blühenden Pflanzen und am ausfliessenden Safte der Bäume.

1114. *Liocola Thomson.*

marmorata F. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

1115. *Potosia Mulsant.*

aeruginosa Drury (speciosissima Scop.). Hermannstadt, Hammersdorf, Girelsau, Zood, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz).

affinis Andersch. Karlsburg, Kronstadt (Bielz).

cuprea F. (floricola auct.). Hermannstadt, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen, Bistritz (Bielz); Salzburg, Michelsberg, Riu Szat (Ormay); Elöpatak, Schässburg (c. a.).

v. **metallica** Herbst. Hátszeg, Déva, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Girelsau, Kerzer Gebirge. Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Hosszuvalu, Tartlau, S.-Regen, Dees (Bielz); Schässburg, Oláhfalu (c. a.).

hungarica Herbst. Karlsburg, Reussner Teiche, Stolzenburg, Gross-Schenk, Tömözscher Pass, Elöpatak, Klausenburg Oláhfalu, Sächs.-Regen, Klausenburg (Bielz).



Uebersicht unserer Käferfauna nach Familien, Gattungen, Arten und Varietäten.

Familien	Gat-tungen	Arten	Varie-täten	Subvarie-täten	Familien	Gat-tungen	Arten	Varie-täten	Subvarie-täten
1. Cicindelidae	1	9	1	10	39. Helodidae	8	14	3	—
2. Carabidae	70	460	109	42	40. Dryopidae	7	19	2	—
3. Ilybiidae	2	10	1	—	41. Georyssidae	1	4	—	—
4. Dytiscidae	19	78	4	—	42. Heteroceridae	2	11	—	—
5. Gyrinidae	2	5	1	—	43. Dermestidae	9	28	1	—
6. Rhysodidae	1	2	—	—	44. Nosodendridae	1	1	—	—
7. Staphylinidae	144	852	50	8	45. Byrrhidae	11	27	3	2
8. Pselaphidae	18	72	6	—	46. Dascillidae	1	1	—	—
9. Clavigeridae	1	2	—	—	47. Elateridae	32	126	15	7
10. Scydmaenidae	9	48	1	—	48. Cerophytidae	1	1	—	—
11. Silphidae	22	66	2	1	49. Eucnemidae	7	16	1	—
12. Lioididae	10	53	6	—	50. Buprestidae	18	67	5	—
13. Clambidae	2	6	—	—	51. Lymexylidae	2	2	2	—
14. Leptinidae	1	1	—	—	52. Bostrichidae	5	5	—	—
15. Corylophidae	5	12	—	—	53. Lyctidae	1	2	—	—
16. Sphaeriidae	1	1	—	—	54. Ptinidae	3	18	—	—
17. Trichopterygidae	9	25	1	—	55. Anobiidae	15	39	3	—
18. Scaphidiidae	3	7	—	—	56. Oedemeridae	7	21	—	—
19. Histeridae	15	60	3	—	57. Pythidae	5	9	—	—
20. Hydroporilidae	23	93	11	—	58. Pyrochroidae	1	3	—	—
21. Cantharidae	33	139	16	—	59. Hylophilidae	2	3	1	—
22. Cleridae	11	18	3	—	60. Anthicidae	5	20	1	—
23. Derodontidae	2	2	—	—	61. Meloidae	10	30	1	—
24. Byturidae	1	2	—	1	62. Rhipiphoridae	2	2	—	—
25. Ostromidae	5	7	—	—	63. Mordellidae	8	34	—	6
26. Sphaeritidae	1	1	—	—	64. Melandriidae	15	31	2	—
27. Nitidulidae	24	125	12	10	65. Lagriidae	2	3	—	—
28. Cucujidae	12	33	2	—	66. Alleculidae	8	19	2	4
29. Cryptophagidae	13	92	4	1	67. Tenebrionidae	28	51	—	—
30. Erotylidae	6	16	1	—	68. Cerambycidae	68	188	13	19
31. Phalacridae	3	18	2	—	69. Chrysomelidae	68	419	34	92
32. Lathridiidae	7	44	2	—	70. Lariidae	3	20	2	—
33. Mycetophagidae	5	12	2	6	71. Anthribidae	7	18	—	—
34. Sphindidae	2	3	—	—	72. Curculionidae	133	783	47	48
35. Cisidae	6	30	2	—	73. Nemonychidae	2	2	—	—
36. Colydiidae	20	29	—	—	74. Ipidae	22	57	5	—
37. Endomychidae	10	19	1	4	75. Lucanidae	6	6	2	—
38. Coccinellidae	29	63	8	52	76. Scarabaeidae	43	148	6	10

1117 4763 402 324

Index alphabeticus Generum.

Seite		Seite		Seite		Seite	
Abacopercus	31	Aleochara	102	Anthophagus	55	Batriscus	106
Abax	31	Aleuonota	91	Anthracus	28	Baudia	24
Abdera	228	Alexia	178	Anthrenus	192	Bembidium	14
Abattaria	118	Allecula	231	Anthribus	258	Berosus	131
Abemus	75	Allodactylus	324	Aparopion	314	Bessobia	93
Abraeus	129	Allosterna	242	Aphidecta	181	Bessopora	101
Absidia	139	Alophus	313	Aphodius	352	Betarmen	202
Acalles	322	Alpacus	10	Aphytoma	281	Bibloplectus	106
Acalyptus	332	Alphitobius	236	Apimela	91	Bibloporus	106
Acanthocinus	249	Alphitophagus	235	Apion	339	Bidessus	43
Acanthoderes	249	Amalus	324	Apistus	176	Bisnius	71
Acanthopus	237	Amara	29	Apoderus	345	Bius	237
Acentrus	317	Amarochara	99	Apteropoda	284	Blaps	233
Achenium	67	Amauronyx	106	Aptinus	42	Blechrus	40
Acidota	54	Amblistomius	24	Archontas	196	Bledius	59
Acilius	48	Ambylystus	26	Areopagus	108	Blediodes	59
Aclypea	117	Amoeetus	352	Argoptochus	298	Blethisa	11
Acmaeodera	210	Amphichroum	54	Argopus	284	Blitophaga	117
Acmaeops	239	Amphicyllis	120	Argutor	33	Bolhoceras	355
Aceritus	129	Amphimalus	358	Arrhenoplita	235	Boletophagus	234
Acrognathus	56	Amphotis	150	Aromia	246	Bolitobius	82
Acrolocha	52	Anacaena	132	Arpedium	54	Bolitochara	90
Acrodon	30	Anaesthetis	251	Arthrolips	123	Boopinus	57
Acruilia	52	Anaglyptus	247	Asaphidion	13	Borboropora	91
Actophilus	27	Anaspis	226	Asemum	244	Boros	237
Actobius	71	Anatis	183	Aspidiphorus	173	Bostrychus	213
Acupalpus	27	Anaulacaspis	90	Astenus	63	Bothrideres	177
Acylophorus	80	Anchastus	202	Astilbus	97	Botriopterus	33
Adalia	182	Anchomenus	37	Astrapaeus	80	Bothynoderes	308
Adelocera	196	Anchus	38	Astynomus	249	Brachida	86
Adelosia	32	Ancistronycha	137	Ateineles	98	Brachycerus	308
Adrees	124	Ancyrophorus	56	Atheta	91	Brachygluta	107
Adexius	314	Anemadus	116	Athous	205	Brachylacon	
Adimonia	274	Anisarthron	244	Atomaria	165	(Lacon)	196
Adonia	181	Anisodactylus	28	Attagenus	191	Brachynus	42
Adosomus	309	Anisoplia	359	Attalus	143	Brachyodontus	324
Adoxus	263	Anisosticta	181	Attelabus	345	Brachypterus	149
Adrastus	199	Anisotoma	120	Auletes	343	Brachysomus	302
Aegialia	355	Anobium	216	Aurigena	208	Brachyta	239
Aegosoma	238	Anodus	76	Autalia	90	Brachytarsus	288
Aëtophorus	41	Anolisus	137	Axinotarsus	143	Brachytemnus	321
Aesalus	351	Anomala	359			Bracteon	14
Agabus	46	Anommatus	177			Bradibatus	332
Agapanthia	251	Anoncodes	218	Badister	24	Bradycellus	28
Agaricochara	87	Anophthalmus	21	Bagous	319	Bradytus	30
Agaricophagus	119	Anoplodera	240	Balaninus	331	Bromius	263
Agathidium	120	Anopleta	93	Balanobius	331	Broscus	13
Agelastica	273	Anoplus	334	Baptolinus	70	Bruchidius	287
Aglenus	175	Anotylus	58	Baris	329	Bruchus	286
Agnathus	231	Anoxia	359	Barynotus	307	Bryaxis	107
Agonum	37	Anthaxia	209	Baryodina	103	Bryobius	35
Agrilus	211	Anthrophagus	165	Barypithes	302	Bryocharis	83
Agriothes	199	Anthicus	221	Batenus	38	Bryoporus	82
Agyrtes	118	Anthobium	51	Bathyscia	114	Buprestis	209
Alaobia	93	Anthocomus	144	Batophila	280	Byctiscus	345
Alconotha	92	Anthonomus	331	Batrides	106	Byrrhus	194

	Seite		Seite		Seite		Seite
Bythinus . . .	108	Chaetocneuma . . .	278	Coprophilus . . .	56	Dapalinus . . .	316
Byturus . . .	148	Chalcoides . . .	277	Coproporus . . .	85	Dapsa . . .	179
		Chaleophora . . .	208	Coptocephala . . .	257	Daptus . . .	24
Caccobius . . .	357	Charopus . . .	142	Coraebus . . .	211	Dascillus . . .	195
Caceporus . . .	58	Chatarus . . .	160	Corylophus . . .	123	Dasycerus . . .	169
Caenocara . . .	217	Cheporus . . .	35	Corticaria . . .	170	Dasytes . . .	144
Caenocorse . . .	236	Chilocorus . . .	184	Corticarina . . .	171	Dasytiseus . . .	145
Caenoptera . . .	242	Chiloneus . . .	301	Corticeus . . .	235	Dechomus . . .	177
Caenoscelis . . .	165	Chilopora . . .	99	Corticinus . . .	176	Deleaster . . .	56
Calanobius . . .	251	Chilotoma . . .	257	Corylophus . . .	123	Deltomerus . . .	22
Calandra . . .	330	Chlaenites . . .	23	Corymbites . . .	196	Demetrias . . .	41
Calathus . . .	37	Chlaenius . . .	23	Corynetes . . .	147	Demosoma . . .	101
Calitys . . .	148	Chloridium . . .	14	Coryphiodes . . .	56	Dendrobium . . .	216
Caliusa . . .	91	Chlorophanus . . .	307	Coryssomerus . . .	329	Dendroctonus . . .	347
Callicerus . . .	97	Choleva . . .	114	Cossonus . . .	321	Dendrophagus . . .	160
Callidium . . .	245	Cholerus . . .	113	Craponius . . .	324	Dendrophilus . . .	127
Callimus . . .	243	Choragus . . .	289	Cratararea . . .	102	Denops . . .	146
Callipora . . .	2	Chromoderus . . .	309	Crenophilus . . .	132	Denticollis . . .	206
Callistus . . .	23	Chrysanthia . . .	218	Creophilus . . .	76	Deporaus . . .	344
Callistocarabus . . .	4	Chrysobothris . . .	210	Crepidodera . . .	275	Dermestes . . .	190
Calodera . . .	99	Chrysocarabus . . .	4	Criocephalus . . .	243	Derocepis . . .	275
Calopterus . . .	36	Chrysochloa . . .	268	Crioceris . . .	256	Derodontus . . .	148
Calopus . . .	217	Chrysochus . . .	263	Cryphalus . . .	348	Deroneetes . . .	43
Calosoma . . .	2	Chrysomela . . .	264	Cryphiphorus . . .	297	Deroplia . . .	250
Calpusa . . .	88	Cicindela . . .	1	Cryptarcha . . .	157	Deropoda . . .	101
Calvia . . .	181	Cicones . . .	176	Crypticus . . .	234	Deuhelia . . .	100
Calyptomerus . . .	122	Cidnorrhinus . . .	324	Cryptobium . . .	67	Deuterocarabus . . .	8
Calytis . . .	148	Cionus . . .	337	Cryptocephalus . . .	258	Dexiogya . . .	102
Camptorhinus . . .	321	Cis . . .	174	Cryptohypnus . . .	200	Diachromus . . .	28
Campylus . . .	206	Cistela . . .	194	Cryptophagus . . .	162	Dialyceera . . .	52
Cantharis . . .	137	Clambus . . .	122	Cryptopleurum . . .	136	Dianous . . .	63
Capnodis . . .	208	Claviger . . .	110	Cryptorrhynchus . . .	322	Diaperis . . .	234
Carabus . . .	3—5	Clemmus . . .	178	Cryptotrichus . . .	36	Diastictus . . .	351
Cardiola . . .	91	Clemmys . . .	178	Crypturgus . . .	348	Dibolia . . .	283
Cardiophorus . . .	201	Cloeocharis . . .	66	Cteniopus . . .	233	Dicerca . . .	208
Carpalimus . . .	57	Cleonus . . .	309	Ctenistes . . .	109	Dichirotrichus . . .	28
Carpathobirribulus . . .	194	Cleopus . . .	336	Ctesias . . .	192	Dichotrachelus . . .	313
Carpathophilus . . .	8	Clerus . . .	147	Cueujus . . .	160	Dictyopterus . . .	136
Carphacis . . .	82	Clibanarius . . .	39	Curimus . . .	195	Dilacra . . .	91
Carpophilus . . .	150	Civina . . .	12	Cybister . . .	49	Dilus . . .	243
Cartodera . . .	340	Clyanthus . . .	247	Cybocephalus . . .	157	Dima . . .	196
Cartodero . . .	170	Clytra . . .	257	Cyehramus . . .	156	Dimetrota . . .	95
Cassida . . .	285	Clytus . . .	246	Cyhrus . . .	2	Dimarea . . .	92
Cateretes . . .	149	Cnemidotus . . .	42	Cyclonolum . . .	134	Dinarda . . .	102
Cathartus . . .	160	Coccidula . . .	186	Cystisosoma . . .	126	Dinoderus . . .	213
Cathusia . . .	91	Coccinella . . .	182	Cyldodes . . .	156	Dinodes . . .	23
Catopomorphus . . .	115	Coelambus . . .	43	Cymbiodyta . . .	133	Dinopsis . . .	85
Catops . . .	115	Coeliastes . . .	324	Cymindis . . .	41	Diodesma . . .	176
Celia . . .	30	Coeliodes . . .	323	Cynegetis . . .	180	Diphyllus . . .	168
Cephalotes . . .	13	Coelostoma . . .	131	Cyphaea . . .	88	Diplocampa . . .	18
Cephennium . . .	110	Colaphus . . .	263	Cyphoeleonius . . .	309	Diplocoelus . . .	168
Cerambyx . . .	213	Colenis . . .	119	Cyphon . . .	187	Dircea . . .	228
Ceranota . . .	103	Colobicus . . .	176	Cyphus . . .	345	Dirrhagus . . .	207
Cercus . . .	149	Colon . . .	116	Cyrtanaspis . . .	226	Ditoma . . .	176
Cercyon . . .	135	Colydiuum . . .	175	Cyrtoclytus . . .	247	Dodecastichus . . .	289
Ceroeoma . . .	223	Colymbetes . . .	48	Cyrtotonus . . .	30	Dolicaon . . .	67
Cerophytum . . .	207	Combocerus . . .	168	Cyrtoseydinus . . .	112	Dolichosoma . . .	145
Ceruchus . . .	350	Conalia . . .	225	Cirtotriplax . . .	167	Dolichus . . .	37
Cerylon . . .	177	Comiatus . . .	317	Cyrtausa . . .	120	Dolopius . . .	198
Cetonia . . .	361	Conioleonus . . .	308	Cystoplastus . . .	120	Donacia . . .	253
Centorrhynchidius . . .	326	Conosoma . . .	83	Cytillus . . .	194	Doreadion . . .	248
Centorrhynchus . . .	326	Conurus . . .	83	Dacne . . .	167	Doreatoma . . .	217
Chaetocarabus . . .	4	Copelatus . . .	47	Dadobia . . .	97	Doreus . . .	350
		Cophosus . . .	34	Dadopora . . .	150	Dorymerus . . .	293
Chaetarthria . . .	134	Copris . . .	3—7	Danacea . . .	145	Dorytomus . . .	318
		Coprochara . . .	103			Dralica . . .	92

	Seite		Seite		Seite		Seite
Drapetes	208	Eumicrus (Seyd-		Habrocerus	85	Hydrophilus	132
Drasterius	202	maenus	113	Habroloma	212	Hydroporus	43, 44
Drilus	142	Eumolpus	263	Hadraule	174	Hydrosmeecta	91
Drimeotus	114	Eupales	263	Haliplus	42	Hydrosmeectina	91
Dromius	40	Euplectus	104	Halloomenus	227	Hydrothassa	271
Dropephila	52	Europhilus	39	lalica	279	Hydrous	132
Drusilla	97	Eurygnomiusa	102	Halyzia	183	Ilygroeecia	92
Dryocoetes	349	Euryporus	80	Hapaloderus	57	Ilygronomia	86
Dryomorphus	85	Euryptilium	124	Hapalaraea	52	Hygrotus	43
Dryophilus	215	Eurythyrea	209	Hapalus	224	Hylastes	347
Dryophthorus	320	Euryusa	89	Haplocephala	235	Hylecoetus	212
Dryops	188	Eusomus	33	Haploenemia	250	Hylesinus	347
Drypta	41	Euspalerum	51	Haploenemus	45	Hylota	160
Duvalius	21	Eustilbus	169	Haptoderus	34	Hylobius	313
Dyschirius	12	Eustrophus	227	Harminius	205	Hylophilus	220
Dytiscus	48	Euthia	110	Harpalophonus	25	Hylotrupes	245
		Euthiconus	110	Harpaloxyx	26	Hymenalia	232
		Euzonitis	223	Harpalus	25	Hypebaeus	143
Ebaeus	143	Eodinus	239	Hedobia	215	Hypera	315
Ecoptogaster	346	Exocentrus	250	Helichus	188	Hyperaspis	185
Edipus	76	Exochomus	185	Helmis	189	Hyphidrus	43
Edo	338			Helobia	10	Hypnophila	200
Elaphrus	11	Falagria	90	Helochares	133	Hypnophila	278
Elater	203	Faronus	104	Helodes	187	Hypocassida	284
Elpidus	59	Formicomus	221	Helophorus	429	Hypocoelus	207
Eledona	234	Foucartia	302	Helops	237	Hypocoptus	85
Elleschus	332			Hemistenus	62	Hypoganus	198
Elmis	189			Hendecatomus	173	Hypophloeus	235
Empleurus	129	Gabrius	74	Henoticus	162	Hypsonothrus	56
Emus	76	Galeruca	274	Heptaaulacus	355	Hystenus	62
Encephalus	86	Galerucella	274	Hermacophaga	280	Hypulus	229
Endomychus	180	Gasterocerus	322	Hesperophilus	59	Hypurus (Pseudophytobius, Seidl)	324
Endophloeus	176	Gastrallus	215	Hesperus	71		
Engis (Daene)	167	Gastroidea	263	Hetaerius	128		
Enicmus	169	Gastrophysa	263	Heterhelus	149	Icaris	318
Enneastrhon	175	Gauropytes	46	Heterothops	80	Idalia (Adalia)	182
Enoplopus	237	Gauropterus	70	Heterocerus	190	Idoechroma	39
Enoplurus	131	Gaurote	239	Heterostomus	149	Idolus	202
Entoinoscelis	264	Geadromicus	55	Hexatrichus	28	Hybius	47
Epaphius	22	Georyssus	189	Hippodamia	181	Ilyobates	99
Ephistemus	167	Geostiba (Sipalia)	96	Hippuriphila	277	Ipidia	150
Epicoemetis	361	Geotrupes	356	Hispa	284	Ips	348
Epierus	127	Gibbium	214	Hispellia	284	Ischnodes	202
Epithrix	277	Glieschrochilus	157	Hister	126	Ischnoglossa	102
Epomotylus	58	Glossola	92	Holobus	86	Ischnomera	218
Epuraea	150	Globicornis	191	Holopleta	126	Ischnopoda	91
Eremotes	321	Glyptomerus	67	Holoparamecus	72	Ischnosoma	81
Eridaulus	174	Gnathoncus	128	Homalisus	136	Isorhipis	207
Eriglenus	47	Gnorimus	360	Homalium (Oma-			
Errirhino- morphus	316	Gnypteta	91	lum)	53	Judolia	241
Errirhinus	318	Goerius	75	Homalopia	358	Kissophagus	347
Ernobius	215	Gonodera	232	Homalota	88	Labidostomis	256
Eros (Dicyopterus)	136	Gonioctena	270	Homoeochara	103	Laceobius	133
Eryx	231	Grammoptera	242	Homoeusa	102	Laceophilus	46
Esolus	189	Groptodytes	44	Hoplia	359	Lachnaea	257
Euaesthetus	63	Grophoderes	48	Hoplosia	250	Lachnaeus	312
Eubria	188	Grobenia	165	Hygrocarabus	4	Lacon (Adelocera)	196
Eucinetus	188	Grynocharis	149	Hydaticus	48	Laemophloeus	161
Eucnemis	207	Grypidius	317	Hydnobius	118	Laemostenus	36
Euconnus	112	Gymnetron	335	Hydraena	131	Laenosthenes	36
Eudectus	55	Gynandrophorus	356	Hydrobius	132	Laena	237
Eudipnus	300	Gynandro- thalma	257	Hydrochara (Hydrophilus)	132	Lagarus	32
Euglenes	220	Gyrinus	49	Hydrochus	130	Lagelandia	177
Euluperus	274	Gyrohypnus	68	Hydrocyphon	187	Lagria	231
		Gyrophaena	87	Hydronomus	320	*	

	Seite		Seite		Seite		Seite	
Lamnia	248	Lithocharis	65	Miarus	336	Neorescius	24	
Lamprias	39	Lixus	309	Micetogrus	333	Nephantes	124	
Lamprinodes	83	Lobrathium	66	Micilus	199	Nephus	186	
Lamprinus	83	Lochmaea	274	Micrambe	162	Nestus	60	
Lamprorhiza	137	Lomechusa	98	Micraspis	183	Neuraphes	111	
Lamprosoma	262	Longitarsus	282	Microcara	187	Niphethodes	56	
Lampyris	137	Lopha	17	Microderes	27	Niptus	214	
Langelandia	177	Loricera (Loro-		Migrogloosa	102	Nitidula	152	
Lareynia	189	cera)	12	Microlestes	40	Nivellia	240	
Laria	286	Lorocera	12	Micropeplus	50	Nosodendron	193	
Laricobius	148	Lucanus	350	Microsaurus	77	Nosodes	148	
Larinus	310	Luciola	137	Microtherium	111	Nossidium	123	
Lasia (Subeoccinella)	180	Ludius	199	Microzoum	234	Notaphus	15	
Lasioderma	217	Luperus	273	Micrurula	152	Notaris	318	
Lasioharpalus	26	Lycoperdina	179	Minota	278	Noterus	44	
Latelmis	189	Lycetus	213	Minyops	312	Notophilus	11	
Lathridius	69	Lyodus	223	Mniobates	99	Nototheta	97	
Lathrimaeum	54	Lygistorpterus	137	Mniophila	284	Notoxus	221	
Lathrobium	66	Lymexylon	212	Mniusa	100	Nudobius	70	
Lathropus	361, 362	Lyperosomus	3	Molops	31			
Lebia	39	Lyrpus (Bagous)	319	Molorchus	242	O herea	253	
Leiestes	179	Lythraria	277	Molytes	313	Obruum	243	
Leiosoma	314	Lytha	223	Monochamus	249	Ocalea	100	
Leirides	30	Magdalais	338	Mononychus	323	Ochina	217	
Leistidius	10	Malaichius	143	Monotoma	159	Ochodacus	355	
Leistotrophus	76	Maladera	358	Montandonia	180	Ochthebius	130	
Leistus	9	Malchinus	141	Mordella	225	Ochthemonus	222	
Lema	255	Malthinus	141	Mordellistena	225	Ochthophilus		
Leptacinus	68	Malthodes	141	Morimus	248	(Perileptus)	19	
Leptinus	122	Mantura	278	Morphocarabus	6	Octotemnus	175	
Leptomastax	113	Marmaropus	325	Morychus	193	Ocypus	76	
Leptura	249	Marolia	230	Mycetaea	179	Ocyusa	100	
Leptusa	88	Mecaspis	309	Mycetina	179	Odacantha	41	
Lepyrus	308	Mecinotarsus	221	Mycetochara	232	Odontaeus	355	
Lesteva	54	Mecinus	335	Mycetodrepa	101	Oeceoptoma	117	
Leucoceles (Oxythyraea)	361	Medon	66	Mycetophagus	172	Oedemera	218	
Leucoparyphus	85	Megacronus (Brio-		Mycetoporus	81	Olibrus	168	
Leucosomus	308	charis)	83	Mycterus	220	Oligomerus	216	
Licinus	24	Megidolorus	110	Mielophilus	347	Oligota	86	
Lichenum	234	Megapenthes	202	Mylabris	286	Olisthaerus		
Liesthes	179	Megarthrus	50	Mylacus	298	(Stilbus)	169	
Lignyodes	333	Megasternum	136	Myllaena	86	Olistherus	50	
Limnebius	134	Megatoma	191	Myrmecoxenus	177	Olisthopus	37	
Limnichus	193	Megodontus	3	Myrmecodia	98	Olophrum	54	
Limnobarbis	330	Melandrya	230	Myrrha	98	Omalium	53	
Limnocharabus	5	Melanimon	234	Mysia	184	Omaseus	33	
Limnoxenus	132	Melanophila	209		183	Omias	303	
Limobius	317	Melanophthalma	171	N acerda	218	Omoglynnius	49	
Limodromus	38	Melanotus	201	Nalassus	237	Omophilus	233	
Limonius	204	Melasia	236	Nanophyes	338	Onophrone	10	
Limoxenus	132	Melasoma	272	Napochus	112	Omosita	152	
Lina	272	Meleus	313	Nargus	114	Oncomera	218	
Liocola	361	Meligethes	153	Nebria	10	Oniticellus	356	
Liodes	119	Meloë	22	Necrobia	147	Ontholestes	76	
Lionychus	40	Melolontha	358	Necrodes	117	Onthophagus	356	
Liophloeus	305	Menephilus	236	Necrophilus	118	Onthophilus	129	
Liopterus	47	Menesia	252	Necrophorus	117	Odes	23	
Liopus	250	Mesagroicus	303	Necydalis	242	Odes	23	
Liosoma	314	Mesosa	250	Neja	14	Oospheara	119	
Liotrichus (Haplottarsus)	198	Metaxya	92	Nemadus	116	Opatrum	234	
Liparus	313	Metopis	50	Nemosoma	148	Opatroides	234	
Lissodeima	219	Metabletus	40	Nemonyx	346	Opitiopalpus	147	
Litargus	173	Metallina	14	Neobisnius	71	Ophonus	24	
				Neodorecion	247	Opilo	146	
				Neoplithinus	314	Orchesia	227	

	Seite		Seite		Seite		Seite
Orchestes	334	Percosia	31	Platydema	235	Pseudolimnaeum	15
Oretochilus	49	Perileptus	19	Platydomene	66	Pseudophonus	25
Oreobius	9	Periphus	15	Platyderus	36	Pseudoptochus	302
Oreodytes	43	Peritelus	298	Platydracus	75	Pseudotriphilus	172
Oreophilus	35	Perotis	208	Platynaspis	185	Pseudophytobius	324
Orcostiba	92	Petrophilus	35	Platynus	38	Psoa	213
Orestia	277	Phaedon	271	Platyola	101	Psylliodes	279
Orina	268	Phaenops	209	Platypus	350	Pteleobius	347
Orinocarabus	8	Phaganthus	55	Platyrhinus	288	Ptenidium	124
Orithales	198	Phalaerus	168	Platyscelis	233	Pterostichus	32
Orites	34	Phausis	137	Platysma	33	Pterygium	162
Orobitis	330	Pheletes	204	Platysoma	126	Pteryx	124
Orophius	175	Philochthus	18	Platystethus	58	Ptilinus	216
Orphilus	192	Philonthus	71	Platystomus	288	Ptilolum	124
Orsodacne	251	Philorinum	54	Platytarsus	302	Ptilium	124
Orthocerus	176	Phylhydrus	133	Phlectophloeus	104	Ptinella	124
Orthochaetes	320	Phloeobium	50	Plectroseclis	278	Ptinus	214
Orthoperus	123	Phlococharis	50	Plegaderus	128	Ptomaphagus	116
Orthopleura	147	Phloedroma	99	Pleganophorus	179	Ptosima	210
Oryetes	360	Phleoenomus	53	Pleurophorus	351	Pullus	185
Osmoderma	360	Phloeopara	99	Plinthus	313	Purpuricenus	246
Osphya	231	Phloeophorus	346	Pocadius	156	Pycnomerus	177
Ostoma	148	Phloeostiba	53	Podabrus	137	Pycnocaerus	58
Othius	70	Phloeostichus	161	Podagrion	275	Pygidia	140
Otiorrhynchus	289	Phloeostrya	228	Podonta	233	Pyrochroa	220
Oxylaemus	177	Phleon	114	Poecilonota	209	Pyropterus	136
Oxymirus	239	Phloeostridium	137	Poecilus	32	Pyrrhidium	245
Oxyomus	352	Phosphuga	117	Pogonidium	14	Pytho	219
Oxinoptilus	43	Phratora (Phyllo-		Pogonistes	22		
Oxypoda	100	decta)	270	Pogonoerurus	250	Quedionuchus	78
Oxyporus	60	Phricocarabus	9	Pogonochaerus	250	Quedius	76
Oxytelus	57	Phrydiuchus	325	Pogonophorus	9		
Oxythyraea	361	Phryganophilus	231	Polygonus	22	Rabigus	74
P aehnephorus	263	Phthorophloeus	346	Polychara	103	Reichenbachia	107
Pachnida	92	Phyllobius	299	Polydrosus	300	Rhagium	238
Pachybrachus	262	Phyllobrotica	273	Polygraphus	347	Rhagonycha	139
Pachyceerus	308	Phyllocteta	270	Polyphylla	358	Rhamnusium	238
Pachygluta	88	Phyllocrepida	52	Polystichus	41	Rhamphus	335
Pachyta	239	Phyllocrepida	53	Poophagus	329	Rhantus	47
Pachytichius	317	Phyllopertha	359	Porcinolus	195	Rhinocyllus	3
Paederidius	64	Phyllostreta	280	Porthmidius	202	Rhinomacer	34
Paederus	64	Phymatodes	244	Potamophilus	188	Rhinomias	
Palorus	236	Phymatura	89	Potosia	362	(Ömias)	303
Panagaeus	23	Phytobaenus	220	Prasocuris	271	Rhinoncus	325
Paophilus	302	Phytobius	325	Pria	153	Rhinosimus	220
Paracymus	133	Phytodecta	270	Princidium	14	Rhizobius	186
Paramecosoma	162	Phytocicia	252	Prionocyphon	187	Rhizophagus	157
Parastenus	62	Phytonomus	316	Prionus	238	Rhizotrogus	358
Pardileus	25	Pidonia	240	Pryonychus	231	Rhopalodontus	175
Parnus (Dryops)	188	Pilemia	252	Pristilophus (Neo-		Rhopalopus	245
Paromalus	127	Pisalia	89	Pristilophus)	198	Rhynchaenus	334
Parophonus	25	Pissodes	317	Pristonychus	36	Rhynchites	344
Pasilia	88	Pityogenes	348	Procerus	2	Rhyncolus	321
Patrobus	22	Pityophagus	157	Procræterus	202	Rhysodes	49
Padiacus	161	Pityophthorus	348	Procrustes	3	Rhyssemus	351
Pedilophorus	194	Placusa	87	Pronomaea	86	Rhytidosoma	324
Pedinus	233	Plagiodesma	272	Propylaea	184	Riolus	189
Pediulus	32	Plagionotus	246	Prosternon	198	Rosalia	245
Pelecotoma	224	Planeustomus	56	Prostomis	161	Rybaxis	107
Pella	98	Plataraea	93	Proteinus	51		
Pelochares	193	Platambus	47	Psallidium	305	S acium	122
Peltis	117	Plataphodes	15	Psammobius	351	Saperda	251
Pentaria	226	Plataphus	15	Psammodes	351	Saphanus	243
Pentaphyllus	235	Plateumaris	251	Psammocetus	160	Saprinus	128
Pentodon	360	Platycarabus	4	Pselaphus	109	Saulcyella	104
		Platycis	136	Pseudocleonus	309	Scaphidema	234

	Seite		Seite		Seite		Seite
Scaphidium	125	Sphenoma	101	Taphrorychus	349	Trichoceble	145
Scaphium	125	Sphenoptera	210	Tapinotus	329	Trichoderma	74
Scaphosoma	125	Sphenophorus	330	Tarsostenus	146	Trichodes	147
Searabaeus	356	Sphindus	173	Tasgius	76	Trichonyx	106
Sciaphobus	301	Sphodrus	36	Telephorus	137	Trichophya	85
Sciaphilus	301	Spondylis	238	Telmatophilus	162	Trichopteryx	125
Scimbalium	67	Staphylinus	74	Tenebrio	236	Trichotichnus	27
Sciodrepa	115	Stasioidis	301	Tenehrioides	148	Trimium	104
Scirtes	187	Stenichnus	112	Teredus	177	Trimaria	193
Sclerophaedon	271	Stenodera	223	Teretrius	128	Trinodes	192
Seleropterus	324	Stenolophus	27	Tenus	62	Triphyllus	172
Scolytus	346	Stenochorus	339	Testediolum	17	Triplax	167
Scopaeus	65	Stenopterus	243	Testedium	14	Tritoma	167
Serapta	224	Stenostola	252	Tetratoma	227	Trixagus	267
Seydmaenus	113	Stenus	60	Tetropium	244	Trogoderma	192
Scymbalium	67	Stenus	88	Tetrops	252	Trogophleus	57
Scymnus	186	Stephanocleonus	308	Thalassophilus	19	Troglops	142
Seythropus	301	Steropus	34	Thalygra	156	Troginus	57
Seytodytes	47	Stethorus	186	Thamiaraea	97	Tropideres	288
Selatosomus	197	Stichoglossa	102	Thamnurgus	348	Tropinota	361
Semanotus	245	Stiliacus	65	Thanasimus	147	Tropiphorus	312
Semiadalia	181	Stilbus	169	Thanatophilus	117	Trox	351
Seminolus	(Byrrhus)	Stomis	31	Tharops	207	Trypopitys	217
Serica	357	Stomodes	298	Thea	184	Tychius	333
Sericoderus	123	Strangalia	(Leptura)	Thectura	88	Tychus	109
Sericus	198	Sterphus	320	Thiasophila	102	Typhaea	173
Serropalpus	229	Subcoccinella	180	Thinobius	56	Tyrus	100
Siagonium	49	Sunius	63	Thinodromus	57	Cleiotha	160
Sibinia	334	Symbiotes	179	Thinophilus	56	Ulema (Lema)	255
Silaria (Anaspis)	226	Synaptus	199	Thoracophorus	50	Uloma	236
Silis	141	Synalypta	195	Throscus	(Trixagus)	Urodon	287
Silpha	117	Synchita	176	Thylacites	307	Vadonia	240
Silusa	88	Synechostictus	17	Thymalus	149	Valgus	360
Silvanus	160	Synharmonia	183	Tillus	146	Velleius	80
Simplocaria	193	Synoxylon	213	Timarcha	264	Vibidia	183
Sinodendron	350	Syntonium	56	Timarchida	264	Xantholinus	68
Sinoxylon	213	Synuchus	37	Tiresias	192	Xestobium	215
... .	96	Systenocerus	350	Tithonus	297	Xyleborus	349
... .	356	Tachynus	84	Tituboea	256	Xylechinus	217
... .	224	Tachyerges	334	Tomicus	347	Xyletinus	217
... . epa	216	Tachyphonus	25	Tomocarabus	4	Xylita	229
... . ia	303	Tachyporus	83	Tomoglossa	97	Xylocleptes	349
... . tones	303	Tachypus	13	Tomoxia	224	Xylocrepia	117
Sitophilus	330	Tachys	18	Tournieria	298	Xylodomus	53
Smicronyx	319	Tachytida	19	Toxotus	339	Xylographus	174
Soronia	150	Tachytida	19	Trachodes	314	Xylonites (Xylo-	
Sospita	184	Tachytida	19	Trachycarabus	8	pertha)	213
Spaniophaenus	164	Tachyura	18	Trachyphloeus	305	Xylosteus	238
Sparedrus	217	Tachyusa	91	Trachys	212	Xylostiba	53
Spercheus	131	Tachyusida	89	Traumoezia	93	Xyloterus	349
Spermophagus	286	Tactocomas	198	Trechoblemus	19	Xylotrechus	246
Sphaeridium	134	Taenosoma	57	Trechus	19	Zahrus	28
Sphaeristes	219	Talanes	17	Trepaines	17	Zengophora	255
Sphaerites	149	Tanatophilus	117	Trirena	29	Zilora	230
Sphaerius	123	Tanyneucus	308	Triarthron	118	Zonabris	223
Sphaeroderma	284	Tanyeraerus	58	Tribolium	236	Zonitis	223
Sphaerosoma	178	Tanygnathus	81	Trichelophorus	129	Zyras	98
Sphaerula	338	Tanysphyrus	319	Trichius	360		







ICL
187

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00074 5315